



Lugduni.  
Excudebant Io-  
annes & Fran-  
ciscus Frellonii  
fratres. 1544



# APPARATVS

ET DELECTVS  
SIMPLICIVM

MEDICAMEN-  
TORVM.


\*

DE COMPOSITIONE

*Medicamentorum secundum*

*Genera,*

*EX PAULO Aegineta.*



DE COMPOSITIONE

*Medicamentorum secundum Genera  
vniuersalis methodus, ex*

*GALENO.*

\*

OMNIA nunc primùm ædita, cùm Medicis, tum  
Pharmacopolis omnib. apprimè neces-  
saria, Auctore

CONRADO GESSNERO Tigurino.

Lugduni,

*Sub scuto COLONIENSI, apud Ioan-  
nem & Franciscum Frellonios, fratres.*

I 5 4 2





CLARISS. MEDICO,  
D. CHRISTOPHORO  
CLAUSERO

CONRADVS GESSNERVS  
S. P. D.



OLENDA profectò res,  
multaq; reprehensione di  
gna, Christophore uir do  
ctissime, cùm nostro secu  
lo artes ac disciplinæ o  
mnes, barbaram quæque

suam exuerint leberidem, & tanquam uere  
nouo eruditorum ceu fauoniorum afflatu fœ  
lici reuiuiscere cœperint: solam adhuc Me  
dicinam nondum undiq; uetus illud exuiuium  
exuisse. Haud secus quàm cùm puerpera fœ  
liciter quidem enixa partum est, secundis ue  
rò hærentibus adhuc affligitur: Ita Pæonia  
disciplina in lucem nuper ædita est satis in  
tegrè, nisi aliqua eius pars lateret adhuc in  
tenebris condita. Quæ nam uerò ea est? Illa  
omniū prima, quæ iuuenescere primùm de-

bebat: illa in primis necessaria, quod ad frequentem usum attinet, ac instrumenti rationem: illa cuius auctores in utraque lingua nitidissimos & eloquentissimos habemus. Nempe quæ Medicamenta simplicia rectè cognita, suo in genere præstantissima quæque seligit, usui lecta probè parat, siue simplici, siue cum alijs iuncto. Minimè te fugit hucusque è fæculentis barbarorū lacunis, quicquid huiusmodi Apparatum attinet, præteritis antiquiorū doctiorumq; fontibus, haustum esse. Hanc ego tandem fortunam misertus Medicinæ nobilissimæ, tanquam alicuius heroinæ in fœdam miseramq; seruitutem indignis modis redactæ, quantiscunque possem hoc tempore copijs succurrere uolui, inq; pristinum ingenuitatis statum asserere. Tolerandum quidem utcumque existimassem, si dictis tantum barbaris ueluti conuitijs inclyta herois fuisset affecta, nisi purissimo etiam eius integerrimoq; corpori iniurias inferri animaduertissem. Itaque uirium mearum non igna-

# DEDICATORIA.

rus, periclitari tamen egomet malui, quam sciens uidentisq; ipsam in periculo solam deserrere. Mox suppetias ad hoc ex antiquis collegi, Dioscoride cum primis, eaque Mesuæi parte, quæ iam antea eruditissimi uiri Tagautij opera politius exculta fuerat. Hoc enim enixè cupio, hoc unicum instituo, ut pharmacorû officinæ rectè sint constitutæ. Proinde simplicia primû medicamina, tum quæ Dioscorides, tum quæ alij Græci Latiniq; insignia tradiderant, in enchiridion redegi, historia quidem fusè explicata, uiribus autem breuissimè iuxta Pauli Aeginetæ ferè præscriptum. Eorundem alio opere solas nomenclaturas uarijs linguis exposui, uidelicet Latina, Græca, Germanica atque Gallica. Rursus alio libello succidanea, quæ mutuos & æquales usus sui exhibent, conscripsi: omnibus in Pharmacopoliorû utilitatem elaboratis, ut simplicium nomina, historiam, reciprocationem, delectum, apparatusque haberent. Quæ si non perfeci, saltem cona-

## EPISTOLA

tus sum. Interim hoc labore fruantur Scplarij, hinc interim proficiant, donec uel ipse colophonem imposuero, uel alius quispiam, cui hæc rudimenta sint absoluendi à se operis. Habebunt ex hoc libro pharmacorum institores ea signa quibus in suo quodque genere præstantissimum deprehendant, coquendi, lauandi, urendi, eliciendique succos rationem, & alia huiuscemodi necessaria cognitu. Quòd si adhuc composita medicamenta illustrentur, quomodo apud ueteres sint appellata, quæ ratione parata, haud uideo quid aliud à pharmacopolis desyderari debeat, aut possit. Sunt sanè permulta quæ uulgo barbaris nominibus iactantur, antiquitus à Græcis deducta, multa à recentioribus quidem Græcis, politius tamen integriusque multo, quàm usurpentur hodie, tradita: sed in tanta nominum barbarie, corruptaque rerum confusione plerisque latent.

Ea quoque breui enucleata, Latine descripta ex ueteribus, ueraque methodo composita

*sita studiosis impertiar, si hæc illis placuisse animaduvertero. Visum est autem huc adiungere uniuersalia Aeginetæ de medicamentorum secundum genera compositione præcepta, eiusdemque argumenti generalē Galeni doctrinam, particularibus ferè cunctis reiectis: partim ut liber magnitudine nō excederet, sed breuitate sua legentium animos inuitaret, alliceretque: partim quòd multa inutilia, non ab ipso Galeno, sed alijs passim doctis atque indoctis composita uiderentur. Facile autem fuerit simplicium materiam, ac uniuersalem methodum callenti, particularia ad quoscunque affectus medicamina constituere. Item in alio opere quod iam breui ædendum pollicitus sum, seorsim omnes saltem insignes particulares cōpositiones memorabo. His omnibus de causis generalē solum tanquam epitomen Galeni librorum de compositione ὡς γένεσις, hoc loco tradere operæpretium iudicauī: paucis exceptis ex quorum descriptione reliquorū etiā apparatus*

Seplasiarij conijcerent, exemplaremque ali-  
 quam exercitationē haberent. E cæteris Ga-  
 leni scriptis nullum scio pharmacopolis ne-  
 cessarium lectu, nisi qui Theriacam mixtu-  
 ram præparāt, ut primus de antidotis, quem  
 diligenter iterum atq; iterū euoluant omnes  
 adhortor. Tibi uerò in primis hoc quicquid  
 est, eruditissime uir Christophore, mihiq; co-  
 lendissime, uolui dedicatū, idq; iure optimo,  
 cū inçlyta urbs Tigurū cōmunis utriq; pa-  
 tria te fœlicissimum sui ἀγαθὸν ἄνθρωπον habuerit.  
 Præterea D. Albertus Belfortis Rhæus uir  
 in omni disciplinarum genere absolutus, me-  
 dicinæ iuxta & philosophiæ peritiss. cuius  
 hic aliquot diebus, quæ eius est humanitas,  
 summa familiaritate sum usus: hic inquam  
 cum quotidie in honorificā tui mētionē simul  
 incideremus, effecit quò minus tui obliuisci  
 potuerim. Accipies igitur bono animo, &  
 pro eruditione tua si quid mutādū, demēdū,  
 adiiciendum'ue uidebitur, facies. Vale.  
 Lugduni in peregrinatione, 1541. Idib. Ian.

# Index in Apparatum

*Simplicium & Generalium Medicamentorum.*

A			
A	Bsintium	pag. 3	Aeris squamma 10
	Abshintij dosis & de		Aes ustum 11
	lectus	ibid.	Aeris coctio 126
	Acacia	4	Aeris scoria 11
	Acaciæ delectus	ibid.	Aerugo rasa ibid.
	Acopa	133. & 273	Aeruginis coctio 125
	Acopa calefaciētia quibus		Aerugo scolecia 12
	constent, quibusq; conue		Agaricum 13
	niant	133	Agarici mali notæ 14
	Acopa emollientia quid		Agglutinamenta 121
	præstent	ibid. 14	Alcyonij quinque genera
	Acopis quæ misceantur		Alfesceræ dosis 27
	275		Aloë 15
	Acoporum spissitudo quæ		Aloës optimæ notæ ibid.
	esse debeat	133	Aloës coctio 126
	Acorum	4	Alumen 16. & quomo=
	Adeps omnis	4. & seq.	modo in emplastris co=
	&	264	qui debeat 126
	Adipum differentiæ	261	Alypia unde dicta 112
	Aeris flos	9	Ammoniacum 17
	Aeris flos quomodo in em		Ammoniacy coctio 127
	plastris coq debeat	127	Amomum 17

# I N D E X.

<i>Amomis</i>	17	<i>Atramentū librarium</i>	23
<i>Amurca</i>	18	<i>Atramentū sutoriū</i>	ibid.
<i>Amygdalæ dulces</i>	ibid.	<i>Atramenti sutoriij coctio</i>	
<i>Amylum</i>	ibid.		126
<i>Anisum</i>	ibid.	<i>Auripigmentum</i>	24
<i>Anacollemata</i>	123	<i>Auripigmenti coctio</i>	126
<i>Antipathes</i>	41	B	
<i>Apochyma, pix nauibus</i>		<b>B</b> <i>Alanus myrepisce</i>	25
<i>derasa, quomodo in em=</i>		<i>Balsamum</i>	ibid.
<i>plastris coq̄ debeat</i>	127	<i>Bdellium</i>	26
<i>Aqua</i>	18	<i>Bdellij coctio</i>	127
<i>Argenti spuma</i>	19	<i>Ben delectus</i>	25
<i>Argēti spumæ coctio</i>	126	<i>Bitumen</i>	27
<i>Argenti spumæ usus &amp; ui</i>		<i>Bituminis coctio</i>	127
<i>res</i>	155	<i>Bryon</i>	69
<i>Argenti spumæ crudæ u=</i>		<i>Bryonia</i>	27
<i>sus</i>	161	<i>Britanica</i>	ibid.
<i>Argenti spuma &amp; reliqua</i>		<i>Euprestes</i>	ibid.
<i>metallica quomodo ab=</i>		<i>Butyri fuligo</i>	ibid.
<i>luantur</i>	162	C	
<i>Argentum uiuum</i>	21	<b>C</b> <i>Admia</i>	28
<i>Aristolochia</i>	ibid.	<i>Cadmiæ coctio</i>	126
<i>Aristolochiæ delectus &amp;</i>		<i>Calamus odoratus</i>	30
<i>dos̄is</i>	22	<i>Calx uiua</i>	ibid.
<i>Armenius lapis</i>	ibid.	<i>Cantharides</i>	ibid.
<i>Armenici dos̄is</i>	ibid.	<i>Cardamomum</i>	31
<i>Asarum</i>	ibid.	<i>Cartami delectus &amp; dos̄is</i>	
<i>Asius lapis</i>	23		39
<i>Aspalathus</i>	ibid.	<i>Casia</i>	31
			<i>Casia</i>



# INDEX.

Casia fistularis, quam Græci ueteres ignorarūt	31	Chrysocolla	ibid.
et	32	Cicuta	37
Castorium	32	Cinnabaris	ibid.
Cedrus	ibid.	Cinnamomum	ibid.
Cedria	ibid.	Cnicus	39
Centauriū magnum	ibid.	Cnidij granum	110. do=
Centaurium minus	ibid.	sis	111
Centaurij utriusque dos	33	Coccum	39
et delectus	33	Cœruleus lapis	39. et
Cera	33. et quomodo	43	
in emplastris coqui debeat	128	Collyria	121
Cera candida quomodo fit	34	Collyriorum liquidorum materia	123
Ceræ cum oleo in medicinae mentis quis modus esse debeat	132	Colocynthis duplex genus	40
Ceratomalagmata	274	Colocynthis medullæ præparandæ modus.	
Cerui cornu	34	ibidem	
Cerussa quomodo fit	34	Conchyliorū coctio	130
quæ melior	35. et quomodo in emplastris coqui debeat	Conyza	41
Chalcitis	36. et quomodo in emplastris coqui debeat	Corallium	ibid.
Chameleæ	110	Costus	ibid.
Chelidonium	36	Cotonea mâla	42
		Crocodili terrestres simū, siue Crocodilea	ibid.
		Crocomagma	ibid.
		Crocum	42. et 43
		Cucurbitula syluatica diligentiſſime terēda	40

# I N D E X.

Cyaneus, siue Cœruleus lapis	43	Emplastrorū materia	123
Cyclamen	44	Emplastrorum differentia	124
Cypirus	ibid.	Emplastra catagmatica	102. & 124
Cyphi thymiana	45	Emplastra cicatricem du-	centia 124
Cyprus	ibid.	Emplastra colletica	ibid.
D		Emplastra quæ cōcoquunt	ibid.
Dacrydion	98	Emplastra digerentia	ibi
Diphryges	45. &	dem &	257
quomodo in emplastris		Emplastra emollientia	i-
coquatur	130	bidem	
Dipsacum	46	Emplastra enæma	125
Dracunculus	ibid.	Emplastra extrahentia	124. & 257
Dropax duplicem recipit		Emplastra quæ leniunt	125
præparationem, materiã			
acopis & emplastris			
confinem	133		
Dulcis radix	46		
E			
Ebenus	46	Emplastra pus mouentia	
Elaterium	47	ibid.	
Elaterij durationis tempus		Emplastra siccantia	124
48		Emplastrorū uiridium u-	
Elleborus uomitione pur-		sus	179
gat	113	Emplastrorum uiridium	
Elleborus albus quomodo		commixtio, & propor-	
præparandus	ibid.	tio	180
Elleborum fortissimo duci		Emplastra quomodo uiri-	
æquatur	ibid.	dia fiant	182
			Fm

# I N D E X.

Emplastrum uiridis simplicis	spuma & cerussa	164
confectio & uirtus	Emplastrum eiusdē pōd.	166
Emplastrum melina	Emplastrum candida quomo	
Emplastrum rufa, quæ δῖξω	do componenda aduersus	
μα, id est incerti coloris	ulcera, cocoēthe, & cica	
dicuntur	tricem difficulter admit-	
Emplastrum rufum Galeni	tentia	167. & seq.
190	In Emplastris colorum uas-	
Emplastrum cicatricem indu-	rietas	171
centia	Epithemata	131
Emplastrum cephalica	Epithymum	48
Emplastrum propriè cepha-	Epithymi dosi	49
lica	Eruina farina	ibidem
Emplastrum glutinantia	Euphorbium	ibidem
Emplastrum nigrum	Euphorbij dosi	50
Emplastrum nigri coctio ibi.	F	
Emplastrum pharmacum δῖξ	F Aex	50
χαλκίτεως	F Fel	51
Emplastrum ex argenti spu-	Fici lixiuium	ibidem
ma præparatum	Fici sylvestris & satiuæ	
Emplastrum candidum quo-	succus	ibidem
modo fit	Fœniculi succus	ibidem
Emplastrum ex argenti spu-	Fœnumgræcum, & eius cō	
ma & hydreleo	fectio ex Aëtio	52
Emplastrum ex argenti spu-	Fucus marinus	ibidem
ma & oxeleo	Fuligo	ibidem
Emplastrum ex argenti spu-	Fumaria	ibidem
ma & œneleo	Fumariæ exhibitionis mo-	
Emplastrum alba ex argenti	dus	53
	Gaga	

# I N D E X.

<b>G</b>		Hyoscyamus	ibidem
<b>G</b> Agates lapis	53	Hypocisthis	58
<b>G</b> Galbanum 53. & quo		Hyssopum	ibidem
modo in emplastris co-		<b>I</b>	
quatur	128	<b>I</b> Cthyocolla	55
Galenii documentum de la-		<b>I</b> Indicationes ad ulcera cu-	
pidibus abluendis	22	randa	253
Galla	54	Indicum	59
Gallinacei ueteri ius	ibid.	Inunctionum aliæ simpli-	
Galli gallinacei delectus	54	ces, aliæ compositæ	135
Gallinacci decocti dosis	55	Inunctionum simpliciū ma-	
Genista	102	teria	ibidem
Gentianæ succus	55	Iris	59
Gingiber	ibidem	Iris Mesuæ	ibidem
Glās unguetaria 25. &	55	Iris Florentina	60
Glutinum	55	Iuncus odoratus	ibid.
Glutinum piscium	ibid.	<b>L</b>	
Gramen	56	<b>L</b> Ac	61
<b>H</b>		<b>L</b> Lactuca sylvestris ibi.	
<b>H</b> Aematites	56	Ladanum	61
<b>H</b> Helenius	57	Lana et lanarum medicina	
Hermodactylus	ibidem	62	
Herbæ quomodo emplastra		Lapidum coctio	130
ingrediantur	130	Laserpitium	62
Hermodactylis legendis tē		Lathyrus	63
pūs accomodum	ibid.	Lentiscus	ibidem
Hermodactylus rotundus		Ligusticum	63
ibidem		Lilium	ibidem
Horminum sylvestre	57	Lora	ibidem
		Lycium	

# I N D E X.

<i>Lycium</i>	64	<i>bdæna</i>	163
<i>Lyncis urina, siue Lyncu-</i>		<i>Medicamenta specialia</i>	198
<i>rium</i>	<i>ibidem</i>	<i>et seq.</i>	
<b>M</b>		<i>Medicamentorum ex me-</i>	
<i>Agnes</i>	65	<i>tallicis confectio, ad ner-</i>	
<i>Malabathrū</i>	<i>ibid.</i>	<i>uorum uulnera</i>	219
<i>Malagmata</i>	259	<i>Medicamentum ex euphor-</i>	
<i>Malagmatum genera</i>	131	<i>bio</i>	225
<i>Mandragoras</i>	65	<i>Medicamentum ex liquabi-</i>	
<i>Manna</i>	66	<i>libus</i>	230
<i>Mannæ adulteratio</i>	<i>ibid.</i>	<i>Medicamentum ex ladano</i>	
<i>Mannæ thuris coctio</i>	128		252
<i>Marchasita</i>	43	<i>Medicamenti emplastrodis</i>	
<i>Marrubium</i>	66	<i>compositio</i>	250
<i>Mastiche</i>	<i>ibidem</i>	<i>Medicamentum mediocre</i>	
<i>Meconium</i>	79	<i>ibidem</i>	
<i>Medicamenta arida</i>	118	<i>Medicamentū liquidū</i>	263
<i>Medicamēta stomatica</i>	120	<i>Medicamentis siccis, in ul-</i>	
<i>Medicamentorum stomati-</i>		<i>ceribus ad cicatricē aegrē</i>	
<i>corum usus uarius</i>	<i>ibid.</i>	<i>uenientibus et malignis,</i>	
<i>Medicamenta quæ empla-</i>		<i>quomodo utendū sit</i>	246
<i>stra ingrediuntur quomo-</i>		<i>Medicamina malactica pri-</i>	
<i>do coquantur</i>	125	<i>mi ordinis</i>	267
<i>Medicamenta qui probè cō-</i>		<i>Medicamina malactica se-</i>	
<i>positurus est, quæ præsci-</i>		<i>cundi ordinis</i>	268
<i>re eū cōuenit</i>	138. <i>et seq.</i>	<i>Medicamina relaxatā</i>	270
<i>Medicaminum composito-</i>		<i>Medicamentum consisten-</i>	
<i>rum usus</i>	140	<i>tia ordo</i>	273
<i>Medicamentum ex moly-</i>		<i>Medullæ</i>	67. <i>et</i> 265
		<i>Mel</i>	

# I N D E X.

Mel	67	Nardum Celticum	72
Melanteria	ibidem	Neruorum uulneratorum	
Melilotos	68	curationis modus	198
Mesuae error	93	Nitrum	72
Mesuae somnium	112	Nitri spuma	73
Metalla quæ liquefiunt	156	Nitri coctio	130
Metallorum frictio cum a=		O	
ceto ad solem	177	Oenanthe	73
Mezereon	III	Oesypum	ibidem
Mezerei dosis	ibidem	Oleæ Aethiopicæ lachry=	
Minij coctio	126	ma	74
Misy quomodo emplastra		Oleum candidum	ibid.
ingrediatur	129	Oleæ sylvestris succus	75
Molybdæna	68	Oleum Sicyonium	ibid.
Molybdoides lapis	83	Oleum Omphacium	76
Mori succus	68	Olei cum cera in medica=	
Mori radix	ibidem	mentis quis modus esse	
Muscus	69	debeat	132
Myrobalani Cepuli, Em=		Olei differentiae	178
pelitici, Belethzici, Ni=		Oleum tenuissimum	209
gri	69	Olei coctio	129
Myrrha	70	Oleū simplex acopon	274
Myrrhæ coctio	129	Omphacium	76
Myrrha troglodytica	70	Opium	76. & 79
Myrrha Bæotica	ibidem	Opopanacis coctio	129
Myrtus	71	P	
Myrtidanum	ibidem	Palma Elate	77
N	N	Palmarum nuclei	ibi.
Nardi genera	71	Panaces	ibidem
		Panis	

# I N D E X.

Panis porcinus	44	guia	ibid.
Pancreatium	78	Pissasphaltum	ibid.
Papaueris calyces	ibid.	Pityusa	ibid.
Papaueris nigri capita &		Pityusæ modus	112
folia	78.79	Pix arida	81
Papaueris lachryma quo=		Picis coctio	129
modo emplastra ingre=		Plumbaginis coctio	ibid.
diatur	128	Plumbum elotum	82
Pastillorũ tres species	117	Plumbum ustum	ibid.
Peplis	79	Plumbi usti coctio	129
Pepo	ibid.	Plumbi recrementum	83
Peucedanum	ibid.	Polium	ibid.
Pharmaca abstergentia		Polypodium	ibid.
184. & seq.		Polypodij notæ	ibid.
Pharmacum ex columba=		Pompholyx	84
rum stercore	233	Pompholygis coctio	126
Pharmacũ ex herbis	234	Populus	87
Pharmacorum sumptuoso		Propolis	ibid.
rum confecturæ ad ner=		Propolis coctio	130
uos uulneratos	235	Pruna	87
Phrygius lapis	80	Pruna prandium inchoa=	
Phu	ibid.	re debent	88
¶ Piceæ fuligo	ibid.	Prunorum decocti modus	
Picis liquidæ fuligo	ibid.	ibidem	
Picinum oleum	ibid.	Pseudocasia	31
Pini fuligo	ibid.	Pseudocinnamomum	38
Pinorum crucæ	27	Psoricum	88. & 36.
Piper nigrum	81	Psyllium	88
Piscium fluuiatilium pin=		Psyllium commēdatur se=	

# I N D E X.

mine	ibid.	Rhaponticum	ibid.
Pumex	ibid.	Rhu	ibid.
Pumicis coctio	130	Ricinus	ibid.
Punicum málum domesti-		Rosarum succus	92
cum & syluestre	88	Rosei pastilli	ibid.
Pycnocomon	ibid.	Rosarum quæ præferenda	
Pyrites	44. & 89	ibidem	
<b>Q</b>		Rosæ damascenæ	93
		<b>S</b>	
Vo tempore, quibus		Sagapenium	93
locis stirpes legere		Sagapenũ optimũ	94
conueniat	I	Sagapenum purgatorium	
<b>R</b>		non est	ibid.
		Sagapeni coctio	130
R Adicum coctio	130	Sal	94
Resina liquida è pinu		Salis flos	95
& picea	89	Salis spuma	ibid.
Resinæ coctio	130	Salis coctio	130
Resina lentiscina	66	Salix	95
Resinæ	229	Samia terra	ibid.
Resinarum differentie		Samuus lapis	ibid.
176. &	213	Sampsuchum	ibid.
Resinæ cur malagmatis mi		Sandaracha	ibid.
sceantur	265	Sandarachæ coctio	126
Resinæ Colophonie du-		Sarcocolla	96
plex nota	265	Scammonia	ibid.
Rhabarbarum	90	Scammoniũ colligendi mo	
Rhabarbari optimi notæ		di duo ex Diosc.	96.
ibidem		ex Mesuæ quatuor	97
Rhabarbarum correctore		Scam	
non eget	91		



# I N D E X.

Scammonio colligēdo tem	Spatha	77
pus accommodum 97	Spica	91
Scammonij optimi fidelis	Spodium	86
probatio 98	Spongiæ	102
Scammonium deterrimum	Squamma ex Acie decussa	
ibidem	10	
Scammonij dosi 98. & 99	Squilla	100
Schistus lapis 99	Stellatus lapis	43
Scilla. ibid.	Styrax	103
Scordium 100	Styracis differentia & ele	
Semenum coctio 130	ctio	264
Sene 100	Sulfur	103
Serapionis error 41	Sulfuris coctio	130
Sertula Campana 68	Sycomori succus	104
Serum 101	T	
Seri lactis optima notæ	T Amarindi	104
ibidem	Tamarindorum adul	
Sigillum Mariæ 44	teratio	ibid.
Sinapi 101	Tamarindorum conserua-	
Sinapismus quomodo fiat	tio	ibid.
133	Terebinthina	ibid.
Sinapismus quibus utilis fit	Terebinthina quomodo u-	
134	ratur	105
Sinapismus quibus uitadus	Terra Ampelitis	ibid.
fit ibid.	Terra Chia	ibid.
Solanum hortense 101	Terra Cimolia	ibid.
Sori ibid.	Terra Eretrias	ibid.
Sori coctio 130	Terra Lemnia	106
Spartion 102	Terra Melia	ibid.

# I N D E X.

<i>Terræ omnis electio</i>	106	<i>Tithymalus Cypariſſius</i>	
<i>Terra Selinufia</i>	ibid.	<i>ibidem</i>	
<i>Terræ cuiuslibet coctio</i>	139	<i>Tragacantha</i>	III
<i>Thapsia</i>	107	<i>Tragos</i>	<i>ibidem</i>
<i>Thapſiæ coctio</i>	131	<i>Tragoriganum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Thus</i>	108	<i>Turpet</i>	<i>ibidem</i>
<i>Thuris fuligo</i>	109	<i>Tripolij doſis</i>	II2
<i>Thuris cortex</i>	<i>ibidem</i>	V	
<i>Thuris lachryma quomodo emplaſtra igrediatur</i>	128	<b>V</b> <i>Eratrum album</i>	II3
<i>Thuris manna</i>	102	<i>Veratri albi doſis</i>	II3.
<i>Thymelea</i>	110	<i>℞</i>	II4
<i>Thymelææ modus, ſiue do ſis</i>	<i>ibidem</i>	<i>Veratrum nigrum</i>	II4
<i>Thymus</i>	III	<i>Viole ſuccus</i>	II5
<i>Thymi doſis</i>	<i>ibidem</i>	<i>Vipera</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tithymalus Characias</i>	106	<i>Viſcum</i>	II6
<i>Tithymalus Paraluis</i>	107	<i>Vlceris caui curandi ratio</i>	
<i>Tithymalus Helioſcop. ib.</i>		171. <i>℞ ſeq.</i>	
		<i>Vnguis odoratus</i>	II6
		<i>Vnguentorum coctio</i>	131

# F I N I S.

# Apparatus, & delectus

SIMPLICIVM MEDI-

CAMENTORVM.

\*

*Quo tempore, quibus locis stirpes  
legere conueniat.*

EX PRAEFAT. DIOSCORIDIS.



**I**N PRIMIS curam impen-  
dere oportet, ut suis temporibus  
singula & demetantur & recon-  
dantur. certè pro horum ratione  
aut ualēt uiribus, aut euanido nul-  
loq; munere funguntur. Sere-  
na igitur cœli constitutione deme-

tenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si  
uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si lo-  
ca, in quibus prodeūt, cliuosa, & uentis exposita sint &  
perflata, frigidaq; & aquis carentia. in his enim locis ui-  
res eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ  
in campestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à uen-  
to silentibus enascuntur, plerunq; degenerant, & minus  
uiribus ualent: multoq; magis, si nō suo tempore, nec op-  
portunè colligantur, aut si per imbecillitatē intabuerint.  
Neque ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut  
anni clementia, maturius aut serius adolescere. Non-  
nulla propria ui, hyeme florent & folia pariūt: quædam

bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti herbae duntaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quò fit ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia gramen, quinquefolium, & tußilaginẽ, emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui sepius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum cõuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae uerò fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, scriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine praegnantia demetantur.

Flores quoq; antea, quàm sponte sua decidant. Fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est. Semina, ubi siccari coeperint, priusquàm defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germanantibus tum primum cauliculis. Lac & lachrymae excipiantur, inciso per summum adolescentiae uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur exinere conuenit, cum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiã expurgatae inibi, locis asperginem non redolentibus: sed  
 quae

quæ luto aut puluere sunt obsitæ, aqua clui debēt. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluuntur.

Liquidis medicamentis densior materia argentea, uitrea, aut cornea cōuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria cōponuntur. Adipem autem & medullas stagnéis uasis recondi conuenit.

A



**AB**SINTHII existimatur li= Absinthium. quamentum herbæ eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbatur, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta anurca liquamentum adulterant. Diosc.

Dosis. Eius decoctum, aut madefacti dilutum, seu, ut dosis absinthij. dicitur, infusio sumitur Mesuæ ab uncijs quinq; usq; ad octo. Puluis à drachmis duabus usq; ad drachmas tres. Et succus à drachmis tribus usq; ad quatuor. Sed hic, ut diximus, inutilis stomacho capitiq; est. Eligendum est uulgare, quod generis appellatione Absinthium nuncupatur. Reliquæ enim species stomacho aduersantur. Atque illud folia candida, læuia & plana habeat, & longè à mari sit semotum, atq; in solo libero crescat. Mesuæ.

*Acacia.* ACACIA in Aegypto nascens, habet semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus siccatur in sole. umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Lauatur oculorū medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Præfertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorū speciem contrahatur, & uitri modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum. sordidum uerò ac resinosum, inutile. Alterum ACACIAE genus in Cappadocia Pontiq; prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, uiribus iam dicto inferius. Diosc.

*Acotum.* ACORVM optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod asfletion dicunt. Diosc.

*Adeps.* ADEPS anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulnū uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, uulnū inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstrueto diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur. mox loco uehementer frigido reconditur. & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam,

dam, aut tenuem & elanguidam prunā, quæ solis uicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento. mox lineo colo transfusus reponitur. Vt liter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua coelesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo fermè siccatur, subindeq; noua aqua abluitur. cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibz prunis spatha mouetur: eliquatusq; colo transfunditur in aquam. ubi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius sæculentum uirus pessum eat. postea in pilam spongia madefactam transfunditur. ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, per quàm frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunq; tunicis, ut in suilli mentione dictum est, exemptis, pilæ emolliendam tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. deinde in ollam fictilem conijcito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato. cumq; refrixerit, iterū in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. tertio sine aqua

liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratumq; , ut in suilli ratione diximus, recõdito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est : mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendum. decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrhenicæ ceræ drachmis. excolatumq; , detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum. oportumq; soli interdiu credendum, ut ad candorem reducatur, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet : Renibus euulsum pingue profluente annis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperseris, liquefacito. dein in nitentem aquam excolato : & ubi concreescere cœpit, manibus iterum confricando uehementer lauato, aqua sepius infusa refusaq; , donec quamoptimè elotum uideatur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. postridie si grauer adhuc oleat, noua olla repetitum, uino odorato perfundatur. eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sabaduersari solet. sed ita paratum non magnopere albescit. Eodem modo pardorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem & uitulinum pingue, necnon ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odora-

tis im



tis imbuitur, hac ratione : Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, elotum & uino quamodoratissimo nulla maris aqua diluto feruifacitum, pernoctare sinitur, alterum id genus unū eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur. nouemq; eius heminis, iunci Arabici septē drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie modis adduntur, & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie. omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur. ter simili modo bene conferuescat, deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur: & abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. postremò eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est. uerum antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horū uoles, cum uino feruifacito, impositis unā myrti ramulis, serpillio, cypero, item aspalatho plenius tuso. aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horum contenti sunt. cum autem ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatū, aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunq; acceperis, oportet ut recens tundatur) Sincerus & sanguinis expers adeps, reliquas

habens notas quas sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet. lento igni feruescat, dum uernaculus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat. at ubi deposito uase refixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inquā cuius è ligno ludicræ tibiæ factitantur, tusi minæ quatuor adiiciuntur. lento igni subinde miscendo decoquuntur. cumq; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refixerit, una contusi aspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue. postridie in fictilem ollam tricongiale ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini, unā feruescunt, quousq; & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit. qui eliquescent colatur, & reponitur. Quòd si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguis simæ myrrhæ uino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur. erysiseptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum sesuncia admiscetur. uini Lesbij ueteris cyathus unus adijcitur. ea ter efferuescunt prunis. mox uase sublato ab igne die noctuq; refrigerantur. postridie liquata per linteum crassum mundum in uas excolatur. ubi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet. æstate siquidem pingua non coguntur.

Nec

Nec defunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus cæteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quamoptimè adipis, præsertim taurini, mina una, tempestiuiq; sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperito nocte quiescunt. matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua leuiter coquuntur. dumq; suum adeps odorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet. postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur. alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur. & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quemuis adipem diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrum per lintea munda manibus uehementer exprimat, linoq; consutum umbroso in loco suspendat. & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguia autem indito melle uindicantur à putredinis uitio. Diosc.

AERIS FLOS, quem nonnulli clauorum ueterum Aeris flos.  
psegna, quasi resegmen aut segmentū, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, breuis, pōderosus, modicè splendens, atq; constringens, qui delinatam æris scobem non recepit, qua sæpe

adulteratur. Sed id facile deprehēditur, cū dentiū illi-  
su, dilatantur ramenta. Fit autem, cū æs fornacibus su-  
sum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea  
pertinentium. tum huic negotio additi ministri, sordes  
expurgantes, aquam clarissimam insundunt, refrigeran-  
di proposito. Itaq; repentino concretu, ac addensatione,  
uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Diosc.

Aeris squam-  
ma.

AERIS SQUAMMA excussa ex Cyprijs officina-  
rum clavis, crassa quidem ipsa præstātor quæ helitis, id  
est clauaris, nominatur. sed ex uili promiscuoq; ære, aut  
candido, uitiosa intelligitur. Quam, utpote tenuē & in-  
ualidam, dānamus, maximē approbātes crassam, rufam,  
præsertim si aceti respersu æruginem cōtrahat. Laua-  
tur hoc modo: Siccæ aeris squammæ expurgatæ selibra,  
cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturba-  
tur quousq; pessum ierit. abiicitur quod subsidit, & ef-  
fusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta  
manu, squamma, quasi destringenda sit, uehementer con-  
fricatur. dumq; lentorem emittere cœperit, aqua sensim  
ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo ualidé.  
squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur.  
quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta,  
excipitur. hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiri-  
bus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax.  
Inutile imbecillūq; quod superest, lauatur donec nullā  
prorsus lentitiam excernat, & linteo operiū biduo con-  
quiescere sinitur, effusæque extante aqua, ubi siccatum  
erit, reconditur pyxidicula. Aly ut cadmiam lauant, &  
reponunt. SQUAMMAE ex acie, aut mucronibus de-  
cussæ,

Squammæ ex  
acie.

cuffæ, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad moliendam alui deiectionem inefficacior est. Diosc.

**AES VSTVM** probatur rubrum, & quod contritu **Aes vstum.** colore cinnabarim imitetur. nigrum uerò, plus quàm de ceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo cõpositis, subperso sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen insparant. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutiant. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto respersos, urunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum, proximū in Cypro. Lauatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat.

**AERIS SCORIA**, id est, recrementū eodem modo **Aeris scoria.** lauatur, & eandem uim sed imbecilliorē habet. Diosc.

**AER VGO** rafa fit ijs modis: In cadum aut aliud con **Aerugo** simile uas acetum quam acerrimum infunditur. superpo- <sup>rafa.</sup> nitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum: sin minus, planum. sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum. exempto, quo doliolum obturaueris, operculo decimum post diem, insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut mascula æris, aut lamina una plures uel, uinaceis non recentibus,

tibus, sed iam aceſcentibus cōduntur, & ſimili modo uerſantur. Quinetiam ex delinata æris ſcobe æruginem facere licet. nec non è laminis, quibus bractæ auri concluſæ malleo ducuntur: ſi quis eas aceto reſpargat, & ter aut quater uerſet, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorefcit. adduntq; per caniculæ æſtus, è quodam ſpecu manare: ſed illam paucam & optimam eſſe: hanc ſpeluncis eſſe fluentem, copioſam quidem, & boni coloris, ſed uitioſam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant. aliqui pumice admixto, alij marmore, alij atramento ſutorio. Sed deprehēdemus pumicem aut marmor, dum pollice ſiniſtræ manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus. ſiquidem eam diffundi conſtat. marmoris autem pumicisq; partes, coëunt non diſſipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbeſcunt. quin & dentium appreſſu. ſiquidem ſyncera cedit, læuis, & ſine aſperitate. Atramentum uerò ſutorium igne coarguitur. nanq; ſi fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & ſeruenti cinere aut carbonibus incaleſcat alterutrum, mutabitur, rubefcetq; id quod atramentum ſutorium acceperit: quòd id uſtum ſuapte natura talem ſortitur colorē. Aeruginis quam uocant ſcoleciam, duo ſunt genera. quædam foſſilis eſt. altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisq; piſtillo cupreo conterito, donec ſtrigmenti craſſitudinem imitetur. deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum ſalis foſſitij,

translu

translucentis, aut marini quàm albiſſimi, ſolidiq; aut cer-  
tè cum nitri pari pōdere terito in ſole, æſtuoſiſſimis die-  
bus, ſub ſyduſ caniculæ, donec colorem æruginis cōtra-  
hat, & concretu ſtrigmentuſum fiat. ubi autem ſe in uer-  
miculorum Rhodiacis ſimiliuſ ſpeciem coëgerit, recon-  
dito. Efficax & ualde boni coloris redditur, ſi duas par-  
teis urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia, quæ  
dicta ſunt, peregeris. Sunt qui æruginem raſilem, quæ in  
apparatu non reſpondit, gummi miſto digerant in for-  
mas, & ita uendant. quod genus, ut uitioſum, improba-  
tur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &  
piſtillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurū  
ferruminant. Antedicta æruginuſ genera, uſto æri om-  
nino reſpōdent, ſed magis effectu ualent. Sciendum ſoſi-  
lem ſcoleciam præſtantiſſimā eſſe: de raſam ſequi: poſtre-  
mo loco factitiā. mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis  
adſtringens. aurificū autē ærugo raſæ reſpondet. Dioſc.

AGARICI duo genera. fœmina, quæ præfertur, Agaricum.  
rectuſ intuſ uenaruſ diſcuſſibuſ conſtat. maſ rotunduſ  
eſt, & undiq; compactior. Vtriq; guſtuſ in initio dulciſ,  
mox in amaritudinem tranſit. Gignitur in Sarmatiæ re-  
gione, quæ Agaria dicitur. Dioſc. Agarico fœminæ  
quinq; haſ præcipuè doteſ ex ſapientuſ opinione tri-  
buit Meſue, nempe ut ſit albuſ, læuiſ, friabilis, admodū  
raruſ. Pauluſ eligenduſ conſulit albiſſimuſ, quod delectuſ.  
facillimè frangatur, nec ſit ualde lignoſuſ, aut perfora-  
tuſ. Noſtri quoq; pharmacopolæ unuſ bonitatis indi-  
cium eſſe affirmant in Agarico, cū eſt friabile. Dioſc. dioſcorideſ.  
ſcorideſ tamē infirmuſ illud Agaricuſ eſſe dicit, quod  
friab

maliagarici  
notæ.

friabile est. Cuiusmodi esse adfirmat, quod in Galatia & Cilicia in cedris gignitur. Leuissimum, optimum: densum, graue & lignosum, deterrimum lib. de Antidotis Gal. Mari pariter & fœminæ commune est, ut in primo dosi. gustu dulce appareat. Contriti Agarici potio est Mesuæ à drachma una usq; ad duas. Eiusdē uero decocti seu infusionis (ut loquitur) dosis est eidem à drachmis duabus usq; ad quatuor. Datur obolis quatuor contritū, Plinio, ex aceto mulso. Aëtius drachmas duas ex oxymelite uel melicrato propinat. Dioscor. modò obolos duos, modò tres: modò drachmā unā, modò duas exhibet, pro uiribus, ætate, & morbi ratione: nunc ex aqua, nunc ex uino: his ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa. Mesuæ.

Alcyonium.

ALCYONII quinque esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. alterum pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. quartum succidis telleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo punicosum, foris leue, acre. quod plurimum in propontide iuxta insulam Besbicon appellatā gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Si quisquā alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinū percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur, ut Cadmia, Diosc.



**A L O E** plurima præpinguisq; in India gignitur, ex Aloë.  
 qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia &  
 Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis, ut  
 in Andro, non ualde succo extrahendo idonea, sed ad  
 glutinanda uulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur.  
 Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentũ  
 purissimæ esse uidetur. alterum ad iocineris imaginem  
 uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil delectus.  
 doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabi-  
 lis, ac iocineris modo coacta, faciliè liquefcens, eximie  
 amaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax.  
 Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, ama-  
 ritudine, & ualido odore. eoq; argumento, quod digitis  
 friata non ad minima usq; frusta resoluitur. Nec desunt  
 qui acaciam immisceant. Oculorum medicamentis torre-  
 tur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersa-  
 tur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit are-  
 nosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pin-  
 guissimum assumatur. Diosc.

Optima Aloë censetur,

Pinguis.

Nitida, splendida ac syncera.

Calculorum expers, Diosc. & Aëtio. hoc est  
 non lapidosa aut arenosa.

Iocineris modo coacta. Diosc. densa Aëtio.

Iocineris colore & subfulua, Aëtio.

Rufi coloris, Diosco. aliàs subflaua.

Facile liquefcens, seu humescens.

Friabilis.

Odorata.

Eximie amaritudinis. id est, amarissima.

Optimæ alo-  
 es notæ.

Sapo

Saporis etiam parum astringentis, Galeno.

Nigram duram, fractu contumacem, tanquam improbam atque inutilem reijcito.

**Dosis.** Dosis Aloës in substantia Mesuæ est ab aureo uno ad drachmas duas. Macerata uerò Aloës portio eidem est ab aureo uno usque ad drachmas tres. Aëtius drachmas duas Aloës exhibet cum melicrato, uel tres aut quinque pilulas, citrij uel brassicæ succo exceptas, magnitudine ciceris, his qui ea opus habent. Aliqui à drachmis duabus ad quatuor exhibent. Mesue.

**Alumen.** Omne ALUMINIS genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisq; alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species. uerum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum exetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calorū expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescētia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectum est. sed ex figura deprehenditur. Assumendum autē suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atq; ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cū quædam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione

tione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidi probatio, ut sit lymphidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendam coloris igniculum expirans. Diosc.

AMMONIACVM ferulæ succus est, quam iuxta Cy Ammoniacū renen Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agasylim uocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sordē spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est friaturam, appellant: quod uerò terram & calculos collegit, phyrama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Diosc.

AMOMVM exigue fruticat, ex ligno se conuoluens Amomum. in racenu modum: flore, ceu candidæ uiolæ, paruo: folijs uitis albæ similibus. Laudatur quammaximè Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmus esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, electio. candidum uel subrubrum, quod nec astrictum cohereat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur, seminis plenum, uuis paruis simile, graue, odoratum, modò cariem non cōtraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Adulteratur herba amomo simili, quæ Amomus uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probatio-

nibus fragmenta fugienda sunt : eligenda autem, quæ ab unaradice integros surculos emittunt. Diosc.

Amurca. AMURCA expressæ oliuæ recrementum est. decoctum in cupreo uase ad crassitudinem mellis adstringit, cæteros præbens lycij effectus, insuperq; alios. Diosc.

Amygdalæ dulces. AMYGDALÆ dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedijs quàm amaræ. Diosc.

Amylum. AMYLUM ex eo appellatū est, quòd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptiū. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte. cum emollitū fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua: quò minus cremor utilis unā excludatur. ubi molliissimū esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. rursus infusa, tertium demum enatantes ibi furfures in cerniculo eximendi. reliquumq; quallo sportisq; siccātū tegulis nouis confectum torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper udum maneat, acorē concipit. Fit etiā amyli ex zea, quæ maceratur, ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farinae modo manibus subigitur. pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur; nullius in medicina usus. ad alia tamen cōueniens. Diosc.

Anisum. ANISVM melius semper recens, plenum, non fursum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Diosc.

Aqua. DE AQUIS in uniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps. & quæ

que ne minimo quidem tempore in præcordijs cōmoratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiā, nec inflationes creat, & minime computrescit. Diosc.

ARGENTI spuma quædā gignitur ex arena, quam Argenti spumolybditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecta igni incandescat. altera ex argēto. tertia ex plumbo. Probatissima est Attica. secunda Hispaniensis. has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandiū, prunæ superpositis: ita accensa follibus, ut conflagret, abstergitur insidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino restinguētes, rursus urunt, & eadem prosequuntur, reponunt. Lauatur ut cadmia. Vt argyritidi nominata, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partis magnitudine fabarum confracta, chœnicis atticæ mensura, fictili nouo supersusa aqua, addito candidi tritici pari pōdere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat. deinde omnia in nouū craterem oris ampli trāsfunduntur. triticum abijcitur. spuma argenti uehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua sinitur. mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. id septem diebus

fieri solet. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur. cumq; inalbuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinē resipiat. demum ardētissimo sole siccata: eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, muna spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemuneat. mouetur quotidie mane & uesperī, aquaque superinfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus. nanq; nisi moueatur, crassescit, usq; in duritiē testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquā continens, manibus diligēter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum salsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescentis contabescat, exemptamq; cum sale pariterunt, & ut suprā dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundem, in sole terāt, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantā uis argenti spumam; ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanaq; non denigretur, exemptā argenti spumam, & altera lana inuolutā, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. eadem

tertio,

tertio, quæ suprâ, facito. in summa, tantisper, dum lana  
ian non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium,  
ad singulas salis fossitij libras, adycito octogenas spumæ  
argenti drachmas Atticas, & terito: intermittens q̄, ni-  
tri quàm albißimi cum aqua diluti drachmas quadragin-  
ta septem indito. iterum terito, donec satis candoris con-  
traxisse uideatur. ita autem fundens eam ex alto in ficti-  
le oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi considerare desie-  
rit, colato. tum nouam superadijciens aquam, manibus  
probè uersatam, finito ut consadat, ac rursus per colum  
traijcito. alternis eadem prosequere, dum pura aqua dul-  
cisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. postre-  
mò in fictile nouum translata, colato sensim omni hu-  
more, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus ex-  
ponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad ocu-  
lorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tol-  
lendas, ad rugosas facies, et cicatricosas, laceratasq; &  
macularum plenas. Diosc.

ARGENTVM uiuum fit ex minio, quod abusiue Argentum  
cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea con- viuum.  
cha cinnabarin cōtinente, & calice cooperta, argilla su-  
perlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligo,  
quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit.  
Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stilla-  
tim concretum. Aly per sese in metallis inueniri tradūt.  
Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnéis, aut argen-  
teis uasis. siquidem aliam materiam omnem exedit, &  
defluere facit. Diosc.

ARISTOLOCHIA RV M radices effodere mēsi Aristolochia

bus est tempestiuum, ita desquammato terreno seruan-  
 delectus. tur. Quinque aut sex annos durant. Maxime cōmen-  
 datur Pontica, & in uno quoq; genere ponderosissima.  
 Quæ oblonga radice, tenuioriq; est, gravior habetur: car-  
 nosi enim est corticis, unguentis quoq; nardinis conue-  
 dosis. nientissime dicata. Dosis Aristolochiæ Mesuæ est, à  
 drachma una usq; ad aureum unum. Aëtius seminis Ari-  
 stolochiæ sirculosæ exiccati drachmam unam propi-  
 nat, ad bilem pituitamq; expurgandam. Mes.

Armenius la-  
 pis.

dosis Arme-  
 nici lapidis.

galeni docu-  
 mentū de la-  
 pidibus ablu-  
 endis.

ARMENIVM optimum esse Plinius dicit, quod ma-  
 ximè uiret, communicato colore cum cœruleo. Dio-  
 scorid. laudat Armenium, qui sit leuis, colore cœruleo,  
 perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem  
 quæ Chrysocolia præstat, sed inefficacius. Aëtius  
 scrupulos quatuor eiusmodi lapidis offert. Alexander  
 illoti scrupulos tres uel quatuor: loti uero quinque uel  
 sex exhibet. Vult autem ut quinquagesies abluatur. Ve-  
 rumenimvero tutius iuxta Galeni sententiam fuerit, to-  
 ties ipsum lauare, aquamq; tandiu mutare, donec pura  
 ab omni sorde uideatur, omniq; sapore medicamento ca-  
 reat. Quod Galeni documentum non tantum peculiari-  
 ter de hoc lapide à Pharmacopola accipiendum est, sed  
 in uniuersum de quauis re lapidosa quæ sit abluenda.  
 Cæterum nō loti potio est Mesuæ à drachma semis, usq;  
 ad sesquidrachmam, loti uero à drachma una usque ad  
 drachmas duas. Mesue.

Afarum.

ASARVM aluum instar albi Ellebori deiicit senis  
 drachmis pota ex aqua mulsa. Eius autem infusionis po-  
 dosis. tio est Mesuæ ab aureis duobus, usq; ad drachmas qua-  
 tuor:



tuor: & pulueris à drachma una usque ad aurcos duos. Si autem ad exactum læuorem ac curiose teratur, magis per urinas purgat, quàm per aluum. Idem auctor radicem hanc Asaron Græcis nuncupatâ, præfert quæ crassa & densa sit, iucundo odore, & sapore acri cum modica stypticitate. Optimum autem Asarum, nasci ait Electio. Plinius in Ponto. proximum in Phrygia. tertium in Illyrico. Mesue.

ASIVS lapis assumi debet pumicis colore, levis, fungosus, item friabilis, scijsiles uenas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergente. admotus lingue aliquantū mordet. Lōgē ualidior est lapide. Diosc.

ASPALATHVS spinosus frutex nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula. quo ad unguentorum spissamēta unguentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Dioscorides.

ATRAMENTVM quo scribimus, fuligine ē tedis coacta colligitur. in singulas libras gūmis, ternæ fuliginis uncia adiiciuntur. Fit etiam ē resinarum & pictoria fuligine, de qua paulo antè diximus. Assumitur autem fuliginis muna, gummi sesquilibra, glutini taurini, atramenti sutorij, singulorum fescuncia. Dioscorides.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum: sed in specie differens

Atramentū  
librarium.

Atramentū  
sutorium.

tias treis habet. unum nanque humoribus stillatim in cuculculos quosdam colatis, concrefcit. quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Peteesius ipsum pinarion uocat, alij stalacticon, id est stillatitium, alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capeffit. quod pecton, id est concretitium, propriè nomenatur. tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet. sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, coeruleum, graue, concretum, translucens. cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nomenatum. proximum, concretitium. coctile uerò ad infectus & denigrationes, aptius cæteris esse cõpertum est. sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus. Dioscorides.

Auripigmentum.

AVRIPIGMENTVM in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore mucans, nulli materiæ permixtum, in squamas fissile, quale in Mysia Hellefonti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. unum supra dictum est. alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandarachâ inutans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur. quod etiã secundum locum tenet. Torretur in testa noua uiuis carbombus subiectis: assiduoq; uersatur, donec igne flagret,

gret, & mutet colorem. deinde refrigeratum, tritumq;  
reconditur.

B



**B**ALANVS myrepſice, hoc Balanus my  
eſt glans unguetaria, præfertur repſice.  
Dioſcoridi, recens, & farcta, delectus ben.

item cãdida, & quæ facile à pu-  
taminibus ſoluitur, id eſt, quæ  
ſuo cortice facile ſpoliatur. Pli-  
nius Petream, id eſt ex oppido  
quod Petram uocant, optimam eſſe dicit, nigro cortice,  
& candido nucleo. Errat Meſue qui Ben antiquum di-  
cit melius eſſe recenti. Glans unguentaria aluum ſol- Glans vngue  
uit ex hydromelite, Dioſcoridi, ſed ſtomacho aduerſa- taria.  
tur. Drachmæ pondere pota eidem auctori lienem abſu-  
mit. Doſis eius eſt Meſuæ à drachma ſemis uſq; ad dra- doſis.  
chmam unam & ſemis. Oleum quoque quod ex ea ex-  
primitur, uentrem potu ciet.

**BALSAMVM** in Iudæa ſolum quadã ualle & Ae- Balfamum.  
gypto naſcitur. his differens modis, ſcabritia, proce-  
ritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma  
eſt, theriſtrum uocant, quaſi demeſſile. fortãſis quoniã  
ob gracilitatem facilè demetatur. Aëſtiuis ſub ortu  
Canis ardoribus, arboſ unguibus ferreis inciditur, ma-  
natq; è plaga ſuccus, quem opobalfamum uocant: ſed tam  
exiguo ſtillatu, ut annis ſingulis, ne plures quidem quàm  
ſeni ſeptenũue cõgi cogantur. inibiq; pondus, duplo re-  
penditur argento. Succı probatio eſt, ut ſit recens, uali-  
di odoris, ſyncerus, non ad acorem uergens, dilui faci-

lis, lævis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitiatur, misto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item susino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficium faciliè deprehenditur. Nanque merus in laneam uestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: uitiatus autem in hæret. & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrime liquatur, coloreq; lactescit: uitiatus uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima fidere arbitrantur, postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadam tenus opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Diosc.

Bdellium.

BDELLIUM alij bolchon appellant, alij madelcon. lachryma est Saracenitæ arboris. probatur gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, uberioribus glebulis in offas cōuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum,

cundum. Adulteratur gummi. sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeò suffitionibus odoratum. Diosc.

**BITVMEN** Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius Bitumen. probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitq; pondero delectus. sum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & fordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliæ, fontibus innatans. quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. nanque liquidi bituminis genus esse constat. Dioscorides.

**BRYONIAE** radicis succus exprimitur Vere. Bryonia.

Dosis radicis Fesceræ seu Alfesceræ, hoc est uitis albosæ, præscribitur Mesuæ ab aureo uno usque ad aureos duos: & succi eiusdem, à drachma una, usque ad drachmas duas. similiter & Fesceresin, quæ eidem factionis Arabicæ auctori species est Alfesceræ. Mesuæ.

**BRITANICAE** folijs exprimitur succus, qui Britanica. igni aut sole cogitur. Dioscorides.

Simili modo ut cantharides, reconduntur **BVPRES** Buprestes: & **STES**, genera quædam cantharidum: & **PINORVM** Pinorum erucae. quæ supra cribrum suspensum feruētī cinere paulisper intostæ, reponuntur. Dioscorides.

**BVTYRI** fuligo. Colligendæ ex eo fuliginis ratio Butyri fuligo hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fistiliq; operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum suffi-

sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna pòst deraditur ad usus. Diosc.

## C

Cadmia.



AD M I A E ex generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginea. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus, onychitæ lapidi similis. cuiusmodi sunt, quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, utiles: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. ad eadem Cypria prodest. ex Macedonia uerò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus cæmentisq; fornacum inherente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia cōnexæ & concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineantur. quæ cum spissius insident, in corpus cōcrescunt, & modò ge

dò genus unum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte qui Solis incūbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen est. in quo etiā monte quædam quasi uenæ chalcitis, musyos, soreos, melanteriæ, cœrulei, chrysocollæ, atramenti sutorij, diphrigisq; inueniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradāt, falsi quadam lapidum cognatione. qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullā sui uim ostendens. Ii eo deprehenduntur, quòd sunt cadmia leuiiores, nullumq; alienum mandentibus saporē exhibent. commanducatus item lapis, dentes offendit. cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit. quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumum igni similem eiaculatur. cadmia uerò quieta manet, fuliginemq; luteo colore aut æreo splendentem ex-puit, uario Zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet. sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda æariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet. mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psorarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur. iterumq; tritam ex uino, tertio urunt, donec

donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens. hoc spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat. dein coacta in pastillos, reponitur. Diosc.

Calam<sup>o</sup> odoratus.

CALAMVS odoratus in India nascitur. melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Diosc.

Calx uiua.

CALX uiua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum penitus albescant. Frigida decinde restinctas nouo fictili indito, diligenterq; uetere lacinia operculatas, integram noctem finito. Postridie si omnino in calcem mutatae uidebuntur, reponito. Fit etiã coctis fluuiatilibus calculis: item ex uulgari albo lapide, reliquis laudatior. Efficacissima recens, & aquis nondum aspersa. Diosc.

Cantharides.

E frumentis congestæ CANTARIDES ad recon= dendum idoneæ sunt. quæ fictili uase non picato cõduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec astu exanimentur. postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent. promissoq; corpore, crassæ ac blattarum modo perpingues. sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris. Dioscorides. Aliqui pennas pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.



CARDAMOMVM optimum est, quod ex Coma- Cardamo-  
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. In India quoque mum.  
& Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti con-  
tumax, occlusum, sarctumq;. Quod enim huiusmodi non  
est, exoletum indicatur, & gustu acre, subamarum, &  
odore caput tentans. Diosc.

CASIA, cuius complura sunt genera, iuxta odorife- Casia.  
ram Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs pi-  
peris. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corali  
amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gu-  
stu mordens, & cum aliquanto feruore astringens, aro-  
matica, uinoso odore. cuiusmodi est quæ ab incolis, achy  
appellatur: ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis.  
Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, zigir co-  
gnomune, quæ rosam odore imitatur præcipui in medici-  
na usus. Secundum locū tenet antedicta. Tertia, cui mo-  
syletico blasto, id est germuni cognomen est. Reliquæ ui-  
les, ut quæ asymphemon dicitur, nigra, insuauis, cortice  
tenui acrimoso: & quæ darca, & kittò uocitantur bar-  
baro nomune. Simulior huic est PSEUDOCASIA, Pseudocasia.  
quàm ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec  
acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem ha-  
beat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis,  
furculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candi-  
cans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fi-  
stula & scabra eute sit. Diosc.

CASIA fistularis, quam Græci veteres  
ignorarunt.

Casia fistu-  
laris.

Siliquas CASIAE deligere oportet ponderosas, collu-

collucentes, per plenas : quas si concusseris, inclusa intus  
 dos. grana non obstrepant. Dosis medullæ Casiæ, est à  
 semuncia ad fescunciam, id est unciam unam & semis.  
 Mesue.

Castorium. CASTORIS eligi debent testes qui ex uno ortu  
 connexi sunt ( fieri enim non potest, ut gemini folliculi  
 in una membrana coniuncti reperiantur ) liquore intus  
 ueluti ceroso, odore graui, & uirus redolente, gustu  
 acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circunda-  
 to. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in follem  
 gummi, aut ammoniacū cum sanguine & castorio suba-  
 ctum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes  
 ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum uenatu urgentur.  
 siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ  
 autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum  
 euestiēte tunica assumere, & siccātū potui dare. Diosc.

Cedrus, & CEDRVS arbor magna est, ex qua picem colligūt,  
 Cedria. quæ CEDRIA uocatur. Cedria optima est crassa, per-  
 lucida, grauis odoris. quæ dum effunditur, guttatim non  
 dissipata coit. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri o-  
 portet. quæ eandem quam picea fuligo uim præbet. Fit  
 & oleum, à cedria separatū, dum coquitur, uelleribus  
 supra halitum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad om-  
 nia usus. Diosc.

Centaurium magnum. CENTAVRII magni succum in Lycia exprimunt,  
 quo pro lycio utuntur. Diosc.

Centaurium minus. CENTAVRII minoris succi extrahēdi ratio : Le-  
 gitur herba semine prægnans, & diebus quinque made-  
 facta, decoquitur donec superemineat aquæ. mox ubi  
 refri-

refrigit, linteolo exprimitur. & eiecta herba, iterũ de-  
coquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Non-  
nulli eam recentem grauidamq; contundunt, atque suc-  
cum fistili non picato exprimunt, & in sole, lignearu-  
de assidue mouentes, inspissant. quod si quid concretum  
faucibus uasis adhærescat, deradunt, reliquosq; humori  
permiscent, noctu diligenter operiūt. ~~namq; ros noctur-~~  
~~nus, liquoros & defecant non sunt.~~ Quæ autem siccis ra-  
dicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut  
in gentianæ mentione retulimus, præparantur. sed quæ  
ex corticibus humidis, aut contusis herbis faciliuntur, in  
sole, uti antè dictum est, coguntur. sic è thapsia, sic è man-  
dragora, reliquisq; simulibus succus, sic ex acerbis uuis  
melligo elicitur. lycium tamen & absinthium, hypoci-  
stis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, cogun-  
tur. Dioscorid. Purgat aluũ drachmæ pondere sum-  
ptum in hemina aquæ, cum exiguo salis, & aceti: bi-  
lemq; & crassos humores per aluum exigit. Maioris  
uero Centaurij radix duabus drachmis, & interdum  
drachma una bibitur Dioscoridi & Galeno. si febris  
sit, in aqua trita: cæteris, in uino. Medetur & morbis  
plurimis decoctæ succus. Mesue. Quod ad electio-  
nem attinet, falsum est quod scribit Mesue: Nempe ni-  
nore Centauream meliorem esse in omni re. Alia enim  
in re utraque præstantior est. Tagautius.

CERA optima est subfulua, suppinguis, pura, odo-  
rata, & halitum quadam tenus melleum referens, natio-  
ne Pontica, aut Cretica. secundum locum obtinet candi-  
cans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo:

Ex ea radunt album sincerumq̃, atque transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, insperfoq̃; nitri momento, decoquunt. cumq̃; iterum tertio uae inferbuit, separatim uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua fortè adhæsit. tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus. & uase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt; quò celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipitur. orbiculi lino consuti, interuacante spatio suspenduntur. & interdiu, continuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, usque dum perfectè albescant. uerùm si eximus ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum excoquant. dein laguncula tenui, rotunda, ansam habete, extrahunt. postea orbiculos, substrato affatim cesspiti herboso, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum sol renussa uehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Dioscorides.

Cerui cornu.

CERVI cornu concisum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, uritur donec albescat. id cademiæ modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. Diosc.

Cerusa.

CERUSA fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quam acerrimo aceto, laminam plumbeam

bean supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamentumq; transfundito. debet quoque siccari in sole, mox trusatili mola teri, aut aliâs tritum cribrari. postea quod superest duri in tenues partes redigendum, cribrandumq;. uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculi delectus. lorum assumenda: secundum locum tenet, sequens: & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. post dies decem laxato obturamento uisunt. cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, acetum acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est. ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis, ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut, Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantes igni carbonibus, fictili nouo, maxime Attico, tritam cerusam imposito, & assidue uersato. cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usus muni-

stratur. quæ uerò ita parata est, sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerusa cadmiæ modo. Diosc.

- Chalcitis. CHALCITIS præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblōgis uenis, Pforicon. splendentibusq; . Diosc. PSORICON appellatum è Chalcite fit medicamentum, duabus eius partibus, cum una cadmiæ additis, & ex aceto tritis. oportet autem in fictili, obruere fimo, diebus quadraginta, per Caniculæ ardores, sic enim fit acrius. Idem quod Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito, modus autem uestionis in humidioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desiderit, & perfecte inæruerit: in reliquis uero dum mutata in roseum colorem fuerit, & sanguineū aut muniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est: infidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum per flatis carbonibus, usque dum luteo colore pallescat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret & colorem mutet. Diosc.

- Chelidoniū maius. CHELIDONII maioris folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Diosc.

- Chrysocola. CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens, secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. quo in genere præfertur pura. damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua,

aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quàm confederit, colato. alteram infundens aquam, rursum terito. Diosc.

CICUTAE succus exprimitur contusus cacumini- Cicuta.  
bus, priusquam semina & comæ siccescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. Diosc.

Hallucinantur qui CINNABARIN minio eandem Cinnabaris.  
esse existimant. Miniũ enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permulto, temperari solet. alioqui non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum flagentissimumq; colorem permutatur. in metallis uerò strangulanti halitum eructat. itaque facies incolæ uesicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant. eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica defertur, & magno constat. hætenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciat. intento colore nec diluto præditum. quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem. Diosc.

CINNAMOMI genera plura, patrium sibi nomen Cinnamomum.  
uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod casia, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamo

mo proximus. Insuper, acre, mordens, & cū calfactio-  
 ne quadam tenuis falsum, quod non citò confricanti aspe-  
 rum, aut frianti lanuginosum, leuibus tamen interno-  
 dijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice sur-  
 culum. facilis est huiuscemodi probatio: nanque frag-  
 menta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem  
 melius spirant, suo halitu cum nares primum consulun-  
 tur, olfactum explentia, deterioris dignotionem impe-  
 diunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, ful-  
 uescens admodum. Tertiū à Mosylitico, perquàm sua-  
 uiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedētibus ge-  
 niculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tubero-  
 sum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ ca-  
 siam planè repræsentat. Quintum genus, odore nares fe-  
 riens, subrusum, & cortice fuluæ casie simile, tangenti  
 firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis  
 quæ thuris, casie, myrti, aut anoni odorem spirant, mi-  
 nus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum:  
 at leue, & lignosum circa radicem, ut inutile reijcito.

Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamo cogno-  
 men est, inualidi odoris, solutarumq; uirium. Vocatur  
 etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-  
 bens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum  
 cinnamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore  
 longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomū  
 à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius  
 abhorreat. Tritum uino excipitur, umbraq; siccatum,  
 quò diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinna-  
 momum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant,  
 perquàm



perquàm denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu. Dioscorides.

CNICVS redigitur in offulas, quas placentulas uo= Cnicus.

cant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant, è quibus ante cœnam duas uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperadi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Cnici semen tunditur, & succus exprimitur. Diosc.

Semen Cartami ex sententia Mesuæ Cartami deligendum est, candidum, planum, hoc est læue, grandiusculum, & plenum, cuius medulla est unctuosa & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinque

Cartami delictus.

medullæ Cartami, cum Ptisana, & paucis salibus, ut educat aquam. Seminis tusi succus adiectis amygdalis, nitro, anetho, & melle decocto, cogitur in placentulas Dioscoridi, quæ aluum emolliunt. Hæ in frusta seu globulos quatuor finduntur, qui nucis iuglandis magnitudinē impleant, è quibus duas uel tres ante cœnam sumpsisse satis est.

Dosis.

COCCEVM optimum gignitur in Galatia & Armenia. deinde Asia & Cilicia. ultimum ex omnibus Hispanicum. Nasceitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legit, & coccum uocitant. Diosc.

COERULEVS lapis præcessit in Cyaneo.

Coeruleus lapis.

Colocynthis duplex genus apud Mesuen.

Mesue duplex genus COLOCYNTHIDIS constituit. Nempe marem & foeminam. Mas grauis, durus, asper, nigricans, & lanuginosus est. Foemina eisdem auctori praefertur mari, praesertim magna, siue ut dicunt grossa, laevis, laxa, candida, lenis, & perfecte matuta: & cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa, laevis, hoc est non aspera, & insigniter alba est. Colo-

Aëtius. cynthidis medulla Aëtio eligenda est, alba & mollis. Siccior uero & nigricans, tanquam mala reijcienda.

modus praeparandae medullae Colocynthidis.

Optima Venetijs ematur Colocynthis, & quae ex orientalibus regionibus, utpote calidioribus, ad nos aduehitur. Quae apud nos nascitur, inefficacior est, & aegre aluum soluit. Ceterum probatissima sylvestris huius Cucurbitae medulla, siue, ut loquuntur pulpa antequam in usum assumatur, primum incidenda est. Deinde terenda diligenter, & saepius cribranda. At usus tempore rursus cum mulsâ in mortario exquisitissime subigenda. Id enim illi, inquit Aëtius, peculiare est, ut trita antequam madescat, subtilissima appareat: sed post mulsae infusionem ita intumescat, ut qui uideat cribratam, nunime putet. Quoddam igitur frustulum eorum quae intumuerint, saepe uentri aut stomacho inhæret, saepius tamen intestinorum anfractibus implicatur. Cumq; sit naturaliter acris & mordax, ulcerat intestina, & ob consensum neruis affectum inducit, tormunaq; parit & contractiones.

Cucurbitula syluatica diligentissime terenda.

Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minutiam redigenda est. Sed mulso prius aut rutae decocto infunditur, tum exiccata in puluerem redigitur. Paulus & Auicenna, quem est Mesue secutus, ipsam Colocynthida

thida etiam plurimum teri iubent. Quoniam ( ut inquit Paulus ) nisi exacte teratur, asperæ eius partes interioribus hærentes, ulcera excitant, quibus nervi compatiuntur. Serapion autem contrarium, sed male, asserit, eam uidelicet non esse multum terendam. Dosis pulpæ Colocynthis ad summum est decem ceratia Mesuæ. Paulus drachmam integram dare non ueretur, quæ eiusdem sententia, pendet ceratia decem & octo. Datur Aëtio Colocynthis medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mulsæ cyathis. Imbecillibus tamen, inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumpta purgat Dioscoridi melle cocto, myrrha & nitro excepta, atque in catapotium coacta.

Serapionis  
error.  
dosis.  
Mesuæ.  
Paulus.  
Aëtius.

CONYZAE genus tertium reliquis infirmius est. Conyza. Dioscorides.

CORALLIVM laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili usquequaq; concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quam ramosissimum, forma si utius, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, utiosum existimatur. Quod Antipathes uocant, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet. Dioscorides.

Corallium.  
Antipathes.

COSTVS præcellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat indicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est re-

cens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graecolētia, gustu calidus, & mordens. Sunt qui admustis helenij comageni præduris radicibus, adulterent. quod deprehensu facile est. Siquidem neque gustu feruet helenium, neque ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit. Diosc.

Cotonea  
mâla.

COTONEA eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata. quæ uerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Diosc.

Crocodili fi-  
mum.

CROCODILI terrestris finum crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenuis refert. Adulterant eam sturnorū fimo, quos captos oryza pascunt. ipsumq; non dissimule uendunt. Alij amyllum aut cimo-  
liam miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. qui siccati pro crocodilea ueneunt. Diosc.

Crocoma-  
gma.

CROCOMAGMA fit expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod madefactum croci colorē reddit, gustatumq; uehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis. quale est, quod à Syria deservitur. Dioscorides.

Crocum.

CROCVM, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulū candidi gerens in capreo lo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile,

gile, plenum, à quo detractum est nihil, quod made factū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, suba- cre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore per- fusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermuno. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinū inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium natu- ra oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris ue- nustatem, tingendis mortarijs dicauerunt. quibus de cau- sis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ subtilu: contrita, quò pondus adijciatur simul argenti spuma, aut plumbagine. sed maleficium deprehenditur puluerulento aspectu, & defruti odore. Dioscorides.

CYANEVS, id est COERVLEVS. Cœrulei ori- go ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena li- torali, secundum quosdam sub cauatos specus maris inue- nitur: qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vri- tur ut chalcitis. Lauatur ut cadmia. Diosc. Serapio præfert, qui perfectissimum colorem cyaneum habet, & guttas aureas admixtas, quiq; alterum lapidem mixtum non habet, nec facile frangitur. Nostri pharmacopole lapidem hunc imperfectissimum ostendunt: quippe cui eius color desit perfectus.

Animaduertendum est communi lapidis stellati no- menclatura Cyaneum simul, & Marchasitam, hoc est pyriten esse complexos Arabes. Dosis lapidis stellati Mesue est à drachma una usq; ad drachmas duas & se- mis.

Cyaneus, id est, Cœru- leus lapis.

Lapis stellat⁹ & Marchasi- ta.

Dosis lapidis Stellati, id est Pyritis & Cy- anei.

*mis. Reperio apud Galenũ, & Paulũ, ac reliquos alios scriptores medicos, Cyanon siue lapidem Lazuli, acri facultate esse præditum, & purgatoriã ac discussoriam uim habere. Pyriten uero quem Marchasitam uocant, nullus unquam (quod saltem nouerim) inter purgatoria medicamenta reposuit. Hic autem ualde discutit tumores, sanguinemq; in grumos concretum: cuius loco, cum eius copia non est, molari utuntur medici.*

*Pyrites lapis purgatorius non est.*

*Cyclamen.*

*Dosis radices Cyclamini. i. Panis porcini.*

*Dosis alterius Cyclamini. i. sigilli mariæ.*

*CYCLAMINI succus exprimitur tusa radice, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Diosc. Cyclamini radix cum hydromelite pota, pituitam per inferna detrahit. Eadem cum passo aut diluto mulso trium drachmarum pōdere epota, arquat morbum, id est icteritiam discutit, siccata & scyllæ modo concisa reponitur. De altera Cyclamuno (quam Sigillum Mariæ uocant) scribit Dioscorides, quod huius acini drachmæ unius pondere, in uini albi cyathis duobus, per quadraginta dies epoti, lienem per urinam & aluum paulatim absument. Dosis Arthanitæ Mesuæ est, ab aureis duobus usque ad drachmas quatuor, & proprie succi eius.*

*Aëtius.*

*Aëtius radices cyclamini minutissime tritæ drachmas tres uel quatuor, pro uirtutis ratione è mulsa propinat, ad bilem & pituitam ducendam. Sed huic per sudorem præcipue purgat, seu potius euacuat.*

*Cypirus.*

*CYPIRVS optima est grauißima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Aliud Cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberts effigie, quod manducatum croci uim reddit,*

reddit, gustu amaro, illitum psilothrum est. Diosc.

CYPHI thymiamatis compositio est, dicata dijs, qua Cyphi thymiamina. abunde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. suspiriosis datur in potu. Per multae componendi rationes, quarum una haec est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultae modo: uuae passae pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resinae repurgatae minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhae duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis. uuam passam detractis uinaceis tusam, cum uino & myrrha subigito: caetera tusa & cribrata adijcito. die uno humorem combibere finito: dein mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem. eliquatam resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito. Diosc.

CYPRVS optima nascitur in Canope, & Ascalone Cyprus. ne. Diosc.

D



DIPHRYGIS tria genera est Diphryges. se creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro solagignitur. lutosum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, arescat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quasi subsidens fex est. siquidem post frigidae

gidae aquae offusionem, ut suprà retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacũ ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionẽ & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidẽ pyriten, ut calcem multos dies cremât in camino: cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximẽtes recondunt. Quidã tradunt, hoc ex sola materia quæ lapidẽ æris gignit, fieri: quãdo in dictis arcis affata & in scrobes translata perurit. tunc enim ambientem scrobis locum cõprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. præfertur quod saporẽ æris reddit, æruginisq; adstringẽs, & uehementer excicans linguam. quod sibi exusta ochra nõ uendicat: quæ cremata, diphyrgis uice uenit. Diosc.

Dipsacum. DIPSACI radix tusa & decocta in uino, usq; dũ sit crassitudo ceræ, sanat rimas sedis & fistulas. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Diosc.

Dracūculus. DRACUNCULI radix messibus effoditur, lotaq; frustatim cõciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita reconditur. Diosc.

Dulcis radix DULCIS radice succus exprimitur è radicibus, qui densatur lycij exemplo. Diosc.

## E

Ebenus.



BENVS optima habetur æthiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus læuore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio.



tædio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modice fulvis, item frequentibus maculis. cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebena ueneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præsentia. Diosc. Ebenus uritur in fictili nouo donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi usti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit. Diosc.

E fructu syluestris cucumeris, fit medicamentum quod ELATERIVM uocatur, ad hunc modum: De Elaterium. cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una. postridie imposito supra craterē rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulq; carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in uicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segnina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abyciuntur, humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponitur. dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua lique scat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium

cauan

cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumq; in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marina persfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotione,

delectus. mulsam aquam respergunt. ELATERIVM optimum esse constat, laeue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo, amyllum immisceant, ut cando-

Tempus du- rem ipsum & leuitatem imitetur. Elaterium usu pur- rationis Ela gationum à bimatu incipit esse tempestiuum Dioscori- terij. di, duratq; decennio. Mesuae conseruatur solum triennio, & post sex menses administratur. Theophrastus ducetos annos uim eius pollere adfirmat. Quo uetustius, eo esse melius dixit Plinius.

Dosis. Maxima potio Elaterij est solidus obolus, Dioscoridi: minima mensura, semiobolus. Pueris sufficit dichalcon, id est calci duo, hoc est pondus granorum quatuor. Si maiore copia sumatur, periculosum est. Bilem pituitamq; alterutra parte extrahit. Vetandi autem sunt dormire, qui potant.

Epithymū. EPITHYMVM nasci plurimum in Creta & Syria Mesue scribit. Cui etiam auctori praefertur Cretense, subrusum, & acuti, ut loquitur, odoris. Diosc.

Dosis Epi- Mesue pulueris Epithymi drachmas septem exhiberi posse statuit. Cum tamen ueteres multo minorem

Dioscor. quantitatem praescripserint. Dioscorides namq; quatuor tantum

tantum drachmas concedit cum melle ac sale & aceti exi-  
 guo. Idē pondus exhibet Galenus in sero lactis uel mul- Galen.  
 sa, libro decimoquarto methodi medendi. Oribasius in 4  
 suo compendio uix drachmas tres transcendit. Aëtius Oribas.  
 tantum scrupulos duos triti & cribrati, ætate uigentibus 3  
 offert. Paulus tamen Aegineta libro septimo dandas esse Paulo.  
 drachmas quinque cum lactis hemina contritas permut- 5  
 tit. Plinius uero lib. 26. cap. 8. ad sex usque drachmas Plinio.  
 progreditur. Auicēna potionem Epithymi quatuor esse 6  
 aureos præcipit: adeo ut nemo sit præter unum Mesuē, Auicen. aurei  
 qui ad septem usque drachmas progredi ausus sit. Pro- 4  
 inde consultum erit, ut quinque tantum uel summum sex Legitima do-  
 drachmas, idq; paucissimis concedamus. Potio uero 5  
 ipsius Epithymi infusi seu macerati offerri potest, ab un- Dosis infusi  
 cia una, usque ad uncias duas. epithymi.

ERVINAE parandæ farinæ ratio hæc est: Vberio- Eruiua fa-  
 ra grana candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua re- rina.  
 sparguntur, donec sufficienter combibant. postea torren-  
 tur, usque dum hians cortex disrumpatur. molitaq; fa-  
 rinario cribro incernuntur. postremo farina recondi-  
 tur. Diosc.

EUPHORBIVM libyca arbor est, ferulæ speciem Euphorbiæ  
 habens, quæ in monte Atlante, iuxta Mauritaniam inue-  
 nitur. ea acerrimo succo turget. cuius eximium feruorē  
 expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos, arbori cir-  
 cumligant, & eminus caulē contis incidunt. confestimq;  
 è plaga, perinde atq; uase quodam, in uentriculos copio-  
 sus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum,  
 uulnus ei aculatur. Duo succi genera. unum orobi ma-

gnitudine, sarcocollæ modo emicat. alterum in uentriculis concrefcit, atque uitreum fpectatur. Eligendum eft translucens, & acre. Euphorbium adulteratur farcocollæ & glutini miftione. fed difficile quidem experimentum. quippe cum leui gultu, os accenfum diu detineat, adeò ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium refpiciat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Diofc. Paulus drachmam unam exhibet euphorbij, cum melle cocto, ad pituitam & aquam educendam. Plinius tres obolos ex aqua aut mulfo. Rafis, Serapion & Auicenna, dicunt tres drachmas interficere. Quadriennio conferuatur. Mefuæ annuum perniciofum eft.

## F

Fax.



A E X eligenda maxime à uino uetere, Italico : fin minus, ab alio confinuli. Fax aceti uiribus longè acrior eft. Crematur ut alcyonium, antè diligenter ficcata. Sunt qui noua tefta igni largo urât, ufque dum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus profequuntur. Experimentum eft legitimæ uftionis, ut aërio nitore inalbefcat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ facis aceti ratio. Sed recenti utendum eft, quoniam celeriter exanimatur. proinde non nifi in recõditorio, & uafe aliquo reponi debet. Lauatur, ut pompholyx: & oculorũ medicamentis elotta, ut fpodos, adijcitur. Diofc.

Fel

FEL omne curatur hoc modo: Recens præligato ore Fel. folliculi lino tantū demissum in feruentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum percursaret, mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in uitreū uas, quod mel habeat, immittitur, circumuoluto ad os uasis lini principio: & operto uase reconditur. Efficacius fel marini scorpionis esse uidetur, & piscis callionymus, marinæ testudinis, hyænæq;: itē perdicis, aquilæ, gallinæ cādidæ, & syluestris capræ. quod priuim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. ouillo, suillo, hircino, atque ursino, taurinum multo efficacius. Diosc.

FICVS ex cinere tam syluestris quàm satiæ lixiuium fit crematis ramorum cauliculis: quod subinde macerari opus est & inueterascere. siquidem inter caustica intelligitur. Diosc.

FICI syluestris & satiui lacteo succo idem præstat Fici syluestris succus ē teneris ramis syluestris fici. qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur: & siccatus in umbra reponitur. Diosc.

FOENICULI succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperatur. Extrahitur succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi ramulisq; & radicibus prima germinatione incisus. In Iberia quæ ad occidentem spectat succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt,

igniꝑ; admouent, quò facilius ui calor is exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum. Dioscorides.

Confectio succi fœnogræci ex Aëtii  
libro septimo, capite 15.

Fœnum græcum.

FOENOGRAECVM diligentissimè purgari oportet, deinde plurimum ablui, postea in aqua dulci purissima die ac nocte madefactum in fictili exactè decoqui, uitariꝑ; in decoctione uas æneum. Postridie effusa priori aqua, & alia pura coniecta ad ignem splendidum fumo carentem decoquito. ideo uero primam & secundam aquam abijcimus, ut omnis inde amaritudo eximatur. tertio igitur purissima aqua adiecta, et exquisitissimè operata ad liquidioris mellis consistentiam decoquito, inde per linteum excolabis, fœnogræcum nequaquā exprimens, sed eo tantum succo contentus, qui sponte defluet, quem ad prædictos usus seruabis. Seruari autem in alteram diem, uel quàm longissimè in tertiam potest, ulterius enim moratus acefcit. Sed ubi ulcera satis purgata sint, à succo fœnogræci abstinebis. Cum hoc succo collyria dissoluuntur, ubi ulcera oculorum sordida sunt: & si abundent sordes, mel addetur. Lentorem habet, & relaxandi uirtute pollet. Hæc Aëtius.

Fucus marinus.

FUCI marini generibus uti humidis conuenit, prius quàm exarescant. Diosc.

Fuligo.

FVLIGO qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. siquidem ei palma tribuitur. Diosc.

Fumaria electio.

Meliorẽ FVMARIAM existimat Mesue, cuius herba

herba uiridis & tenera est, folia quoq; tenera & plana, & flos subuiolaceus. Et melius (inquit) tempus collectionis herbe eius & operationis succi ipsius est principium ueris: & seminis eius, finis ipsius ueris. Potio succi <sup>modus exhibitiois.</sup> fumi terræ, est Mesuæ, ab uncia media ad duas. Ego autem uix puto esse cuiquam tam mollem uentrem, qui ea quantitate leniatur. Auicenna usque ad octo uncias exhibet. Multi sunt qui Auicennæ etiam modum excedunt. Decoctum eius exhibetur ab uncijis decem usque ad quindecim. Et puluis à drachmis tribus usque ad quinque.

G



**G**AGATES præferendus, qui <sup>Gagates lapis.</sup> celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est plerumq; & squallidus, crustosus, perquam leuis. Vocatur locus in Cilicia & annis Gagas, in cuius faucibus y lapides inueniuntur, proxime oppidum Plagiopolin. Diosc.

**GALBANVM** succus est nascentis in Syria ferulæ, <sup>Galbanum.</sup> quod nonnulli metopium uocant. Maxime laudatur caritilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco.

Si purgare galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. nanque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt. quas hoc modo facile separabis: mundo lin-

teo raroq; alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pen-  
deat, ut imum uasis ne tangat: opertoq; uase in ferui-  
dam aquam demittito. sic enim sincerum, ueluti per  
colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit. Dio-  
scorides.

Galla.      GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis  
appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo fora-  
mine peruia. altera plana, leuis, perforata. Eligi debet  
omphacitis, quæ efficacior est. Diosc.

Gallinacei ve-      IVS è uetere GALLINACEO aluum deijcit. Ab=  
teris ius.      iectis itaque interaneis salem conijci oportet, & consu-  
to uentre decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad treis  
heminas redigantur. totum id refrigeratum sub diuo, da-  
tur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cni-

Galli gallina      cum, aut filiculam. Diosc.      Gallus in hunc usum eli=  
cei delectus.      gendus est rufus & antiquissimus (quo enim antiquior  
eo melior censetur) salax & in coitum pronus, pu-  
gnax, & animosus, mediocris habitus inter pinguem  
& macrum. Talem igitur Aletryona, id est galli-  
naceum gallum, diebus aliquot fursure cibato, uel ut con-  
sulunt alij, melle & modico sale, deinde ipsum cursu  
& uerberibus usque ad lassitudinem fatigato: nisi ma-  
lus eundem, contra alterum gallinaceum etiam pugna-  
cem & animosum, dimucanao defatigari. Mox abscis-  
so capite exenterandus est, & ut loquuntur, euisceran-  
dus, & modo quo supra ex Dioscoride annotauimus  
in aqua decoquendus. Mesue aquæ mensuram non præ-  
scribit, sed ex ea quantum satis est assumit, & coquit,  
ut eius uerbis utar, usque ad consumptionem duarum  
partium.



partium. Eius autem iuris siue decocti Dosis eidem est <sup>Dosis iuris</sup> circiter libras duas. Quæ certe quantitas nimium ex= <sup>gallinacei.</sup> cedit. Plinius decoquit gallinaceum hunc gallum decre= pitum in tribus congijs aquæ, donec reducatur usque ad tres cotylas.

GENTIANAE succi extrahendi ratio hæc est: Gentianæ Contusa radix quinque diebus aqua maceratur. postea <sup>succus.</sup> in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. & ubi refrigit aqua, linteo excolatur. mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: fictiliq; reconditur. Dioscorides.

GINGIBERIS radices eligi debent, quæ teredines <sup>Gingiberis.</sup> non nouerunt. A multis tamen ob id conduntur, quod celeriter cariem sentiant. Diosc.

GLANS unguentaria nascitur in Aethiopia, Aethiopia <sup>Glans unguentaria.</sup> gypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præ= fertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Dioscorides.

GLAUCIUM aliqui ex corniculati papaueris gene= <sup>Glaucium.</sup> re facilitari existimârunt, falsi quadam foliorum cognatione. Diosc.

GLUTINVM, quod xylocollan, alij taurocollan uo <sup>Glutinum.</sup> cant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. id candidum est & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Diosc.

ICTHYOCOLLA, gluten piscium, uenter est pi= <sup>Glutinum pi-</sup> scis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, sub= <sup>scium.</sup> asperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefit. Dioscorides.

**Gramen.** GRAMINIS quod in Parnaso monte gignitur succus, si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in ærea pyxide reconditur. Diosc.

## H

**Hæmatites.**



**HÆMATITES** optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suopte ingenio equalis, nulla sorde admista, nulloq; zonarum discursu. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. Modus ustionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant: Densam glebā rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices uocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorē reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & subinde conspicientes, periculū faciunt. siquidē in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primū scissilibus uenis. quippe in rectos uenarū discursus refringitur. at hæmatites longē secus se in colore habet. nanq; hic floridū reddit: hæmatites uero saturatiorē, atq; cinnabarī imitantē. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & ē magnete lapide, uehementer ambusto. in Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur. Diosc.

Helcnij

HELENII radix æstate foditur, particulatimq; dis= Helenius.  
secta siccatur. Idem stomacho utile in passo conditum.  
siquidem salgamarum paululum siccata[m] radicem, mox  
decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam con=  
ijciunt, & ad usus recondunt. Diosc.

HERMODACTYLVS ille melior censetur Me= Hermodacty  
sue, qui & foris & intus ualde cãdicat: qui crassus est, lus.  
& moderatam habet duritiem: quique iuxta Scyllam electio.  
aut Raphanum crescit. Rarus uerò, laxus, & leuis, im=  
becillis est uirtutis. At rubri & nigri mali eidem existi=  
mantur. Item qui in locis pinguibus, aut humidis nascun=  
tur. hi enim superflua ac flatuosa humiditate scatent.  
Tempus autem legendis Hermodactylis magis accom= tempus legẽ  
modum est uer. Itaque hoc tempore collecti Hermoda= dis Hermoda  
ctyli, in usum ante annum dimidium non ueniunt assu= ctylis accom  
mendi, ut Arabicæ familie scriptores consuluerunt. modum.

Cæterum cum dicit Mesue de rotundo Hermodacty Hermodacty  
lo tanquam de meliore se sermonem habiturum, id sanẽ lus rotundus  
intelligendum est. Nempe Hermodactylum rotundum, Mesue.  
qui Colchicon est Ephemerum, meliorem ac perfectio=  
rem esse, quod ad ea ad quæ ualet pertinet, ut puta ad ar  
ticularios dolores. Dosis Hermodactyli ipsi Mesue dosis.  
ab aureo uno usque ad duos. Interius autem uellicat, &  
grauem stomacho exæstuationẽ adfert, mustamq; cruo=  
rem strigmentis in aluum depellit.

HORMINVM syluestre magis uiribus pollet. Horminum.  
Dioscorides.

HYOSCYAMI tres differentie sunt. una semine ni Hyoscyamus  
gro: floribus penè purpureis: smilacis folijs: cytinis

prædurus, & spinosis. alterius semē subflauum, ut irio-  
nis: flores lutei. folia, & siliquæ simpliciores. ambo ma-  
saniam gignunt, & soporem. ideo in communi usu dan-  
nantur. tertium genus, ut quod mutissimum esset, medici  
recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris se-  
minisq; in maritimis ruderibusq; nascens. cuius occasio  
si non adsit, rufum usurpari oportet. niger, ut deterri-  
mus, improbatur. Recenti senune, caulibus folijsq;  
tusis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, u-  
sus ad annum usque prorogatur. nam facile corruptio-  
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim  
in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem suc-  
co lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contu-  
sa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pa-  
stillos, & reconditur. Diosc.

**Hypocisthis.** HYPOCISTHIS, erythranon, aut cytinus à nōnul-  
lis cognominata, iuxta cisthi radices nascitur, floris pu-  
nici similitudine. quædam flaua. altera uirens. tertia can-  
dida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant,  
fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in lycio  
prosequuntur. Vires acaciæ habet. uerum aliquantò ma-  
gis siccatur, & astringit. Diosc.

**Hyssopum.** HYSOPOVM præfertur Hippocrati Cilicium, sed  
è Tauro monte. dein Pamphiliū, & Smyrneum. Ea  
delectus. hyssopus melior est Mesuæ, cuius odor & sapor acu-  
tiores sunt. ex utroque genere (scilicet hortensi & mon-  
tano) magna eidem præfertur. Tempus autem hyssopo  
colligendo accommodum est, dum incipit florere.

Decoctus ad tertias hyssopi manipulus cum sale, uel

contritus cum oxymelite & sale, pituitas trahit, Plinio. Decoctum uero cum aceto mulso, crassum humorē per aluum extrahit, Dioscoridi. Ad aluum quoq; subducendam cum ficis uiridibus detritis, eidem manditur. Decocti eius potio Mesuæ est, à drachmis sex usque ad dosis. decem, & pulueris eiusdem quantitas, à tribus drachmis usque ad septem. Manardus maiorem longè quantitatem posse tuto dari arbitratur.

## I



INDICI duo genera. Vnum Indicum. sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. alterum insectoriarum dant officinae: & est spuma purpurea innatans cortinis, quā detractam artifices siccant.

Optimum existimatur, quod cœrulei speciem præbelet, succum suum sorbet, & læue est. Diosc.

IRIDI radices subiacent geniculatæ, duræ, odoratæ Iris: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Teredines in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Diosc. Iris laudatissima apud Illyrios exit, non tamen maritima, sed parte mediterranea, septentrionalibus obuersa, ubi radices color subrufus, ut in Libyca candidius apparet.

Præfertur Mesuæ Iridis radix cæcidea, ruboris quodammodo particeps, grandiuscula, dura, spissa, Violam odore referens, sapore acuto & mordicante, & ( ut inter =

terpretis uocibus utar ) habens nodos breues collectos.

In Gallia funiculo traiectas Iridis ( quam Flamman-  
t uocant ) radices, lixiuo macerant, ad exhauriendam suc-  
ci uum, quo linearum iniurijs, quibus sunt opportuna,  
munus pateant: dein siccatas recondunt. Plerique sic cu-  
ratas armarijs indunt, ut suo perquam iucundo odore  
dos. uestes commendent. Dosis radicum Iridis Mesuæ est  
à drachmis duabus usque ad sex. Dioscorides drachmas  
septem exhibet ex hydromelite. Paulus uero obolos o-  
cto dicit purgare, ut Agaricum, modo non sit antiqua  
aut perforata. Alijs, duabus tantum drachmis cum melle  
sumptæ aluum soluunt. Pro Illyrica aut Macedoni-  
ca, Florentina hodie assumitur. Inter Illyricas & Ma-  
cedonicas quæ meliores sunt, laudatissima putatur Dio-  
scoridi quæ pumili ferè & densa constat radice, fran-  
genti contumax, subrufa colore, gustu amaro, odore  
perquam suauis ac sincero, ita ut nullum prorsus situm  
redoleat: quæ dum tunditur sternutamenta mouet. Se-  
cundum locum habet eidem auctori Africana, candidâs,  
gustuq; amara.

Iris florētix  
vulgo.

Iuncus odo-  
ratus.

IUNCUS odoratus, in Africa & Arabia nascitur.  
Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quē  
aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessi-  
mus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus re-  
fertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus con-  
fricando rosæ odorem emittit. igneæ mordacitatis ad  
linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Diosco-  
rides.

## L



**L**AC probatur candidum, æquæ Lac. li crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Ex omni lacte fit, quod schistum, id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparfis, postquam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt hemine lactis. ita enim serescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sextariumq; argenteum frigida aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Diosc.

**LACTVCAE** syluestris succus ad eadem ualet, sed Lactuca syluestris. uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

**LADANVM** fit ex altero genere cisthi, quod ledon Ladanum. aliqui uocant. Siquidem cum cisthi frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant. quam depectentes incolæ, colantesq; cogunt in ofas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinofum. quale in Cypro gignitur.

tur. Arabicum uerò Lybicūq; uilius. Diosc.

**Lana, & lana rû medicina.** Succidæ LANAE molles è collo, fēmunibusq; laudatissimæ habentur. Crematarum lanarum cinis medicamentis exquiritur. Vruntur autem mundæ, & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more. Nec secus fimbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Alii cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eo denique modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succedunt, & uistas tollunt. Quod si è teda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur: idq; sæpius, mutantes aquam, donec linguam astringat, nec mordeat. Diosc.

**Laserpitium.** LASERPITIVM in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum uocāt. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustati nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosum reddunt odorem. Laser omne antè quàm siccescat, adulteratur sagapeno, aut sabæ lomento. quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem

magu=



māgudarīn, & folia maffeton uocauere. Efficaciſſimum laſer, mox folia, poſtremo caulis. Dioſc.

**LATHYRIDIS** ſuccus tithymalli modo exceptus, Lathyris. eundem effectum præbet. Dioſc. Grana huius ſe-  
ptem aut octo denorata, aut pota, aluum purgant. Hæc rum catapo-  
cum ficu ſicca, uel palmulis ſumuntur Dioſcoridi. Sed tie minoris,  
aqua frigida poſtea ſorbenda. Multis abundè grana id eſt lathyri-  
tria uel quatuor uentrem deiiciunt, ut quotidiana ruſti-  
corum experientia diſcitur. Quòd ſi hæc uera ſunt, ſu-  
bit admirari quomodo Lathyris grana uicena in aqua huius ſenten-  
tura, aut mulſa ſemel pota, hydropicos ſanare quidam tie fuit plini?  
memoriæ prodiderunt. Nimis enim excellere mihi hæc  
doſis uidetur. Folia cum gallinaceo iure, aut oleribus de-  
cocta, eandem habent ſemunibus operationem, ut nobis  
auctor fuit Dioſc.

**E LENTISCO** liquamentum ita fieri ſolet: Folia, Lentifcus.  
cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abundè co-  
cta refrigerataq; ſunt, folia abiiciuntur. aqua denuo co-  
quitur, donec mellis habeat craſſitudinem. Dioſc.

**LIGVSTICO** pro pipere utuntur indigenæ, ad Liguſticum.  
obſonia. Adulteratur ſemine quodam ſimili. quod facile  
guſtu diſcernitur: amarum enim eſt. Alij ſemen fœnicu-  
li aut ſeſelis aduſcentes, liguſticum dolo uitiant. Dioſc.

**LILII** foliorum ſuccus adiecto melle aut aceto in Liliū.  
æreo uaſe coquitur, ad ulcera uetuſta, & recentia uula-  
nera. Dioſc.

**LORA**, quam deuteriam, alij potimon appellant, ſic Lora.  
ri ſolet, adiectis metretis tribus aquæ, in uinacea, quibus  
triginta uini metretæ extractæ fuerint: calcatis umaceis,  
expres-

expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra annum utendum. etenim celeriter exolefcit. Cōuenit ægris quibus timemus noxam uini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare. item à longa uoletudine se recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocant, loræ uires habens, hoc modo: Pares aquæ & musti mensura coquantur molli igne, donec absumatur aqua. quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Aly mærinæ & cælestis aquæ, mellis & musti pares miscentur portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Diosc.

**Lycium.** LYCIUM nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. aspera loca amat. Succitrahendi ratio hæc est: Ramu cum radiculis tusi & antè per multos dies macerati coquantur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumq; rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine adstringens, crocino colore, cuiusmodi Indicū est, cæteris præstantius. Diosc.

**Lyncis vrina.** LYNCS urinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coiræue in calculi duritiam,  
uulgo

vulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. est enim quod à nonnullis uocatur succinū pterygophoron, quod pēnas alliciat. Diosc.

## M



**A G N E S** lapis optimus, qui Magnes. ferrum facile trahit, colore ad cœruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Diosc.

**M A L A B A T H R V M** arbi- Malabathrū. trantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris congnatione. permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. secus autem res se habet. Nauque malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, siue radice. Id collectum statim lino transsuilur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, delectus. integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in suaui odore permaneant, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirnum uerò & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Diosc.

**M A N D R A G O R A E** succus fit è cortice recentis ra Mādragoras dicis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concre-

uerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiecit lino cortex, ad usum suspenditur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo uase recipitur. liquamentū autem succo lacteo præstantius est. sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Diosc.

Manna. MANNA illa optima censetur, quæ recens est, splens  
 Δροσόμελι. dens & candicans, gustu melleam dulcedinem repræ-  
 ἀνδρομέλι. sentans, nullos surculos aut foliola implicans. huic pro-  
 delectus. xima est subcitrina. pessima est fusca, cœnosa, antiqua.  
 Adulteratio. Impositores Mannam adulterant cum saccharo & folliculis senæ. Sed fraus detegitur, quod procedente tempore mollescit, & liquescit. Itaque tametsi Manna ijs quibus infederit ita pertinaciter aliquando hæreat, ut non nisi cum fragminibus eorum decerpatur, ad dolum tamē euitandum, præstat eam eligere quæ nullis lignorum aut  
 dosis. foliorum fragmentis admixta est. Dosis Mannæ Serapioni est à drachmis decem ad uiginti: Mesuæ à drachmis sex usque ad quindecim: Alijs ab uncia una dari potest ad uncias tres.

Marrubium. MARRUBII succus folijs tuis exprimitur, & sole cogitur. Diosc.

Lentiscina. Lentiscus resinam gignit, quæ LENTISCINA cognominatur, & ab aliquibus MASTICHE. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur nitedula modo resplendescens, & candore Tyrrenicæ ceræ similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris  
 Mastiche. resi-

resinæq; pineæ nucis mustura. Diosc.

MEDULLA laudatissima est ceruina. mox uitulina. Medulla. post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus. quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Curantur recentes, adipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, donec aqua sincera emanet: & deterasa sorde pinna, siqua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimentur. & ubi coiere, omni sæce, quæ ad ima sidit, deterasa, fictili nouo reponuntur. quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipē demonstrauimus. Diosc.

Principem locum obtinet MEL, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hyblæum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Primatum tenet in mellis genere uernum. deinde æstiuum. hybernum uerò, utpote quod crassius constat, deterrimum reputatur. ceraginis halitum expirat. Diosc.

MELANTERIA geminæ est originis, quædam in Melantheria. faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo, con crescit. alia uerò in summa facie supradictorū locorum coit, quæ terrena est. quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat,

quæ sulphuris colorem trahit, lævis, pura, æquabilis,  
 & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causti-  
 cam eam obtinet, quam & misy. Diosc.

Melilotos, si-  
 ue Sertula câ-  
 pana.

MELILOTOS, siue SERTULA Campana lau-  
 datissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata, cu-  
 ius color uicinus est croco, boni odoris. Nas citur & in  
 Campania circa Nola, colore in luteum languescente,  
 odore infirmo. Diosc.

Misy. MISY assumendum natione Cyprium, auri simile,  
 durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ mo-  
 do splendet. Vim habet & ustionem cum chalcitide ean-  
 dē, præter quàm quod psoricū ex eo non conficitur, ex-  
 cessus defectusq; ratione tantū diffrens. Aegyptiū autē  
 cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur. sed ad  
 ocularia medicamenta multo supradictio inferius. Diosc.

Molybdæna.

MOLYBDÆNA optima est flaua, argenteæ spumæ  
 æmula, modicè splendēs, cum teritur rufa, cocta cū oleo  
 iocineris colorem trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colo-  
 rem plumbeū refert. Gignitur ex auro, & argento. Est  
 etiam quædā fossilis ad Sebastia, & Corycū inuēta, quo  
 in genere probatur, quæ lapidosa nō sit, aut recremen-  
 tosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut  
 recremento plūbi simulē. Vritur, lauaturq; eodē modo.

Mori succus.

MORI succus. decoctus autem æreo uase atq; insola-  
 tus, adstringētiore redditur. Diosc. Sed inolefcit uis eius,  
 adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha. itē my-  
 ricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma sic-  
 cantur, tusaq; acinorū rhois uice obsonijs nuscuntur, ut

Mori radix. coeliacos iuuent. MORI radix circiter mēse incisa, fa-  
 cto in

fit in ambitu scrobe, succum emittit, qui poſtridie concretus inueniri ſolet. Dioſc.

BRYON, id eſt MVSCVS, à quibuſdam ſplachnon Bryon.  
appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu in= Mufcus.  
uenitur. Optimum eſt cedrinum: proximum populneū.  
in quo genere candidum & odoratius præſtat, nigri-  
caus improbat. Dioſc.

MYROBALANI lutei ſeu flauī, quos citrinos vo= Myrobalani  
cant, ex herbaceo colore flaueſcentes, eligendi ſunt ſpiſ= vel myroba-  
ſi, graues, ſeu ponderoſi, exili nucleo, cute craſſa, & lana ſecundū  
gummoſi. Cepuli, deligendi ſunt, ampliores, grauior= Arabes.  
esq; ex fuſco ruſeſcentes, hoc eſt ſubnigri, uergentes Μυροβάλανοι.  
ad ruborem, carnoſi, ſpiſſo cortice. Empelitici, ſiue Cepuli. 2.  
emblici eligi debent, cute oſibus hærente, lapillorū pe= Empeliici. 3  
nè figura, carne ampliore, minutis oſibus, denſi & gra-  
ues. Belethzici, eadem quaſi forma ſpectatur qua em Belethzici. 4.  
pelitici. eligendi ergo ſunt maiores, craſſiores, cortice  
denſi, & pōderoſi. Nigri, quos à colore cœruleo uul Nigri. 5.  
gus Indos nominat, eligendi ſunt ſolidi, ſine nucleis, oli-  
uæ forma, ponderoſi. hi à recētiore Græcia Damafonij  
uocitantur. Ea omnia Myrobalanorū genera ſeu dif-  
ferentiæ, ab officiis oſtenduntur. Quibuſdā genere neu-  
tro eſſeruntur, & hoc ordine digeruntur, Lutea ſeu fla-  
ua, Inda, Cepula, Empelitica, Belethzica. Doſis My doſis.  
robalanorum eſt à drachmis duabus ad ſemunciam, uel  
drachmas ſex in infuſione: & à drachma una ad duas  
in ſubſtantia, ut uoluit Meſue. Myrobalani Actio, bi-  
nūm, aut ternūm denariorū pondere triti peculiariter ſu-  
peruacūū capitis humorē exhauriunt: ſed flaua, bilē fla-

uam : atrā, nigra detrahunt: quēadmodū pituitā cepuli.

Myrrha. MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis . è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes . alia circum caudicem concrefcit . Dicitur ex his aliqua pediasimos , præpinguis, quæ expressa, stacte enuttitur . alia gabirea, pinguisſima, leto & pingui solo nascens . ea copiosam suadat stacten .

Myrrha troglodytica. latatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordēs . quinetiā legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens . Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrída . Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima . improbatur aminnea cognomine . ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati : è sicciorebus haudquaquam pingues, & inodorati . minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur . Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit . Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguū modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens . superuacua & inutilis est pōderosa, coloris picei . Diosc .

Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & , ut postea ostendemus, ad eadem conueniens . Diosc .

Myrrha Bæotica.

Bæotica MYRRHA , dissecta radix est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis . Melior est quæ myrrham odore



odore representat. Diosc.

MYRTI baccis uirentibus succus exprimitur, item Myrtus. folijs adfuso uetere uino aut aqua coelesti. Cuius recens-  
tis usus est. Nam exiccatus planè cariem sentit, & uires  
amittit. Diosc.

MYRTIDANVM dicitur adnatum inaequabile, uer Myrtidanū.  
rucosum intumescensq; & concolor. quod perinde quā-  
si manus myrti caudicem amplectitur. magis quā in myr-  
tus adstringit. tusum addito austero uino reponitur, coa-  
ctumq; in pastillos siccatur in umbra: multo efficacius  
& folio & semine, cerato, pessis, in seffionibus, cataplas-  
matis admustum, ubi adstringendum aliquid est. Diosc.

N



ARDI duo genera: unum In Nardi gene-  
dicum, alterū Syriacum appella-  
tur, nō quòd in Syria proueniat,  
sed quòd montis in quo oritur,  
pars una ad Syrios, pars altera  
ad Indos flectitur. Ex hoc Syria-  
ci genere præcipuum est recens

& leue, largā gerens comam, flauum colore, perquā  
odorum, ac cyperū redolens, breui spica, amaro sapo-  
re, linguā siccante, quod diu in sua odoris gratia perma-  
neat. Ex Indicis autē nardum quoddam Gangitis uoca-  
tur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præ-  
terfluente. quod genus ob multā loci, in quo prodit, uli-  
ginem, uiribus infirmus est, atq; procerius adolescit, plu-  
res serēs spicas ab unica radice, comosas, unaq; conuolu-  
tas, ac grauter olentes. Montanum autē odoratus, spica

breui ac mutila, odore cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum uirus supra modum redolente, quod improbat. Madefactum uendi solet. quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica & squallida, nulloq; puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua aut palmeo uino, inspissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si luteum radicibus insideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Diosc.

Nardum Celticum.

NARDI Celtici cauliculatorum & radicū duntaxat usus est, & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidē utile, cū aceroso, alienoq; propter humoris uini, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanque herba cādidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti uerū nardum est. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti seceruntur, uino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligēter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recēs, iucūdi odoris, radice numerosa coherens, plenū, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacū pollet: sed uehementius urinā cit, & stomacho utilius est. Diosc.

Nitrum.

Præfertur NITRVM leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddam. quale ex Bunis affertur. Diosc.

NITRI

NITRI spuma optima esse putatur, leuissima, glebo- Nitri spuma.  
sa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mor-  
dens. qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. secūda est  
Aegyptia. quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim  
& uestionem salis habet, tam nitrum quàm spuma eius.  
Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa  
noua, donec incandescant. Diosc.

## O



ENANTHE uocatur uitis Oenanthe.  
syluestris fructus, cūm floret.  
Recondi debet fictili non picato,  
collectaque, substrato linteo,  
in umbra siccatur. Laudatissima  
in Syria & Cilicia & Phœni-  
ce. Diosc.

OESYPVM uocant Græci, succidarum lanarum pin Oesypum.  
guitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ mol-  
les, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & qui-  
buscunque sordibus expressis, & in labellum oris am-  
pli coniectis, aqua infunditur, magnôq; impetu ligula, uti  
respumet, agitatur, aut lignea rude ualidiusculè contur-  
batur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde  
marina respergitur. & cōsidente pingui quod superna-  
tabat, collectoq; in altero fictili uase, denuo aqua in label-  
lum fusa agitatur. spuma iterum mari persunditur, &  
demum eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consum-  
pta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. collectum  
æsypum manibus emollitur. & si qua insedit spurcitia,

confestim dematur. exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguae assu-  
pum, adstringat leuiter, nec mordeat: atque pingue can-  
didumq; spectetur. tum in fictili uase conditur. Verum  
omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue fri-  
gida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum  
mulieres, confricant. ita enim candidius redditur. Alij  
clotis lanis & sordibus quibuscunque exemptis, ac len-  
to igni in aeneo uase ex aqua decoctis, pingue quod su-  
pernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq;  
in fictilem patellam, quae calidam aquam contineat, lin-  
teo operiunt, atque soli mundant, donec candidum fiat,  
& satis crassum. Alij bidui spatio aqua effundunt, no-  
uamq; adiiciunt. Melius est laeue, radícula non curatū,  
quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fri-  
cetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut con-  
creti habens. ueluti quod cerato aut adipe adulteratur.

Oesypum in testa noua torretur, donec redactum in ci-  
nerem, pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligi-  
tur, uti demonstrauimus. quae in oculorum medicamenta  
commode addi solet. Diosc.

Oleæ æthio-  
picæ lachry-  
ma.

OLEAE Aethiopicæ lachryma scammoniae similis  
est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. quae autem  
ammoniacy aut gummi similitudinem refert, colore ni-  
gricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates  
oleæ, oleastrisq; similem lachrymam sudant. Appella-  
tur autem Aethiopica, & agrestis olea. Diosc.

Oleum can-  
didum.

OLEVM candidum fit hoc modo: Album colore nec  
anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur,  
centum

centū heminarum mensura, & sub solē media quaq; die cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agitatū respumet: octaua die fœnumgracū mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactū donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua. postea tedæ præpinguis piceæ, assulatim casæ æquale pōdus adijcitur, & transfactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Cāpanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere. sin munus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usque dum inalbescat. Diosc.

OLEAE syluestris exprimitur succus tuis folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastillos digeritur. sed longè ualidior ad recondendum succus habetur, qui cum uino quàm cum aqua expressus est. uruntur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, usque dum figlinum percoquatur. restinctaq; uino & rursus subacta, eodem modo uruntur. postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiue oleæ eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior. unde ocularibus medicamentis ob suam mtiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, siue fures, & scabiem. Diosc.

OLEI sicyonij componendi ratio hæc est: In lebetem Oleum Sicyonij.  
oris

oris lati stanno inductum, funditur olei albi quod crudæ oliuæ reddiderūt, congius unus, aquæ semicongius. leui id igne coquitur, leniter mouendo. at ubi bis effebuit, & substracto igne refrixit, innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua conseruescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maximè fieri consuevit, Sicyony inde accepto cognomine. Calfacloriam ad quendam usque modum uim habet. Febri ac neruorum uitijis prodest. fœminæ ad commendandum faciei nitorem eo utuntur. Diosc.

Oleum omphacinum. Omphacinum appellatur OLEVM, quod ex immaturis oliuis exprimitur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Diosc.

Omphacium OMPHACION, succus est acerbæ uuæ, nondum maturefcentis è Thasia uite, aut Amunæa. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, in sole, usque dum cogatur: semperq; quod ceruici uasis cōcretum hæsit, reliquo humori permiscere. noctu a subdialibus locis in lectū referri. quandoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, uehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Diosc.

Opium. OPIVM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coëat, & in sole diffundatur. dein admotum lucernæ, non atra luceat flamma, extin

extinctum deniq; odoris uim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum, splendescit, & infirmū est. Nec desunt qui eò dementiæ deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diosc. Vide plura in PAPAVERE.

## P



**PALMA**, quam aliqui Elaten Palma elate. aut Spatham appellant, fructus Spatha. palmarum adhuc florētium, inuolutū est calyxq; .quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Inuolutusq; in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit quæ borassus. Diosc.

**Nuclei PALMARVM**, cæterorum more cremati Palmarum in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. muscenturq; in calliblephara. quod si non iustam uestionem acceperint, denuo cremandi. Diosc.

**PANACES** nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedo Panaces. nia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulū pullulatu. ea candidū succū emittit, qui siccatus in summa cute **croceum**

croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simuli modo caule mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentibus gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est. sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quam amarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclians, læuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquefcens, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluator, & lactescat. Dioscorides.

**Pancratium.** — PANCRA TIVM scillæ uires & præparationem habet. eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. cui tamen mitior quàm scyllæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissimè dantur. Dioscorides.

**Papaueris calyces.** — PAPAVERIS calyces tunduntur uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coëat in eclegmatis lentorem. id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen redditur, addito hypocisthidis succo, & acacia. Dioscorides.

**Papaueris nigri capita &olia.** — DE MECONIO & OPIO. Aliqui capita ipsa, nigri



nigri PAPAVERIS & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. id Meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij Meconiũ & Opium. faciundi ratio hæc est: Cùm ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summa cute incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur. Diosc.

PEPLI fructus tusus & seruesactus reconditur. Peplis.

Pepli semine poto, aluus soluitur. Media potio est dos. acetabuli mensura in aquæ heminis tribus: & cibus inspergitur, obsonijsq; ad molliendam aluum. Peplis colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet uires. Diosc.

PEPONIS succus cum semine, adiecta farina, sic Pepocatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgat, & nitorem afferunt. Diosc.

PEUCEDANI tenera radix cultello conciditur, Peucedanũ. profluensq; è plaga succus umbræ mandatur. in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiat. assatione radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora. uerum inefficacior succo lachryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhæ

adhærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufò, odore graui, feruens gustu. Diosc.

Phrygius lapis.

PHRYGIUS lapis, quo insectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiusq; carbonibus obrutus, perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. rursus extractus eodem uino restinguitur. hoc iterum & trinis uicibus faciendum. attendendū tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Lauatur ut cadmia. Diosc.

Phu.

PHU adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia. Diosc.

Piceæ & Pini fuligo.

PICEAE & PINI fuligo ad calliblephara, & librarij atramenti confectiōnem excipitur. Diosc.

Picis liquidæ fuligo.

PICIS fuligo liquidæ fit hoc modo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamq; fictili uase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Diosc.

Picinū oleū

E pice fit quod PISSELLAEON appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quādiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. Diosc.

Piper

**PIPER** nigrum, utpote quod tempestiua maturitate Piper nigrū. collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. sed candidum, & adhuc in acerbum uergens, albo & longo infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime fursuosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimūq; ponderis, quod uocant brasma. Diosc.

**PISCIVM** fluuiatilium pingua perunctis oculis clariore Piscium fluuiatilitate adferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Diosc.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum que PISSASPHALTOS appellatur. Ea Ceraunij Pissasphaltū. montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas. mustam bitumini picem redolet. Diosc.

**PITYVSAE** (alsebram uocat Mesue, nostri esu= Pityusa. lan) corticis radicis dosis est, à ceratij duobus usque ad dosis. septem, & lactis ab uno ad tres. Quæ nimis est exigua quantitas. Dioscorides namq; radicis pityusæ drachmas duas, fructus unam, succi cochlearium, foliorum ternas drachmas exhibet.

**PIX** arida. liquida pix decocta in spissam coit, quam Pix arida. uocant aliqui palimpissam. quo in genere quædam uisci modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Probatior pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Diosc.

Plumbum  
elotum.

Lotura PLUMBI sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limu modo crassescat, aut lutulenta reddatur. lin- teolo deinde colato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit, priore aqua effusa, nouam adiiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia. postea in pastillos cogens re- ponito. Quidā scobem mundi plūbi lima quæ sitam, mor- tario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cū aqua pau- latim adiecta fricāt, donec nigrescat. mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum uehe- menter, cerusæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modi- cam plumbaginem adiiciunt; affirmantes ita elotu plum- bum præstantius esse. Diosc.

Plumbum  
vfitum.

Vritur PLUMBVM sic: Super quā tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphu- re, usque dum uas expleueris, succendito. flagrante au- tem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfectè rediga- tur in cinerem, nihilq; ē plumbo non ustum hæserit. tum demū, obstructis naribus, eximuto. alioquin halitus plum- bi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut di- ctum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sul- phure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula fer- rea cōtinuē mouent, dum in cinerem soluantur. sed diffi-  
cilis

cilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorē. magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

PLUMBI recrementum, quod scoriam uocant, optimi Plumbi recrementum est, densum, fractu cōtumax, cerusam planè repræsentans, nihil plūbosi habēs, quod ad luteū colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbū exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteū colorem duxit. idq; sæpius, dum recrementum absumatur. dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur. Diosc.

POLIVM melius est montanum. Diosc. Polium.

Melius & efficacius est POLYPODIVM quod in uetustis arborum, & maxime montanarum quercuum nascitur, quàm quod in petris inuenitur. Hoc enim superfluam habet humiditatem, & (ut inquit Mesue) indigestum, quæ flatu, nauseam & stomachi subuersionē excitat. Illi autem querno Polypodio bonitatis notas octo Mesue attribuit, sed obscure multum, & non conformiter bonus auctoribus. Deligendum itaque censemus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, quas illi suprà ex Dioscoride & Plinio assignauimus. Dosis Polypody est Mesuæ à drachmis duabus usque ad aureos quatuor. Aëtius expurgatæ radicis scrupulos sex,

qui in aqua mulsa præferbuerint, exhibet. Orib. drachmas duas coquit in ptisanæ succo, datq; bibēdū succum. Sunt qui unciam integram sine noxa dederunt.

Pompholyx. POMPHOLYX specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem SPODOS nigricat, & plerumque ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum paumentis & fornacibus eueritur. Pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. unum ad æris colorem uergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiundo ære, fabri præstantiorem facere uolētes, detritam cadmiam cumulatiùs insparserint. Namq; tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygē coit. Cæterum pompholyx non ex æris modò materia & fabrili industria factitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè follibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemuna contignatione operata, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat. domucily paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis narem. ostiū mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idē negotium obit infēnē artificis minister, simulq; carbonēs

nes adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absu-  
matur. itaque egesta suffitu tenuis pars & levis materiæ  
in summam domum euolat, & parietibus, tectis, forni-  
ciq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter ini-  
tia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea  
maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum si-  
mile redditur. ponderosus autem in ima loca se recipit.  
sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento  
coheret. quod tenuiore deterius existimandum est, ideo  
quod multum terræ collegerit, & spurcicia in acerua-  
tione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spo-  
dium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima credi-  
tur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, co-  
lore aliquantum piceo, sapore cœni horrido: & si frau-  
dem non experta flagranti carbone inferuescit, aëreum  
colorem contrahit. Antedictis autem notis, diligenter at-  
tendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur tauri-  
no glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis  
grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cogni-  
tu fuerit, quippe nihil in ijs probādis inuenietur eorum,  
quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita laua-  
ri oportet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut  
siccā, aut aqua respersā, in labellum demittito, quod  
imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum defe-  
rens, immergito. ita enim limosa pars eius ac utilis ef-  
luet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea  
residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & no-  
uam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper  
aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat. demum aquam

exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quantum maxime fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imutetur. deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, coalant: & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, & si cili nouo ad usus recondunt. quod uerò resedit, sensim cribratū, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. cæterum cinerē medium separant, & in pilam coniectū, ut caduam, eluunt. Quin etiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos suprà diximus. & ita redditur adstringentior, quàm as-

Spodium. quis elota. Quòd si spodon torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictilique nouo, subiectis leuibz prunis, orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodion. uerum post Cyprum, plumbeum maxime commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simul uirtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antispoda uocant: quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina haben

ne spodij succidaneis.



habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. iterum in fictile aliud crudum transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit è termite sylvestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut mális cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis, itē ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodē modo parant. alij taurinum gluten. alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spodij uicem usurpantur. Diosc.

POPVLVS resinam fundit, quæ in malagmata additur. Populus.  
Lachrymam populorum commemorant quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocāt, alij chrysophorum. id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. Diosc. Propolis.

PROPOLIS eligi debet flaua, odorata, styracē referēs, in uehemēti ariditate mollis, et mastiches more ducti delectus. Propolis.  
lis. In alueariorū foribus, cerosæ naturæ inuenitur. Dio.

PRVNIS prima laus à Damasco Syriæ monte cognominatis, tribuitur, nigra cute, carne suaui, rotundo Pruna.  
ligno, exili nucleo. Hæc iam pridem, ut Plinius inquit, in Italia nascuntur. Proxima datur (Ibericis) quæ ab Iberia & Hispania deuehuntur. Inter Damascena optima Pruna.  
censentur Galeno, quæ sint mediocriter adstringentia, magna & laxa. Decocta in melicrato, plus mellis habente, uentrem molliunt, magisq; si melicratū superbibatur:

dehinc uinum dulce, & prandium differatur. Aluū etiā  
 Pruna pran- cient si sola manduntur: sed prandiū inchoare debēt. Sa-  
 dium inchoa- tus autē est decocti prunorū tam satiuorum quā sylue-  
 re debent. strium singulos cyathos sumi. Sed syluestria aluum &  
 modus deco- tormuna sistunt, præsertum in uino austero decocta. Me-  
 cti prunorū. sue decoctum prunorum exhibet, usq; ad libram unam.  
 Porrò quo dulciora sunt pruna, eo magis uentrem emol-  
 lunt. Ea Græcis (coccymella) nomenclantur.

Pforicum. PSORICVM. uide CHALCITIS.  
 Psyllij gene- PSYLLIVM. Recētiore duo eius genera statuerūt.  
 ra duo apud unum calamo exili & longo, in cuius spica cōtinetur se-  
 recentiores. mē, pulicis colore, et magnitudine. Alterū sarmētosum,  
 floribus canino capiti simulibus, fabaceis capitellis, semi-  
 ne pulicis effigie, radice tenui & superuacua. Psyllium  
 Psyllium ma- maxime cōmendatur semine, in medicina: Plurimo enim,  
 xime cōmen- inquit Aëtius, usui est. Psylliū ueteres neq; Græci, neq;  
 datur semine Latini, per os exhibuerunt, sed extrinsecus tantū ad mol-  
 liēdū refrigerādūq; imposuerūt. Modus parādæ mu-  
 scillaginis Psyllij, ex Tralliano & Aëtio est requirēdus.

Pumex. PVMICIS probatio, ut magnopere leuis, spongio-  
 sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus.  
 Crematur flagrantissimus carbonibus obrutus, & ubi can-  
 duerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq;  
 incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per  
 se refrigeratus, ad usus conditur. Diosc.

Punicum mā- P VNICI māli domestici & syluestris flores, id est,  
 lum domesti- cytini & balaustia exprimuntur, ut succū remittant, in-  
 cum & sylue- star hō pocisthidis, cuius etiam uires referunt. Diosc.

Pycnoco- PYCNOCOMI succum si libet eximere, tusa radix  
 mon. in fictili

in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat pinna selectum, exiccatur. Diosc.

**PYRITES** lapidis genus est, à quo æs confiatur. Pyrites. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. delectus.

Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna, continuo flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; recoditur. Si cloto opus sit, lauari debet ut Cadmu. Diosc.

R



**RESINA** liquida è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet. atque olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomentum uendicauit. A Gallia quoque subalpina: quam uernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi ueteri. Colore inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine: ut la rigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissimæ, translucens, non retorrida, neque diluta, quandam

Resina liquida è pinu & picea.

electio.

*cera faciem præbēs, & friabilis. E picea & abiete resina, cæteras antecedunt. odorata enim sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pytiusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ sumi solent. Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in uase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum uocant, id est non illitum, reconditur.*

*Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò faculenta sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne: & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquuntur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox, ut dictum est reponuntur. Aridas unius diei spatío decoxisse satis est. Fuligo è resina perinde atque thure excipitur. Diosc.*

Rha barbari  
apud mesuen  
tri genera.

**RHABARBARVM.** Tria eius genera fecit Mesue: Indicum, quod rauedsceni appellat, omnium optimum. Barbarum, quod secundum in bonitate locum obtinet. & Turchium (ita enim uocat) multo alijs inferius & inefficacius.

boni Rhabar  
bari notæ.

Laudatur Rhabarbarum Mesuæ,

I Subnigrum vergens in ruborem.

Graue

- 2 Graue cum sua raritate.
- 3 In quo dum frangitur, inuenitur disgregatio, ex rufo & glaucò.
- 4 Quod colorem reddit ad crocū inclinantem.

Non eget correctione, quæ fit per spicam Rheon hoc nostrum barbaricum: tum quòd commixtas habeat uires, tum quòd uera spica caremus: & ea qua hodie utimur, horribilis ualde saporis est. Dosis seu quantitas communis, nostri Rheubarbari in infusione, ut loquuntur, est à drachma una ad drachmas duas uel tres ad summum. In substantia à drachma una ad drachmam unam & semis. Itaque modus Mesuæ in dando Rheubarbaro, perniciosus est. ipsum enim exhibet à drachmis duabus & semis, usque ad drachmas decem: quæ quantitas non potest sine discrimine semel dari.

RHAPONTICVM optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lenitescat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Diosc.

RHV liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium conueniens. Semen eosdem effectus exhibet. aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi desert, quod dentium canis imprimatur ad dolores finiendos. Diosc.

RICINVS. ρήτωρ. Grana eius triginta numero, putaminibus purgata, potu pituitas, bilem & aquas per aluum deiciunt Dioscoridi. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio. Siquidem stomachum uehementer subuertit. Hinc firè semper accit, ut qui hæc grana sumpt

non eget correctore.

Spica uera caremus.

modus exhibitionis.

Rhaponticū.

Rhu.

Dosis granorum palmæ christi, id est Ricini.

Superstitio-  
lum.

sumpsrint, per superna & inferna purgentur. Sunt ta-  
men qui huius effectus (uomitionis inquam & purgatio-  
nis per aluum) causam aliam assignāt, nempe quòd dum  
hæc grana euelluntur, alia sursum, alia deorsum ducta  
sint. Dicunt enim rusticæ mulierculas pro comperto ha-  
bere, si quis semina deorsum trahens, euulserit, & ea co-  
mederit, per inferna purgari: si uerò sursum, per su-  
perna. Quod an uerum sit, uiderint huius commenti as-  
sertores. Atque hæc de catapotia maiore dicta sufficiant.

Rosarum  
succus.

ROSARVM recētibus fōlijs succus exprimitur, de-  
sectis forfice unguibus (sic appellatur candidæ foliorum  
partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra  
donec cogatur: & ita ad oculorum circumlitiones re-  
condi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuo uer-  
sata, ne muceant, neue sitis infideat. Diosc.

Rosei pa-  
stilli.

ROSEI pastilli, rhodides Græcis, hac ratione con-  
ficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore  
madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ  
nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ di-  
geruntur in pastillos, qui trium obolorū pondus æquēt.  
siccatiq; in umbra, in fictili non picato, atque obturato  
reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis  
Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle muscent.  
Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt.  
Dioscorides.

Rosarū quæ  
præferenda.

ROSÆ. Inter rosas ea præferenda est quæ colorem  
habet exactè rubrum. Tam alba quàm rubra præstan-  
tior habetur, quæ folia habet pauca, & læuia, seu, ut lo-

Succus. quuntur, plana. Succus rosæ melior est qui ex com-  
pleta

pleta atque omnino absoluta rosa exprimitur, aut educitur. Sicca rosa magis est adstrictionum particeps. uitanda autē omnino quæ corruptionē sensit. Rosæ præsertim recentes, decoctionem non sustinent, per hanc enim facultas earum deterforia ac purgatoria tota expirat, & deperit. Succus uero earūdem, modice decoctus, subtilior euadit, & magis absterforius, ut auctor est Mesue. Dosis potionis succi rosarum ipsi Mesue, est ab uncia una usque ad uncias duas cum saccharo. Si cū sero lactis sumatur, satis est uncia una. Potio uero syropi, ex succo rosarum, aut infusione earum facti, eidem est, ab uncijis duabus usque ad quinque. Dioscorides & Galenus, succum rosarum non ad alium quā ad oculorum usum reponunt. Folia decem recētia, aluum cuidam decies duxerunt, ut refert Razis. Sicca autem folia, quia ab eis recessit amaror, laxatiua non sunt, sed styptica, & adstringentia. Apertius error est apud Mesuem, mesue error. qui per albas rosas solutionem fieri nullam scripsit. Rosæ nanq; de sceni uocatæ, & uulgò apud quosdam Damasceenæ, cum albiſsimæ sint, cæteras in purgando excellunt. Tagautius.

## S



A GAPENIVM ferulaceæ Sagapeniū. herbe succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Diosc.

Neque

Neque autem mirum uideri debet de SAGAPENO si Chalbanem seu Galbanū odore referat, cū hęc duo naturæ adeò propinquæ sint, ut Chalbane mutetur in Sagapenum, ut Galenus scribit, libro de Antidotis. Porro omnes Dioscoridis Sagapeni notæ in nostro uocato Sagapeno reperiuntur. Nascitur etiam in Italia Plinio, & nunc etiam in Apulia. Medium tamē cæteris est præstantius, & efficacius. hoc Venetias per Alexandriae nauigationem ad nos adfertur: quod certe alij odorem habet uerius quàm porrorum. Veri Sagapeni probatio est Galeno, si aqua infusum aut uino, statim dissoluatur.

Sagapenum  
optimum.

Sagapenum  
purgatoriū  
non esse.

Græci Sagapeno uim purgatoriam non adscribunt. Scripsit quidem Dioscorides ipsum crassam ex pulmonibus pituitam expurgare. Verum nemo est inter Græcos aut Latinos, qui per uentrem inferiorem purgare unquam dixerit. hoc igitur & inuentum sit Arabum. Tagautius.

Sal. SAL fossilis efficacior est. communiter, si est candidus, calculis uacans, & perspicuus, densus, æquali compage: peculiariter ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est, candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamune Cyprī, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur. sed multo ualidissimus est Phrygius, nomine tapeus, aut triteus, aut gantæus. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis, usque dum effervescat. Aliqui fossilem subactō polline obliniunt, & carbonibus subijciunt, usque dum eius crusta exturatur.



tur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subito igne, moueturq; donec iā non exiliat. Spuma s A = Spuma salis; LIS, spumosi maris lanugo siue ramentū est, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quæ sali. Diosc.

SALIS flos flumine Nilo defluit. lacubus tamē qui = Salis flos. busdam innatat. Assumendus, qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum longē magis uirus olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente fastidium colorem. Diosc.

SALICIS excipitur succus qui manat ex ea, cum flo Salix; ret, exciso cortice. in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ obstat oculis, suam uim præbet. Diosc.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti linguae Samia terra; glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius. unam antè diximus. altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria. Viniq; consimilem habet. Diosc.

SAMIUS lapis, in Samia terra inuenitur, quo auri = Samius lapis. fices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & duritia. Diosc.

SAMPSUCHVM in Cypro & Cyziceno lauda = Sampfuchū. tißimum. secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Diosc.

SANDARACHA probatur rufa & saturatior, & Sandaracha aliena

aliena materia uacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & uſtio, quæ auripigmento. Diosc.

Sarcocolla. SARCOCOLLA lachryma eſt arboris in Perſide naſcentis, pollini thuris ſimilis, ruſa, guſtu amara. Adulteratur admiſto gummi. Diosc.

Scammonia. SCAMMONIAE legitur ad hunc modũ ſuccus: Capite exempto, radix in teſtudinis ſpeciem cultro excauatur, quo fit ut in cauum conſluat ſuccus, qui conchis demum excipitur. Alij ſcrobeſ in terra concamerato ſinu fodiunt, in quos, ſubiectis iuglandium folijs, profundunt ſuccum, ſiccaturq; extrahunt. Laudatur autem ſcammonium leue, nitidum, rarum, & colore quamſimillimum taurino glutini, fungoſum, tenuibus fiſtulis, quale ex Myſia regione Aſiæ deportatur. Nec attendere ſolum par eſt, ſi linguae tactu albeſcat ( hoc enim euenit adulterato, quod admiſto fit tithymali lacte) ſed longè magis antea narratis. item ſi non uehementer linguam exuratur. id quod muſti tithymali argumentum eſt. natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habetur, grauius, denſa, erui farina & tithymalo uitiata. Diosc.

Scammonium quoniam cæteris præſtat, quod in Colophone (quæ Inſula eſt Ioniæ, Appollinis oraculo nobilis) gignitur, ideo & Colophonium nominatur. Itaq; eiſmodi ſuccus, qui in quotidiano medicinae uſu ad purgationes præſtantiſſimam & maximam uim habet, ad hunc modum colligitur Dioſcoridi: Capite radice exempto detractõe, radix ipſa in modum teſtudinis inuerſa, cultro excauatur. Quo fit ut in cauum, ſeu cauernulam ipſam,

modi 2. colligi  
gendi ſcāmo  
nium, ex Dio  
ſcoride.

ipsam, lachryma siue succus cōfluat, qui deinde conchis  
 excipitur. Alij fornacem seu scrobes in terra concame-  
 rato sinu fodiunt, in quos subiectis nucum iuglandum fo-  
 lijs, succum effundi patiūtur, quem inibi resiccatum de-  
 mum tollunt. Quatuor modos colligendi eiusmodi suc- modi 4. ex  
 ci posuit Mesue, secundum autem modum hunc Diosco mesue.  
 ridis omisit. Primus est, radice in terra adhuc manente, 1  
 incisa, & excauata, ut modo ex Dioscoride dictum est.  
 Secundus, radice euulsa, & incisa. Tertius, contritis ra- 2  
 dicibus & expressis. Quartus stipite & folijs simul con- 3  
 tritis. qui autem hoc ultimo modo exprimitur, ac colli- 4  
 gitur succus, ad uirorem spectat, & grauis est odoris.  
 Quod tertio modo legitur ac seruator, scammonium ni-  
 grum est, crassum & ponderosum siue graue ipsi Me-  
 sue. Sed qui secundo modo ex radice Scammonie pro-  
 fluit succus, colore subalbido aut uario conspicitur. Cæ-  
 terum quæ modis his omnibus profunditur lachryma,  
 uel lento atq; moderato igne eidem Mesue decoquitur,  
 uel in sole exiccatur, & in trochiscos seu pastillos, quos  
 impresso sigillo obsignare solebant, digeritur, atque sic  
 usui reseruatur. Nunc uerò quod in officinis ostēdi-  
 tur Scammonium, neque in pastillos conformatur, neque  
 sigillo ullo obsignatur. Porro radix ipsa circa canis tempus colli-  
 ortum excauatur Plinio, libro 26. cap. 8. ut in ipsam, gendo scam-  
 sic ut modò dictum est, confluat succus, qui sole siccatus monio accō-  
 digeritur in pastillos. Vis bimo nec ante nec postea. Me- modum.  
 dicinas omnes exacuit, & stomacho ( ut Galenus scri- tempus dura  
 bit) inimicum est, atque eius dissolutionem facit. Recen- tionis.  
 tior autem Græcia, & officinæ nostræ, lachrymā hanc,

quo minus stomachum offendat, in cotoneo malo deco-  
 Dacrydion. quant: atque tum illa Dacrydion, quasi dicas lachryma  
 lam, uocat: hæ uerò corrupto uocabulo diagredion ap-  
 plinius. pellant. Tagautius. Plinio uero commendatur natio-  
 ne Colophonium, Mysium, Priennense, specie nitidum,  
 & quàm simillimum taurino glutini, fungosum tenuissi-  
 mis fistulis, citò liquefcens, uirus redolens, gummosum,  
 linguæ tactu lactescens, quàm læuissimum, cum diluitur  
 fidelis proba albescent. Verum enim uero non solum hoc experimen-  
 tio boni scā- to niti conuenit, ut linguæ tactu aut cū diluitur albescat:  
 monij. hoc enim etiam euenit adulterino, quod amnsto fit Ti-  
 thymali lacte: sed fidelior probatio Dioscoridi & Pli-  
 nio fit, à gustu, ne ualde linguam accendat, ac uehemen-  
 ter deurat, id quod permisti tithymali (inquit Dioscori-  
 des) est argumentum. Tithymalus nanque linguam ex-  
 deterrimum calfacit Bulbi more. Deterrimum uero habetur Scam-  
 scammoniū. monium Dioscoridi, natione Syriacum & Iudaicum,  
 graue, densum, Erui, id est, Orobi farina, & Tithymali  
 notæ boni succo uitiatum. Quinque conditiones desiderantur  
 scāmonij. Mesuæ in bono scammonio. Nempe ut sit splendens uel  
 subalbida, aut uaria: linguæ attactu, & cum diluitur, la-  
 ctescent, siue albescent (sed hoc experimentum ut dixi-  
 mus, fallax est) tenera ac friabilis: læuis: boni odoris,  
 cum tamen Plinio illud laudetur, quòd uirus redolet.  
 dosi scam- Aëtio inodora est & insuauis Scammonia. Dosis ul-  
 monij. tima scammonij per se, Mesuæ sunt grana duodecim.  
 Aëtio scrupuli duo, uel, ut inquit, pro uirtutis ratione  
 maior aut minor. Galeno & Oribasio exhibetur pōde-  
 drachma una re drachmæ unius. Dioscorides quoque integram dra-  
 chmam

etiam non ueretur offerre : sufficere tamen ad soluen-  
dam aluum dicit duos obolos. Quòd si efficacius purga-  
re uelis, quaterni oboli, cum duobus ueratri nigri, &  
Aloës drachma una, si ipsum Dioscoridem sequamur,  
dari possunt. Ego, inquit Mauardus, licet nunquam sin-  
ausus tantum dare, duodecim tamen grana transcendere  
non sum ueritus, scioq; quosdam scrupulum integrum  
hausisse sine noxa.

scāmonij ex-  
hibetur dio-  
scoridi.

SCHISTOS lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Schistus lapis  
Probatur maximè, qui croci colorem æmulatur, friabi-  
lis, suapte natura fissilis, concremento & alterno cohae-  
rentium uenarum, discursu, pectinum modo, ammoniaco  
sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infir-  
miorem. Diosc.

SCILLA uim acrem atque feruentem habet. assatam Scilla.  
ad multa utiliore esse constat. Polline ad crustam sub-  
actò, aut luto oblita, in clibanum cõijcitur, aut carboni-  
bus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta  
fuerit. qua exempta, si non emollescat, altero polline si-  
mili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt.  
nam quæ ita non assatur, interaneis maximè noxia est.  
Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnū de-  
mittatur. Sumi etiam solet quod maximè est medium, di-  
reptis uiuo tenuis tunicis. quod frustatim confectum co-  
quitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinē  
nec acrimoniam habeat. Traiecta q; lino frusta siccantur  
in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. his  
scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum  
utimur. Diosc.

SCYLLA. Ea squilla melior censetur, quæ & dulcoris, & amaroris, atq; acrimoniæ particeps est: quæq; candidissima est, & in locis liberis nascitur. Addit Mesue & quæ parē habet. Sola enim (inquit) uenenosa est.

Quòd si id uerum est, nemo unquam tuto Scylla utetur, dosi. nisi qui præsens fuerit dum effoderetur. Dosis aceti squillitici Mesuæ est à drachmis quinque usque ad duodecim. Oxymelitis uerò potio est ab aureis sex usque ad tres uncias. & trochiscorum scylliticorum à drachmis duabus usque ad quatuor. Ex Dioscoridis uerò sententia datur Squilla cochlearis unius uel duorum mensura, ad aluum leniendam. Idem tribus obolis in eclegmate coctam exhibet ad uarios affectus.

Scordium. SCORDIUM efficacius Ponticū, Creticumq;. Exprimatur eo etiam succus. Diosc.

Sene. SENE. Actuario seruefacti ius potius, quàm triti farina propinatur. Pulueris modus, eidem auctori, drachma; in decocto, semuncia: macerati, seu, ut dicunt, infusi potio communiter exhibetur à drachmis tribus ad semunciam. Mesuæ ab aureis tribus ad unciam unā. Decocti ex Sene uncia mediocriter purgat Manardo. Serapio, ut Actuarius, dat tritæ Senæ drachmam unam, decoctæ quinque. Ceterum cum Sene nostrum Gallicum purgandis corporibus ualere, multa iam experiētia comprobatum sit, non erit certe officinis tanquam inutile interdicens: sed cum inefficacius sit altero quod orientale uocant, & in communi est usu, maiore paulo mensura erit exhibendum, ne sua expectatione & qui sumunt, & qui instituunt, frustrentur. Purgant autem efficacius

ficacius senæ siliquæ (quos folliculos uocāt) quàm *φύλλα*  
*σινα*, id est folia: quod ipsum præter Mesuæ auctoritatē,  
 & experientia comprobatur, & ratio etiam dicitur, ob con-  
 tentorum scilicet in eis seminum potentiam.

SERVM optimum habetur, quod ex lacte caprarum *Serum*.  
 iuuenum, nigrarum, recenter foetarum, & bono pastu *Seri lactis o-*  
 utentium, assumitur. Secundum locum obtinet, quod ex *ptinæ notæ.*  
 ouillo lacte separatur. & tertio loco habetur bubulum.  
 Quamuis temperatissimum lac muliebre sit, mox capril-  
 lum, hinc asinum, ouillumq; postremo uaccinum. In se  
 uerò consideratum probatur magis, recens, non corru-  
 ptum, boni odoris atque saporis. Dosis seri Mesuæ *dosis Seri.*  
 est ab uncis sex usque ad libram unam. Paulus Aegine-  
 ta dari uiris iubet sextarios duos, pueris unum.

SINAPIS recenti semine expressus succus in sole Sinapi.  
 siccatur. Diosc.

SOLANO hortensi, & halicaccabo succus extrahitur *Solanū hor-*  
 tur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens. *tense.*  
 Dioscorides.

SORI existimarunt aliqui melanteriam esse, aber- *Sori.*  
 rantes. siquidem sui generis est sori, ei non absimile. ue-  
 rum sorēi uirus inest graue, & nauseam mouens. Inueni-  
 tur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut  
 in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium,  
 quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina debi-  
 scens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuo-  
 rationeq; magnum uirus olens, ita ut stomachus in uo-  
 mitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas mi-  
 syos modo non emittit, & alterius generis esse, & inua-

lidum censendum est. Vim & uestionem supradictis simi-  
lem habet, scilicet ut musy & chalcitis. Hæc autem ferè  
omnia, & alia quæ uestionem experta non sunt, perustis  
ualidiora esse existimantur, præter salem & uini facè,  
nitrum, calcè, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt.  
Combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

Spartion & De SPARTIO & GENISTA. Genistæ semen  
Genista. in folliculis Phasiolorum modo nascens, purgat sesqui=  
Seminis geni drachma in aquæ mulsæ quatuor cyathis potu matuti=  
stæ dosis. no, Plinio. De Spartio scribit Dioscorides, quòd flores  
dosis spartij. & semina eius purgant per superna, ellebori uice, citra  
periculum, quinis obolis in aqua mulsæ siue melicrato  
pota. Semen quoque ipsum exinanit aluum trahendo.  
\* aliàs, in ace Sed & ramis eius cum folijs in \* aqua maceratis pluri=  
zo. Plin. bus diebus & tufis, succus elicitur, Ischiadicis & angi=  
na laborantibus utilis, unius cyathi potu ieiunis. Quidam  
salsilagine, uel marina aqua macerare malunt, & subter  
Ischiadicis in aluum dare. Detrahit cruenta, strigmen=  
taq; intestinorum. Sed super ijs nihil attentet Pharma=  
copola, medico inconsulto. Dosìs Albrabin Mesuæ, &  
proprie florum (inquit) est à drachmis duabus usque ad  
quinq; & seminis à duabus drachmis usque ad quatuor.  
Dioscorides, ut diximus, ex semine & floribus spartij  
dat quinque obolos, Plinius sesquidrachmam, id est dra=  
chmam & dimudiam genistæ exhibet.

Spongix. E SPONGIIS alias mares appellauere, tenui fistu=  
la, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. formi=  
nas autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur ea, ut  
alcyonium. Cinerem in oculorum medicamentis lana=  
re util



re utilius. Candidæ cura fiunt, è molliſſimis recētes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret, inſolantur inuerſæ, hoc eſt parte caua ſuſum ſpectante: & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. ſi uerò æſtiua ſerenitate ad lumen ſternantur, perfuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent. Dioſc.

STYRAX lachryma eſt arboris malo cotoneæ ſimilis Styrax. lis. Præfertur ſordeſcens, flauus, reſinoſus, albicantibus grumis, quæ plurimum in ſua odoris gratia permanēs. quidam mollitur, melleum liquorem reddit. qualis è Catallis, Piſidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fuſcuſus, friabilis, canoq; ſitu obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummium ſimilitudine, perlucida, & myrrhæ amula. uerum per pauca manat. Adulteratur ligni ſcobe, quam uermiculi erodentes excuſſerunt, melle, & iridis ſedimento, & quibuſdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, ſagrantiſſimis ſolibus cum ſtyrace ſubigunt, & per laxa cribri ſoramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantq; . Styracē hunc quoniam in uermiculorū ſpeciem contrahatur, ſcoleciten cognominant. quem tanquam ſyncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. ſiquidem acer admodum eſt, qui adulterationis uitio caret. Styrax adoletur, & igni torretur, ut fiat ex eo, ueluti ex thure fuligo: ad eadem cōueniens, ad quæ thuris fuligo. Dioſc.

SULPHUR optimum exiſtimatur uiuū, quod apyrōn uocant, nitedulæ modo ſplendidum, perlucens, nunc lapidoſum, Probatur in genere ſulphuris ignem

experti, quod uiret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Diosc.

Sycomori  
succus.

SYCOMORI succus primo uere tenera arbore, antequam fructum ferat, exinuitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere lachryma excipitur: quæ siccata & in pastillos coacta fictili uase reponitur. Dioscorides.

T

Tamarindi.  
delectus.



AMARINDI Mesuæo præstantiores sunt nigri, non tamen exacte lucidi siue splendentes, teneri, muxti cum uillis, recentes quoque & pingues non aridi, dulcacidi, saporis uinosi. Adulterantur admixtione carniū prunorum, sed fraus detegitur nigredine non splendente in ipsis apparente, humore luxuriante, & prunorum tum odore tum sapore. Si incalescant, aut humectentur, putrescunt. optime conseruantur in uase uitreo, exacte obturato, & in loco sicciore. Imbecillam uim habent purgatoriam, proinde eorum decoctum exhiberi potest ab uncys duabus usque ad quinque.

Adulteratio  
tamarindorum.

conseruatio.

Dosis.

Terebinthina.

TEREBINTHI resina ex Arabia petræa deferatur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, uitreo colore & in cæruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete. has sequitur è picea

picea & pineis nucibus resina. Diosc.

Terebinthina quomodo vratur. Ex Aë-  
tio lib. 13. Cap. 99.

TEREBINTHINAM uisam cyphi recipit. Vri-  
tur autem hoc modo : Terebinthinam conijce in ollam,  
& triplum, aut etiam amplius aquæ infunde, & ad ignē  
adhibe, nihilq; omnino mouēdo coque: ubi uero consum-  
pta fuerit aqua, & terebinthina attenuata ac inualida  
reddita, ut digitis confringi possit, eam tolle atque in an-  
tidoti confectiōnem assume. Si uero insumpta aqua, ad-  
huc mollior appareat terebinthina, aliam aquam super-  
funde, rursusq; ad ignē adhibe, donec friabilis reddatur.

Ex Ampelitide TERRA, quæ pharmacitis nomine, Terra Ampe-  
in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, pi-  
litis.  
ceæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili  
splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit.  
Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem  
non resoluitur. Diosc.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinereum, Sa Terra Chia.  
miæ similis. est autem crustosa, albaq; sed fictitijs formis  
diffrens. Vis eadem quæ & Samuæ. Diosc.

CIMOLIAE duo genera: candida, & ad purpu- Terra Cimo-  
reum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet lia.  
pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Diosc.

ERETRIADES duæ sunt, una uehementer alba Terra Ere-  
est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colo-  
trias.  
rem uergens, perquam mollis, quæ si per æramenta tra-  
ctim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut ceru-  
sa, aut hunc in modum : Teritur seorsum, & cum aqua,

Et ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. siccata foliis, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat. antelucanis colo excernitur, et demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tota consideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniiciuntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follibus perflantur. ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut aereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Diosc.

**Terra Lemnia.** Lemnia TERRA cuniculoso in specu nata est Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, et caprino sanguini permista. quam incolae cogunt in pastillos, et imagine caprae signant. unde et sphragida agos, hoc est sigillum caprae appellauere. Diosc.

**Terra melia.** Ex omni MELIA TERRA et omni alia in uniuersum, eligi debet, recens, mollis, non lapidosa, friabilis, electio. quae cum humorem attigerit, facile resoluitur. Diosc.

**Terra Selinua.** SELINVSIA eadem quae Chia praestat, maxime laudatur, quae uehementer resplendet, candida, friabilis, et humore dilui celerrima. Diosc.

**Tithymalus Characias.** E Characia TITHYMALO appetente uindemiae tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, et uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, et in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillant, ut cum his inarescant, quas ad usus recondunt. Per se etiam tusus in pila, et in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahit lac, neque quo uentus afflaret, stare quenquam, neque manus oculis admouere conuenit,

uenit, sed antè quàm colligas, corpus, præsertim faciem, collū, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cū uino perungere. Fauces autem exasperat. quapropter catapotia cera aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Characiæ tithymali legitur semē autumnō, & siccātū sole leuiter tunditur, seruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Diosc.

TITHYMALI fœmunæ succus ut maris colligitur.

TITHYMALVS paralius similiter, & similes ad Tithymalus  
usus, ut mas, reconditur. Paralius.

TITHYMALI helioscopij colligitur succus, semēq; Tithymalus  
ut aliorum. Helioscopi.

TITHYMALIS cyparissæ & dendroidi, eadem Tithymalus  
uis quæ reliquis, similiterq; reconduntur. Diosc. Cyparissius.

THAPSIAE lactis extrahendi ratio hæc est: Facto Thapsia.  
in ambitū scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornix  
speciem in se excauata, cooperitur, quò merus succus  
confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum  
succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo  
per quallum expressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium unū terunt. sed inualidior  
huiusmodi succus. Hoc autem interest. quoniam qui ab  
radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs  
autem extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriā sentit.  
Qui succum colligit, stare debet non obuersus uento: aut  
potius, cum dies apricus est, & à flatu fileat. quoniam  
ob halitus acrimoniam facies uehementer intumescit,  
nudaq; corpora inuadunt pustulæ. ob id prius liquido  
quido

quido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Diosc.

Thus. THVS in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum. tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uerò fuluescit, & colore liuet. sed rotundum industria factitant. nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. uerum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud, cui amomutæ cognomen est, alioqui candidum: quod dum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi. quod facile deprehendi potest. siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit. thus uerò statim ardet. idem maleficio odor prodit. Diosc. In fictili mudo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur. post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguatur. sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem uaporémue emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est. Diosc.

Fulig

Fuliginem THVRIS sic facito : Forcipcicula lucer= Thuris fuli-  
 nis accensas singulatim thuris glebas in nouam fictilem 80.  
 ollam concavam imposito : & æreo uase in medio per=  
 forato, deterfa diligenter forde, obtegito. alteram admo-  
 ueto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quater=  
 nūm digitorum altitudine lapillis, quò facilius perfpici  
 queat, fi urantur. & qua locus capax fuerit, glebulas a=  
 lias supponito. & antea quàm prorsus prior gleba re=  
 stinguatur, aliam imposito: donec sufficientem fuliginem  
 uidearis coëgisse. Continuo tamen externæ æramenti  
 partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur. ita  
 enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit.  
 quæ alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus ad=  
 mifcetur. Derafa itaque fuligine, cinis cremati thuris  
 feorsum subtrahendus est. idem opus, quoad satisfactū  
 tibi uidebitur, obeundum. Simili modo è myrrha, re=  
 fina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad  
 eadem conueniens. Diosc.

Præfertur THVRIS cortex crassus, pinguis, odora Thuris cor-  
 tus, recēs, læuis, minime scaber, sine mēbranis. Adultera <sup>tex.</sup>  
 tur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index  
 ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam in=  
 cendantur, sed sine odore fumum eructant. thuris uerò  
 cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiacu=  
 latur. thuris modo uritur. & uis eadem quæ thuri, sed  
 ualidior astringentiorq; . Diosc.

Manna THVRIS probatur candore, micarum fre= Thuris māna  
 quentia, & puritate. Vim habet eandem, quam & thus,  
 sed in ualidiuſculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac  
 polline,

polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquè suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suaueolentiæ halitus uirus habet. Diosc.

**Thymelæa.** THYMELAEAE folia, quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat: antea tundere, & neruos eximere conuenit. Thymelææ farina uuæ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Hallucinantur, qui coccon gnidium fructum esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Diosc.

De Thymelæa iterum, & chamelæa,  
quæ Arabum est mezereon.

**Cnidij granum.** Granum CNIDIVM ob nimiam acrimoniam cum deuorandum datur, pane aut adipe sepultum infunditur, alioqui gulâ & fauces accendit. Aluum purgat CHAMELAEAE, pituitam enim bilemque detrahit, folijs in duabus partibus absinthij decoctis, succoque eo cum melle poto. Dioscoridi eosdem humores per aluum exigit, folijs præsertim cum duabus partibus absinthij, hydromelæ exceptis, & in catapotio deuoratis. Sed catapotia eiusmodi, quotquot fuere deuorata, eadè forma qua fuerint ingesta, redduntur. Omnino enim in uentre non uincuntur, nec à calido natiuo liquefcunt. Dantur etiam Dioscoridi rami Thymelææ cum suis folijs, & bacis, leui igne decoctis ad deiicienda aquosa corporis recrementa: ad extenuandū quoque lienē, incremētū uitio laborantē. Sed hæc medicorū sunt, non pharmacopolarū.

**Dosis chamelææ.**

**nota.**

**Thymelææ  
modus, siue  
dosis.**

Dosis



Dosis MEZEREI in decoctione datur Mesuæ à <sup>dosis Meze-</sup>drachma media, ad drachmam unam : in puluere à duo=<sup>rei.</sup>bus ceratijs ad quinque . Paulus dat quatuor drachmas Chamelæ in aqua mulsæ coctas, purgareq; dicit ut Eleborus. Cnidia uero grana à uiginti usque ad triginta. <sup>granorū Cni-</sup>

THYMVS. Decocti dosis est Mesuæ à drachmis <sup>diorū dosis.</sup>quinq; usq; ad decē, & pulueris ipsius à drachmis dua=<sup>Thymus.</sup>bus usque ad quatuor. Mediocre[m] sustinet decoctionem. <sup>dosis thymi.</sup>si diu ac curiose teratur, magis urinas ciet, & minus aluum exinanit . Colligi in flore thymum oportet, & in umbra siccari.

TRAGACANTHA præstat pellucens, gracilis, læ <sup>Tragacantha</sup>uis, syncera, & subdulcis. Diosc.

TRAGI herbæ racemorum acini tunduntur à ple=<sup>Tragos-</sup>risque, & in pastillos digesti asseruantur : quibus utuntur, cum opus est. Diosc.

TRAGORIGANVM optimum est Cilicium, & <sup>Tragoriga-</sup>Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooq; proueniēs. <sup>num.</sup>Dioscorides.

TURPET. τούρπετον. Si de re tam ambigua, ac tam <sup>Turpet.</sup>controuersa semel statuendū est, quatuor uel fortè quinque res erunt, nomen Turbit suscipientes : Radix uide=<sup>1</sup>licet Tripolij, de qua tractat Serapion sub nomīne Turbit, quod & Caricamon uocat . Radix Pityusæ, quam <sup>2</sup>Actuarius Turpeton, & quidam Dioscoridis interpret=<sup>3</sup>es Turpet uel Turbet appellarunt . Radix itē Alypiæ, <sup>3</sup>quod cādidum Tourpeton idem Græcus auctor Actua=<sup>4</sup>rius cognominat . Radix præterea Tithymali fœminæ <sup>4</sup>Myrthites nuncupatæ, quod myrthi folium ferat, qua  
nunc

nunc passim sub Turbit nomenclatura utuntur medici,  
 5 & eorum seplasiarij. Et quantum demum, (nisi penitus  
 somnium est,) quod radix est arboris, quam folio ferulæ  
 mesuæ som- constare dixit Mesue. Cæterum tametsi Arabes inter  
 nium. se, & cum Græcis in descriptione Turbit dissentiant,  
 omnes tamen easdem ferè vires illi attribuunt, ut ex eo-  
 rum scriptis licet deprehendere. pariq; mensura ferè  
 dosis turbit. ipsum exhibent. Serapion & Mesue contritum biben-  
 dum offerunt à drachma una usque ad drachmas duas,  
 in decoctionibus uerò usque ad drachmas quatuor.

dosistrispolij Radix Tripolij duabus drachmis in uino potanda da  
 Pityusæ mor- tur, Dioscoridi. Pityusæ radix alui deiectionem mo-  
 dus. litur duobus denarijs in uino etiam pota, Plinio. datur  
 Dioscoridi in aqua mulsa drachmis duabus. Alypion  
 uel Alypia aluum soluit, in aqua mulsa, Plinio, addito sa-  
 dosis Alypiæ. le modico. Minima potio est duarum drachmarum: me-  
 dia quatuor: maxima sex, ea purgatione, quibus datur  
 è gallinaceo iure. Depellitur atra bilis semine, Dioscori-  
 di, si mensura Epithymo pari, cum sale & aceto suma-  
 tur. Verum interanea leniter exulcerat. Datur autè Epi-  
 thymum ipsi Dioscoridi acetabuli mensura ad quatuor  
 Alypia unde drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Purgat au-  
 dicta. tem maximè bilem atram, qua purgata animi tristitia in  
 melancholicis pellitur: à qua ui seu facultate potuit illi  
 nomen fieri. Est enim Græcis Alypon, quod tristitia do-  
 loreq; caret aut liberat. Si nostrum Turbit, quo pas-  
 sim hodie utimur, radix sit Tithymali foeminae, ut pu-  
 tatur, drachmæ pondere iuxta præscriptam à Diosco-  
 ride quantitatem siue mensuram, in hydromelite potan-  
 da da

da dabitur, ut per inferna trahat.

V



ERATRI albi radices mes Veratrū albū  
sibus colligendæ. Optimum ha-  
betur candidum, friabile, carno-  
sum, modicè extentum, nec tamē  
iunci modo mucronatum, quod  
frangendo puluerem emittit, &  
tenuem habet medullam, gustu  
non admodum feruens, neque saliuam subinde ciens. hu-  
iuscemodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum te-  
net. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora,  
& puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouēt.  
Dioscorides.

Cæterum, modum unum præparandi ELLEBO= modus præpa-  
RVM inuenerunt longè facillimum. Raphanis dissectis randi Ellebo-  
inferere iubent Elleborum, rursusq; comprimere rapha rum album.  
nos, ut uis pertranseat, atque eo lenimento dare. Hoc au-  
tem uomitione magis purgat, præsertim non præpara- Elleborus al-  
tum. Apparent autem res uisu terribiles in uarijs ipsarū bus vomitio  
uomitionum coloribus. Sed & subditæ quoque ex eo ba ne purgat.  
lani (suppositoria uocant) cum aceto uomitiones conci-  
tant, atque eliciunt. Herophilus Elleborum fortissi= Herophil\* El-  
mo duci æquabat: concitatis enim intus omnibus, ipsum leborum for-  
in primis exire affirmabat. Ideo & errauisse antiquos, tissimo duci  
parcius id præbendo, cū celerius erumperet quod lar= æquabat.  
gius daretur. Reddi post quatuor quoque horas incipit,  
totum opus septenis peragitur horis. Themison bi= dosis veratri  
H albi.

nas non amplius drachmas offerebat, sequentes quater-  
nas dedere. Atque hæc de ueratro albo dicta sufficiant.

Radices non uere, ut uoluit Mesue, sed mesibus col-  
ligendæ sunt: quæ solæ in usum ueniunt Dioscoridi.  
Itaque ipsi tenuissimæ radices breuesq; leguntur, sicuti  
& Plinio, ac uelut decurtatæ etiam hæ. Quod & Me-  
sue innuit cum ait, Et melior pars radices sunt fustes.  
Nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus  
tantum datur purgationis causa, Plinio. Veteres radicem  
corticemq; carnosissimum, ut Barbarus annotauit, elige-  
bant, quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis  
spongij opertam, turgescentemq; in longitudinem fin-  
debant: deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes. Nunc  
ramulos à radice sua quàm grauissimæ corticis, ita dan-  
tes. Inciditur & nunc Elleborum, & cribratur: cortex  
remanet, hoc summo medulla cadit.

Veratrum ni-  
grum.

VERATRUM nigrum radicibus coheret nigris, te-  
nuibus, à capitulo cepæ simili confibratis. quarum est  
usus. in collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur.  
Optimū est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex An-  
ticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi de-  
bet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla,  
acre gustu, feruensq; cuiusmodi est in Helicone, Parna-  
so, & Aetolia natum. attamen Heliconium præcellit.  
Emedullantur radices eius ueratri albi modo. Diosc.

delectus.

Elleborum nigrum maximè probatur Dioscoridi,  
quod in Anticyra, quæ in Locride siue Phocide sita est,  
prouenit. Eligitur carnosissimum, habitissimumq; hoc  
est maximè corpulentum & plenum, medulla tenui, acre  
gustu,

gustu, feruensq; . Cuiusmodi est ( inquit Dioscorides )  
Helicone, Parnaso, & Aetolia natum. Quamquam boni-  
tas prima Heliconio tribuitur. Hoc perinde atque album  
emedullatur.

VIOLEAE succus, & Syropus ex ea confectus, eo= Violæ succ?  
dem, quo & flores & folia, modo aluum leniunt. Ea electio.  
assumi debet quæ prima se ostendit, cuius uirtus, nec à ca-  
lore resoluta est, nec à pluuia diluta, dissipatæ. Po= dosis.  
tio decocti uiolarum est Mesuæ, ab uncijis quatuor usque  
ad octo. Succu uerò ab uncia una usque ad duas, & sy-  
ropi ab duabus uncijis usque ad quatuor. Condiuntur e-  
tiam uiolæ cum saccharo & melle: ex ea autem condi-  
tura dari potest ab uncia una usque ad tres uncias. Mi-  
xta autem saccharo minus, melli uero magis absterfioria  
est. Proinde & minori quantitate assumenda.

VIPERINAE carnes, esui sic præparantur: Detra= Vipera.  
cta cute, caput caudaq; , quoniam carne uacant, amputa-  
ri debent. quippe commentitium est quod præcipitur,  
certam utrinque mensuram præcidi oportere. reliquum  
uerò corpus exemptis interaneis elotum dissectumq; dis-  
coquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Sal ex  
eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. uiuat autem  
uipera in fictile nouum demittitur. adiiciuntur salis ca-  
ricarumq; tritarum, singulatim quinque sextary, mellis  
cyathi sex. mox fictilis operculum luto oblnitur, & for-  
nacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur. qui  
postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerunque,  
ut ori grator fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut  
malabathri momentum. Diosc.

**Viscum.** VISCUM optimum est recens, intus porraceum, extrà fuluum quod asperi nihil, aut fursurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæo fruticis folio. contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. gignitur quoque in mâlo, pyro, & plerisque alys arboribus. quænetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Dioscorides.

**Vnguis odoratus.** VNGVIS odoratus laudatissimus, qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Diosc.

APPARATVS SIMPLICIUM  
MEDICAMENTORVM  
FINIS.

# De compositione me- DICAMINVM GENE- RALIVM,

EX PAVLO AEGINETA.

## De Paſtillis.



**P**ASTILLI Græcè trochisci  
i figura nominantur. Tres sunt  
eorum species. alij nanque sunt  
potabiles, alij in aluum dan-  
tur, alij delinuntur. Ex his igitur  
qui potantur, alij compri-  
munt aluum, aut sanguinem, aut

aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astrin-  
gendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes:  
quemadmodum qui constat spina Aegyptia, & qui semi-  
nibus, consimilesq;: Alij dolorem sopiunt, uel quòd sen-  
sum obstupefaciant, uti crocodes dictus, uel quòd humo-  
res diffundant, ueluti ex aromatis confecti: alij lienem,  
aut renes, aut iecur obstructione liberant, ut qui ex ama-  
ris amygdalis conficitur. Eorum uerò qui in aluum in-  
duntur, nonnulli acrimoniam obtundunt. ut in tormeni-  
bus intestinorum, quemadmodum ex pompholyge, amy-  
lo, terra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo  
preparati. nonnulli alui aut sanguinis profluuium astrin-  
gunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant,  
qualis est Philippi, quiq; ex spina constituitur Aegyptia,

cum rosarum aut plataginis infusi succo: nonnulli adu-  
rentes, dysenteriae, quam ulcera depascentia exercent,  
idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta com-  
busta, cōfecti. Inferentur autem cum succo lenticulae aut  
oryzae, sic ut intestinum prius muria elotum sit, ægerq;  
cibum & potū antea assumpserit, ne aliquid medicamen-  
ti uirtutis reliquum, ad stomachum rapiatur. Cæterum  
utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus inijciun-  
tur, ad affectus potissimū, qui infra umbilicum infestant.  
Nam superius uis ipsorum peruenire non potest. At qui  
delinuntur simileis illis uirgis obtinent, uerū astringen-  
tes, in herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, in-  
tertriginibus, sanguinis eruptionibus, & fluidis ulceri-  
bus proficiūt: cuiusmodi est Andronius & Polydæ. qui  
uerò obtundunt, carbunculis & maleficis ulceribus ex-  
pediunt: utpote leucus dictus, & dialotarion. urētes, si-  
cut iam comprehensi, cuius generis habētur & Faustia-  
ni, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pterygys,  
& carnosiss narium uitijis accommodantur.

De medicamentis quibus aridis utimur,  
xeria dicuntur, & Smegmatis.

**A**Ridorum medicamentorum, quæ sanè & cataplas-  
mata ab inspergendo uocantur, alia ulceribus con-  
gruunt, alia cuti applicantur: ex his quæ ulceribus fa-  
ciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam excre-  
scentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædā  
urunt exeduntq; nonnulla sanguinem coërcent. Quæ  
igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida,  
carnem



carnem creant, ut quæ constant ex eruo, aristolochia,  
 iride, panace, myrrha, thure, aloë, uel humiditatem su-  
 perfluam desiccando, ueluti quæ fiunt ex ære, diphry-  
 ge, squama, charta cõbusta, piceæ cortice, & spina, quæ  
 & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniã rosionemq;  
 obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, ceru-  
 sa, speculario, ostreis crematis, terra samia, & consimu-  
 libus, & quæ compositorum ex his uireis habēt. Ex re-  
 primentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æ-  
 ris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ualentio-  
 ra uerò sunt, quæ atramēto sutorio, æruginē, misy, chal-  
 citide, ignem non expertis. Vrentia uerò exedentiaq;  
 fiunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & fæce uini  
 combusta, quam uocant spheclen, hoc est faculam: atque  
 hæc omnia componuntur. cæterum in tenuissimum re-  
 ducta pollinem, si ulceribus inspergantur minus rodunt:  
 si spissiora, magis. Sanguinem reprimentia aut astrin-  
 gendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo, aut  
 urendo faciendoq; crustam, illum coërcent, quorum ma-  
 teriam capite de Pastillis sumus exequuti. At eorū quæ  
 cuti admouentur, alia abstergunt, exteruntq;, ut ex ci-  
 molia, pumice, lomento, fermento hordei, peponum car-  
 ne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt,  
 qualia fiunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pedicu-  
 lari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepiæ testa:  
 atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquo-  
 re aliquo, pilis abolendis idonea & sinegmata fiunt.  
 Quædam capiti admouentur, ut fluxum ex eo ruentem  
 desiccent, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio,

Et id genus alijs præparata. omnia uero smegmata cuti non inunctæ accommodari debent.

*De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad  
oris uitia, unde stomatica dicuntur,  
ac guttur accommodatis.*

**Q**uanto rarior molliorq; est cutis, quæ corpus totum obtegit, quàm oris tunica, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum usus euariat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta, quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphacium, galla omphacitis, succus rhu, & hy pocisthidis, alumen, cortex piceæ & thuris, balaustia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut insuauem ingratanq; & lethalem uim non repræsentet. liquida uero, succus mororum, tum quæ batina, tum quæ sycamuna dicuntur, item nucum uiridium corticis, & mali punici, præsertim acidi, & malorum cotoneorum, mustum, aminæumq;. mel autem per initia solum ut medicamenta adhæreant temperatur. At quum humor substituerit, miscri debent quæ concoquant & mediocriter dissipent, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radicula succus. Ac per totum id temporis quod inter principium & declinationem intercedit, recte miscetur utrumque & repellens & discutiens: & primum quidem superabunt repellentia, demde digerentia: in morbi declinatione solus uti digerentibus absq; astrictione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitrum, origanum, hyssopum, thymus, nepita,

nepita, iris, besasa, consimiliaq; . liquor autem tunc sapa esto, tum quæ ex musto decocto, tum quæ ex caricis & palinulis conficitur, ipsumq; dulce mustum cum melle: ubi uero ueluti reliquæ quædam inflammationis remanserint, etiam sulfur ignem non expertum miscebimus: succos autem primum cum melle incoquemus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modicè coquimus, quoad omnia exactè in unitatem cogantur, quo facto in uitreum uas medicamentum transfundemus.

### De collyrijs & agglutinamentis.

**V**aria ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particule stirpium, & metallica his inferuntur: ex quibus alia acrimoniam leniunt & ueluti opplent obstruuntq;, utpote pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, terra samia, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius uacuationem experiat: Nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunicæ humoribus distentæ perrumpantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis uacuandisq; ijs quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenacus, Medicus, sagapenum, euphorbium & consinulia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, stios æris, stummi, concremata omnia. Quædam his uicina sunt, sinectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auris

pigmentum, sandaracha, & lapidis asij flos. Sunt & astringentia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt uehementer lippitudini, ulceribus, & defluctionibus conducunt, nempe rosarum folia, & flores, & fructus, spica nardi, phyllyum, crocus, glaucium & hypocisthis.

Quæ uehementiorem astringendi uim representant, oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balauustum, satiuæ punicæ flos, & galla. Alia concoquunt, discutiuntq; ut myrrha, crocus, castoriũ, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porro ex cõpositis oculorum remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.

Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam materiã recipiunt, omnibusq; conferunt affectibus: cæterum uere præsertim præparari debent, æstate siquidẽ uirtus ipsorum perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigida temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquore non copiose affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, uerũ modicè, ut sordium modo conteratur. Aqua uerò pluuialis erit, tum quòd tenuis sit, tum quòd modicè astringat. Sin uino aut succo aliquo læuigentur, teranturq; eadem, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo læuigabuntur. demum ubi satis læuia euaserint, gummu adijcietur, in formamq; redacta, uasis maximè æreis aut utreis reponentur. Cæterum ijs quæ è succo conficiuntur, protinus uti licet: metallica uetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exteruntq; callos,

los, ficos, unguis, scabiosaq; uitia, è chalcitide, ærugine & mify composita. Quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata. quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiūt. Sunt quæ præseruent tueanturq; oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygiò, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle Attico, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, alijsq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq; incipienti, cum extenuent, calefaciāt, purgentq;. Utendū his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionem caret, sub dio, aëre puro, aquilonio, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamēta quæ anacollemata Græcè dicuntur, ex medicamētis præparātur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, compingūt, aut refrigerant, aut astringunt, siccantue, qualis est farinæ pollen, māna, terra samua, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinantur autem fronti in quibus humor nō intra caluariā delitescit, sed extrinsecus fluit.

De Emplastris, & medicamentorum quæ ipsis immittuntur coctione, tum qui ceræ modus cum oleo esse debeat, ex commentarijs Antylli.

**M**edicamentorū quæ Emplastra ingrediuntur, alia sunt terrestria, utpote metallica, lapidumq; & terre

terræ species, fæces, cinis, & conchylia. alia sunt olea-  
 menta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædã liquo-  
 res, quædam succi sunt, semina uerò, herbas, & radices  
 pauca recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnul-  
 la sunt uulneraria, quæ enema, quòd cruëtis iniiciantur:  
 colletica, quòd glutinent: & catagmatica, quòd fracturis  
 accomodentur, appellamus. Constare autem ex siccanti-  
 bus non summe, uerùm secundi ordinis absoluti, & ter-  
 tij incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cu-  
 pressus, piceæ & tedæ cortices, myrrha, thuris lachry-  
 ma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, ceru-  
 sa, spuma argenti & pleraq; ex metallicis. Coqui debêt  
 quousq; manus amplius non inquinèt. Porro quæ ci-  
 catricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus cõpo-  
 nuntur, uerùm efficacioribus quàm glutinatoria, quod ge-  
 nus est æs combustum, squama tum eius, tum ferri, æru-  
 go, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla, plumba-  
 go, cadmia, pumex, & ostracea. Digerentia uerò &  
 calefacientibus & siccantibus modicè fiunt, nempe ari-  
 stolochia, thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opo-  
 balsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combu-  
 sto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adi-  
 pibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styra-  
 ce, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel ra-  
 dice althææ & cucumeris syluestris, præparantur.

Siccãtia, ex sulphure, nitro, sale, cinere, & bitumine.

Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro,  
 propoli, ærugine, fermento, stercore, sulphure, terebin-  
 thina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, uua passa,  
 amomo,

anomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, ærugine.

Pus mouëtia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chōdro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina.

Quæ uerò leniunt dolores, argenti spuma cōstant, cerusa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera tracta. Iā uerò enema dicta, recentibus adhuc uulneribus & fracturis injici debent, adiuuariq; è summa spleniorum parte spongys posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoque die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahūt, digerunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumq; usum adhibentur. Quæ leniunt etiam, per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

## Quomodo medicamenta quæ Emplastra ingrediuntur coqui debeant.

### ÆR V G O.

**ÆR V G O** uiridibus emplastris post coctionem iniicitur. In aliquibus autem nequiquam ollæ inditur, sed cum aceto detrita ipsi, manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis emplastris, cum semicocta est confectio immittitur: nam moderatam consecuta coctionem, melinum colorem efficit. At in his, quæ diprosopa & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus.

Alumen

## ALUMEN.

*Alumen plerunque post coctionem additur, peculiaris rem uero coctionis modum nullum habet.*

## MINIVM, CADMIA &amp; POMPHOLYX.

*Minium in fine admiscetur, Cadmia & Pompholyx per initia immittuntur.*

## ALOE.

*Aloë post coctionem inspergitur.*

## AVRIPIGMENTVM &amp; SANDARACHA.

*Auripigmentum, & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.*

## AES CREMATVM.

*Aes crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est, quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superat, & emplastrum rufum efficit.*

## ARGENTI spuma.

*In medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. conuenit autem leuigatam rursus ex oleo conterere, ut sordium fiat spissitudo. inde leni igne excoquere continenter mouendo. Initio igitur intumescit, & in bullas attollitur: ubi uero iam ferè satus incocta fuerit, colorem facci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidit, & manus non inquinat.*

## ATRAMENTVM Sutorium.

*Atramentum sutorium in media coctione emplastro inditur, coctum uero uehementiorem eius colorem efficit, & si alia ei non resistent, nigrum.*



APOCHYMA, *pix nauibus derafa.*

*Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis secretum emplastro, postea quàm coctum fuerit, inspergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo miscetur. sed prima ratio coquendi exactior est, quòd scilicet in secunda pondus non conseruetur.*

AERIS FLOS.

*Aeris flos similiter aeri coquitur, sed eo modo qui communis esse coctioni solet.*

AMMONIACVM.

*Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur: detritum uerò, si potest fieri, & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quodam læuigatum inycere: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum aceto, aut uino: si fistulis aut strumis, omnino cum aceto: aut si molle futurum est, quælia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sordium spissitudinem coactum alijs refrigeratis infundere, ne effruescant.*

BDELLIVM.

**B**DELLIVM in læuorem pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat, & læuigari non possit, sagapeno similiter ipsum cõtusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

BITVMEN.

*Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læuorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici granis interioribus simileis obtinet. Quapropter in cras  
fiores*

fiorez particulas confringendum est, coquendumq; in aceto, sic ut non agitetur usq; dum ebullire desinat: Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

## CHALCITIS.

CHALCITIS incoquitur æris modo, coctionemq; ipsius metimur inde, si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

## CERUSA.

Cerusa in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conseruat, magisq; albescit: in nigra autem, principio: coacta enim largius, nigrescit.

## CERA.

Cera priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neq; cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq;: uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel oleo fo cuipiam liquori cum quodam metallico incocto, aut resinæ, aut pici prius incoctæ.

## GALBANVM.

GALBANVM neutiquam coctionem tolerat, uerum Emplaistro ab igne sublato, ut digitos non inquinet, emollitum inditur.

## LACHRYMA papaueris.

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila leuigatur, mox etiam emplastrum ei superfunditur.

## LACHRYMA Thuris, &amp; manna.

Lachryma thuris & manna, coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudine coacta ex melle modo dico,

dico, aut aceto, aut aqua, aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

## MISY.

**M**ISY postremò adijcitur: quandiu autem coqui debeat, proprie definitum non est.

## MYRRHA.

Myrrha, ubi iam coctio finita est, inditur.

## OLEVM, &amp; reliqua pingua.

**O**LEVM siquidem per initia fuerit iniectum, resinæ aut pici liquidæ, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè indetur, reliqua uerò pingua insulsa, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

## OPOPANAX.

Opopanax multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino acetoue prius leuigandus est.

## PIX.

**P**IX ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidæ, dum inspissatur: aridæ, maximè dum non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

## PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usq; , dum non modo digitos non inquinet, uerum etiam ex igneo colore in rufum, & uehementer floridum elanquescat.

## PLUMBVM ustum.

Plumbum ustum in media coctione adiungitur.

## PROPOLIS.

Propolin emollire & discoquere oportet: siquidem à coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrū recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanū, contusam inijciemus.

## RESINA.

RESINA arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

## SAL, NITRVM, SVLFVR.

SAL & nitrum in medio coctionis: sulfur, in fine adijcitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

## SAGAPENV.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditū cum emplastro ubi ab igne sublatum fuerit, emollitur.

## SEMINA, RADICES, &amp; HERBAE.

Semina, radices, & herbae, nullam coctionem sustinent: laeugatis igitur, & in pila etiamnum subsistētibus liquida superfunduntur,

## SORI &amp; DIPHYGES.

Sori & diphryges demittuntur in media coctione lebeti: diphryges autem, sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua uincat. Sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinet.

## TERRA &amp; lapides, pumex, conchyliā.

TERRAM omnem & lapides plerunq; ad coctionis finem inijcimus. item pumicem, & conchyliā combusta.

Thapsia

## THAPSIA.

*Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodam leuigatur.*

## VNGVENTA.

**V**NGVENTVM irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum, minus: reliqua neutiquā. quare ad finem coctionis, immittenda sunt.

## De malagmatis, &amp; epithematis.

**I**Nter ea quæ malagmata dicuntur, alia medijs corporis partibus injiciuntur, longa inflammatione conflantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut per frictionem, fluxionemue expertis: alia articulis quibus humores sint impacti, uel neruis refrigeratis, uel etiam alijs particulis scirro obsessis congruunt. De his igitur tum in capite de emplastris tractatum est, tum ubi ad acopauentū erit differetur. Porro inter malagmata medijs corporis regionibus accommodata (epithemata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho & iocineri admouentur, qualiacunq; illa fuerint, roborantē ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimē intulerint. cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarū partiū alimēti sint officinæ. Quamobrē eiusmodi medicamēta ex aromatis potissimū conficiuntur. Stomacho igitur injici debent, si non cōcoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsucho, nardo & mastiche. Iecori autē ex myrobalano cōfecta, ammoniaco, adipibus, & chamemelino. At lieni applicantur, quæ cōstant calce uiua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine.

ammoniaco, & aceto: ijs autem qui alui fluore laborant, ex cennathe, alumine, melino, & alijs astringētibus præparata. etenim hæc etiam per abusionem communiter malagmata nomināt, & si diuersam à molliendo vim repræsentent. Si uerò ardor uiscera urgeat, ut in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut polygoni, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casamum, & piper recipiunt. Pectori cum sanguis eijcitur, prosunt astringentia, siccantiâq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, cōducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

*Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.*

**Q**UOD si unguina, ut quæ Græci à leuanda lassitudine acopa appellant) cōficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionē olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera uetus aut squallida, aer frigidus fuerit, oleū paulò copiosius quàm cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit. paulum autem hoc, medijs in utrâlibet partē excessus duodecima erit portio, etenim aliâs undecim aliâs tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

De acopis, inunctionibus, dropacibus,  
& sinapismis.

**A**COPIA inde nomen sortiuntur, quòd præcipuè ad lassitudinis quæ copos Græcè dicitur, puta tensi-  
uæ, ulcerosæ, & eius quæ ossa defatigat, sensum conue-  
niant, quanquam alijs quoque morbis compluribus sint  
ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi vim habent,  
alia emolliendi, alia ulcerandi. Quæ calefaciunt, pi-  
pere, pyrethro, cachry, & consimilibus constant: ner-  
uorum uitijs, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo ca-  
lore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliunt,  
ad durities, scirros, & infarctos articulorum sinus con-  
ueniunt, quorum materies capite de emplastris compre-  
hensa est. At ulcerantibus quæ adarce, cachry, eu-  
phorbio, cocco gnidio, & id genus alijs componuntur,  
in diuturnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, qui-  
bus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudi-  
nem uniuersa acopa inter cerata & emplastra mediam  
habere conuenit. Vnguiua uero acopis similia, liqui-  
diorem ferè substantiam obtinent. At dropax dupli-  
cem recipit præparationem: hanc emplastro, illam ma-  
lagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinūt,  
materiam uerò acopis & emplastris cōfinem. Cæterum  
usum cataplasmati exhibet, diuturnis affectibus iisdem  
quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumi-  
tur, quo corpus ad sinapi reddatur idoneum: à sinapis-  
mo etiã adhibetur, ut affectus reliquias discutiatur. Si-  
napismus materiam quidem uariam non habet, uerùm

diuturnis potissimum affectibus post inutilem aliorum præsidiorum vim efficacissimus est : utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur ( Græci heterocraniam uocant ) in morbo comitiali, uertiginibus, & insania : pectori autem in suspirio, orthopnœa, hoc est quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in diuturna humorum e capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictionem expertæ, ut difficulter excalfieri possit. Ac tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subsecutus fuerit ualidus, & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotū fuerit nutius pustulæ erupuerint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio conuenit, parte quam obleueris sæpius detecta : nam si uel immodicè adurantur ita affecti non persentiscunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione, ( cataphora dicitur ) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidem cruribus : ubi uerò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, ijs crura & cubitos sinapi oblinuntur. In his autē qui continua febre laborāt, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis ex carnibus, uitari debet sinapismus, nam partes carnibus uacuae si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.



Quomodo diuersa olei & unguentorum  
genera conficiantur.

**I**NVNCTIONVM unguentorumq; uel olei generum,  
quæ unguenta representent, alia sunt simplicia, una  
olei specie iniecta: alia composita, ex pluribus conflata.  
Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur,  
uerbi causa, rosaceum chamæmelinum, susinum. Quæ-  
dam ex fructibus & seminibus conficiuntur. quædam  
ex surculis quibusdā, ut rutæ, qui etiam simul cum oleo  
coquuntur, ideo cum nullus florum coctionem sustineat,  
insolantur potius. uerū si ualidam odoris gratiam re-  
presentent, & constantem, ex insolatu plurium dierum  
tenuius ipsorum oleum magisq; utile redditur, quemad-  
modum rosaceum & chamæmelinum. Qui inualidiores  
sunt, faciliusq; diffilari possunt, minus insolatum tole-  
rant, ut quorum uirtus promptè euanescat, utpote lilium  
& uiola. Ex his quæ fructibus & seminibus constant,  
nonnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti  
melinum. nonnulla contusis uel læuigatis, oleamune ipso-  
rum sequestrato, uel expressis ipsis in prælis: uel ex a-  
qua calida, sic ut ipsa discernatur, exempli causa, caryi-  
non, sesaminum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ri-  
cinum, raphaninum, atque eius notæ alia. Porro quæ  
ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissi-  
mum solent, illis oleo incoctis cum uino uel musto uel  
aqua, atque eisdem deinde exemptis. Liquoribus autem  
quibusdam oleo temperatis interim & adipibus uel  
medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinē

sortita, simplici sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut gleucinum, uardinum, sicyonium & cyprinum. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiam recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinum, atque his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusue & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, palmco surculo, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, anomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. & si eueniat, cera quæ & resins inditis. At balsami liquor neutiquam coquitur, sed post absolutam coctionem, unguento mediciter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullam coctionem recipiant, sed tantum misceantur, quale est mendesium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerunt, in olei sextarium æruginis rasæ in exactum detritæ leuorem sescunciam immiscent, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia quidem unguenta specierum quæ in ipsa matuntur, naturam, uel eorum ex quibus confusis facta sunt, obtinent, ut oleum ueluti materiæ rationem obtineat. At quæ uariam magis compositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quædam ualide calefaciunt emolliuntq; ut etiam articulis recenti cicatrice obductis, & sinibus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron

myron ualentius, ut etiam superficiem rodât . Sunt quæ mediocriter calida, tenuiaq; existunt. ea dolores leniunt, & concoquunt, quale est susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatum. Alia præter quàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq; , ueluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant , unde stomacho potissimum & uisceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichinum, nardinum, & gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex labrusca conficitur. Iam nonnullis unguentis obgratum duntaxat odorem mulieres utuntur , ut foliato, spicato , commageno , & quæ moschelæa , quasi dicas, ex moscho & oleo confectæ nuncupantur.

F I N I S .

I 5

# E primo libro Galeni

DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

*Quæ præscire conuenit eum qui Medicamenta probè compositurus sit.*



**EXPOSITVM** est alibi, simplicium medicamentorum uires non solum generatim noscendas esse, ut quidam scripserunt, ponentes ea uel calefacere, uel refrigerare, uel siccare, uel humectare: uerum distinctè, membratimque, ex quo sint ordine singula, uti nos docuimus. Quandoquidem igitur nonnulla medicamina obscure prorsus uinumquodque prædictorum efficiunt, quædam manifestò, aliqua ualide, sicut alia absolute, non satis est nouisse pharmacum hoc calefaciendi, aut refrigerandi uirtutem habere, sed quantam habeat, definire oportet. Recalefaciunt enim resine omnes, idque sibi comune habent: attamen maioris minorisque rationem non exiguan in calore sortitæ sunt. Item succi plures non mediocriter, ratione ad maius minusque facta differentes, excalefaciunt. Nam si panacis succum cyrenæo et medico comisceas, uidebitur tibi ille nihil ceu ad hos esse. At quorsum attinet sermonem ab ijs quibus utimur quotidie, diuertere longius, memores adhuc

adhuc illorum differentia? Anethum siquidem & ruta, cepa q̄; omnia calida medicamēta magno inter se uariant discrimine. Quapropter in curationibus particulæ admodum refrigeratæ, medicamē quod impense calefaciat admouebimus: illi uerò quod paululum à naturali habitu receſſit, modico leuiq̄; calore præditum, ſicut inſigniter refrigeratæ uehementiſſimè calefaciens pharmacum adhibebitur. Meritò igitur quatuor nos excalefacientium ordines ſtatuiſumus: ſeparantes à modicè calidis ea quæ euidenti eiufmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna & uehementi adeò, ut urere uideantur. In ſingulis autem illis quatuor ordinibus diuerſis quædam uelut incipientis, nonnulla deſinentis, & ei quæ poſt hanc exiſtit, propinquæ differentiaſſe dicuntur: alia in illorum medio conſiſtunt. Itaque ſunt ex his quæ propter caloris uim exulcerant: quemadmodum etiam ex illis quæ exedentia Latine, σκπτικῆ Græce nominantur: alia ſimulatque corpora contigerint, poteſtatem ſuam oſtendunt. Quædam duabus tribuſue, aut quatuor horis opus habent: nonnulla diem totum, uel etiam poſt eum noctem, uel maius dein ſpatiū requirunt. Hæc iam ut in calefacientibus, ita quæ in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamen aliquod conſecturus eſt. Pari modo in ijs quæ humectant exiccantq̄; Cæterum materiæ medicaminū quædam à plantis, quædam à metallis, nonnulla ab animantibus proueniunt. Quas omnes in commentario de ſimplicibus medicamētis deſinitè expreſſas didiciſtis: nam cum familiaribus hic mihi ſermo potiſſimum eſt, qui precibus me adegerunt, hæc propter librorum interitum deuotò perſcri

perscribere. Iam uerò ut simplicium medicaminum uniuersorum facultates examussum uobis cognoscendæ sunt, quò ubiuis corporibus curationē desiderantibus idonea ex ijs quæ adsunt, facile possitis remedia componere: ita etiam omnium præter naturam affectuum species ad unguem tenere expedit, quas primum quidem libro de morborum, altero de symptomatum differentiis, tertio post illos de morborum causis comprehensas habetis. Ad hæc alijs tribus de symptomatum causis: uno insuper de plenitudine, necnon de febrium differentia commentario, postremo medendi methodo: in quibus affectiones actionem lædentes didicistis. Item curationem harum primam esse, quemadmodum etiam præseruationē causarum eas parientium. Docti pariter estis, primæ curationis consilium à morbi dispositionibus suggeri: cum his unà patientis particulæ naturam indicari. Præterea aëris nos ambientis temperamēta, constitutionem, ætatem, tempus, locum, uitæ propositum, & mores, plures egregij medici inspiciunt: de quibus ubi eorum usus fuerit, aliqua simul & hic nobis dicentur. Hæc itaque in memoria uos omnia sic exprompta habere expedit, si quouis loco medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum copiam habere desideratis. Insuper quomodo unum interim aliquod pharmacum sponte natum, ac simplex, morbum curare possit: cur interim cōposita nos usurpemus, rationem deinceps explicabimus.

Quis compositorum medicaminum vsus.

**S**I tantum simplicibus medicamentis uniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus utique compositi

siti unquam usus foret. At hoc nunc ita comparatum non est: nam dum corpus subinde aliquatenus calefacere conanur, simplex nullum, quod præstare id queat, habemus. Medicamentū enim affectioni cui adhibetur, potentia nimirū respondere oportet. Quòd si affectus sit frigidus, quatuor numeris à naturali habitu recedens, phar=macum totidem gradibus à caloris mediocritate seu symmetria diuersum adhibendum quis ignorat? Porro cum interim tale simplex non adsit, si duo habeamus, quorum hoc numeris quinq; illud tribus calidius sit, temperantes ea, medium efficiemus, quatuor numeris symmetron exuperans. Iam quædam simplicia citra alterius mixture ne in usu quidem esse possunt: ueluti cum emplastrum pharmacon apponere cuipiam uolumus: quippe simplex nullum ad talem usum idoneum est, neque bitumen, neque cera, neque resina, sicut neque pix, neque propolis ac ladanum: multo minus ærugo & cerussa, uel spuma argenti, uel molybdæna, uel aliud quoddam metallicum medicamen. Simili modo nec herbæ solæ emplastron pharmacon efficiunt. Quare primi emplastrorum auctores nō temerè ex oleo quoq; metallica coquere conati sunt, quæ liquefieri possint, liquefacere, ac herbas contusas siccas cribratasq; eis adijcere. Rursus in alijs affectibus unum medicamentum solum ex ijs quæ suapte natura proueniunt, usurpamus. Cui tamen nonnulla adijcimus aliquando uirium ipsius uehementiæ obtundendæ, interim insuauitatis mitigandæ gratia: quemadmodum Hippocrates in libro de Victus ratione in morbis acutis hisce uerbis inquit: Si sub transuerso septo dolor sit, ad clauic

clauiculam uerò non ascendat, emolliendus est uenter uel nigro ueratro, uel peplio: nigro quidem daucum, uel selseli, uel cuminum, uel anisum, uel aliud quid odoriferum miscendo: peplio autem silphij succum. Hac ratione manifestò Hippocrates usum quidem pharmaci purgantis esse ostendit, sed insuauitatem eius in potu, moramq; in uentriculo condimentum requirere. Multa siquidē quæ bibuntur pharmaca tam sunt assumentibus insuauia, ut stomachū peruertant, uomitumq; protinus cieant. Quædam licet paululum in uentriculo manere possint, postea tamen euomantur, prauas eructationes mouentia: quemadmodum ex purgantibus ceu condimēta sunt eiusmodi medicamina, quorum Hippocrates meminit: ita ex ijs quæ ἀνὰ θυμῶν appellantur Græcis, alia uehementiam mitigant, ut cum papaueris succum, uel hyoscyami semen miscuerimus, uel mandragoræ radicis corticem. Quare & hic pharmacorum compositionis usus est, maximus autem in morbis, qui diuersas simul facultates desiderāt, expellendi uidelicet & digerendi, uel detergendi ac leuigandi, uel incrassandi simul & attenuandi humores: ueluti multiplicis usus medicamenta, Græci πολυχρησὰ uocant, & optima, diuersas in se potestates, ut indicabimus, continent. Verum his medicamēti musturæ usus est, cum unum aliquot illorum ad multas uenenatas feras, uel exitialia pharmaca efficax habere uolumus: qui usus etiam theriacam, ut uocant, antidoton comparauit, item mithridation, aliasq; multas. Sunt porrò & aliæ quidem utilitates minores prædictis, attamen quæ crebrò nos ad remediorum compositionem descendere cogunt:

uniuersas



universas hoc in opere docebimini. Nunc enim post em-  
plasti medicaminis, & πολυχρήστου, id est ad plura uti-  
lissimi à me confecti rationem fusius expositam institu-  
tum aggrediar.

De emplasto pharmaco. Δι' χαλκίτεως.

**Q**Varatione seu industria composuerim emplastrū  
Δι' χαλκίτεως, quod à palma Græce φοινικίον ap-  
pello, medicamen glutinandis ulceribus, cicatrice obdu-  
cendis, & plegmonis curandis accommodum ( quando  
liquefactum humidi cerati crassitudinē obtinet ) uos quo-  
que animum exercete, Empiricis ac Thessali sectatori-  
bus cum inscitia ipsorum relictis, qui optima pharmaca  
à medicis inuenta diuersis constare facultatibus ignorāt.  
Exercete inquam ingenium, ut eisdem mecum usi metho-  
dis medicamenta possitis conficere: persuasi re ipsa ma-  
iores nostros ex ratione omnia illa composuisse: inci-  
dentiam uerò Empiricorum, Græci uocant περιπτωσιμ,  
esse nugatoriam. Dicenda itaq; nunc est propositi medi-  
camenti compositionis ratio. Oleum uetus, & adeps di-  
gerendi uim obtinent: Chalcitis & palmæ succus repel-  
lendi, astringendiq;. Ex his igitur pharmacum cōposui,  
quo iam cōplures usos esse nouistis: ideo quod omnibus  
sui generis melius esse usu & experiētia comprobarūt.  
Etenim ratio compositionem inuenit: experientia de in-  
uentorum uirtute decernit, ut etiā rationalium methodo-  
rum imperitis artificiose confecta fidem faciant. Porro  
cum superioribus medicamentis argenti spumā tempera-  
ui, quæ nihil magni adeò momenti adferre potest: neq; re-  
pellētibus quod influit, neq; digerētibus, quod iam parti-  
culis

culis phlegmone laborantibus infixum est : quippe sic-  
candi uirtutem habet, sed non ualidam. Quare ipsam ceu  
aptum medicamen in emplastri compositionem adiun-  
xi: nam cum prædictus incoquitur, donec substantia eius  
omnino digitos non inquinet. Adipem uerò insulsum, &  
quammaximè fieri licet uetustissimum esse cōuenit : tum  
oleum uetus similiter, quod cū suillo adipe propinquam  
uirtutem habere didicistis : licet adeps paulò maiorem  
emolliendi calefaciendiq; uim obtineat. Audiistis autem  
uetustate ipsa tenuioris substantiæ fieri, & digerere  
promptius : eoq; phlegmonis, quæ magnum parti dolo-  
rem inferunt, magis blanda ac mitia sunt ipsa recentia :  
ijs uerò quæ tales non sunt, commodiora uetusta. Et quò  
phlegmone diuturnior, & contumacior, hoc magis ue-  
tera prosunt, ac sola curare ualent : modò postea nihil  
afflictæ parti influat. Quòd si influxerit, mixtam esse  
medicamenti quoque uirtutem oportet, cuiusmodi habet  
à me compositum pharmacum, ac propterea chalcitidem  
& palmam digerentibus admiscui : non ignarus, paucas  
adeò phlegmonas diuturnas existere, quibus nihil in-  
fluat. Nam ob humores in eas confluentes diutinae esse  
solent. Porro dum hæ incipiunt & accrescunt, astringen-  
tium refrigerantiumq; medicaminū uirtus recte præ-  
pollet : ideoq; hoc emplaston pharmacum adusque hu-  
mudi cerati spissitudinem liquefactū multis utile reddi-  
tur, interim uino adiecto, uel aceto, uel aqua illiquefcēs:  
nonnunquam ex oleo crudo, ὀμωτρίδης appellant, uel  
alio quodam astringēte, quale est Hispanum, & Histri-  
cum : uel ex dulci aliquo astrictionis experte, uel etiam  
uetusto.

ueto. Ego quoque myrteo & melino, ubi ualidius astringere res postulabat, medicamentum liquefeci. Hæc ipsius compositio tali temperatura constat.

Vetusti adipis, quem institores axungiam appellant, sint pondo duo, olei ueteris pondo tria, argenti spumæ tantundem, chalcitidis pondo uncia quatuor. Hæc ita coquere oportet: Adipis membranula omnes eximuntur, reliquum \* contunditur, ut liquari possit: mox ad ignē \* cōfringitur liquefit, deinde per colum distillatur ut purum fiat, nihilq; membranæ habeat, pondo duo prædicta pendens: postea chalcitidis læuigatæ pondo triens cum olei quadrante adipe miscetur: his argenti spumæ pondo tria adiiciuntur. Ac omnia ubi simul in mortario coierint, coniiciuntur in cacabum, ac rudicula palmæ mouentur. Sufficiet autem ramus unus maiusculus, ut solida ligni parte mouendo utaris in modum spathæ dictæ: uocant enim sic quo confecturas mouent. & nos perspicuitatis gratia similiter nominabimus. Quod autem solida rami parti contiguum est, circunciditur, & tenelli procedentes ramusculi decerpti contunduntur, sed cortice prius exuto, ut segmenta iniecta pharmacum succo suo imbuant inficiantq;. Proinde statim ab initio spatha utendum est, sed tenuia palmæ fragmenta iniicere oportet, ubi medicamentum cerati temperaturam habuerit: nam si prius immittas, succus ipsorum, quem manere uolumus, ex decoctione consumetur. Insuper spathæ, qua medicamentum mouetur, pars intincta postquam inarescit, ut proprium succū non amplius seruet, amputata reijcitur, reliqua est usui. Hæc rursus quatenus medicamento intin-

Et siccata fuerit, simili modo absecatur. Constare autem  
 nobis arbitror, quòd palmæ ramū non multis diebus an-  
 te abscissum arbore esse oportet: quippe temporis inter-  
 uallo arescit, & succum amittit. Pridie igitur per hyemē  
 auferatur, æstate eodem ipso die quo cocturus es phar-  
 macum. Vbi iam coctum crassitiem, ut tactum non inqui-  
 net, acquisierit medicamen, illitum facit ad ulcera, quæ ci-  
 catricem ægrè ducunt, *Δυσείπωλα* Græcè uocantur: ad  
 cruēta ualet oleo liquefactum: benefacit phlegmonis, po-  
 dagris, articulorum morbis, inguinum inflammationi-  
 bus, phymatis, ambustis, pernionibus, fracturis ossium,  
 contusionibus, omnibus deniq; affectibus, quos appellant  
 rheumaticos. Iam uerò multi qui hernias absecant, post  
 manus operam statim ipsum cum fomentis & cataplas-  
 matis præparatum imponunt: si quidē chalcitidis uncie  
 sex immittuntur, quæ est selibra, medicamen ad magna  
 uulnera glutinanda promptius, atq; ad ea quæ cicatricē  
 ægrè ducunt, efficacius fiet. Sunt in hoc etiam alia eius-  
 dem potentie medicamenta: ipsi tamen cum oleo liquefa-  
 cto magis quàm alijs omnibus in rheumaticis affectioni-  
 bus fidendum est. Cum enim plurima eiusmodi Romæ  
 existerent, nullum tam celebre probatumq; fuit. Condu-  
 cit, ut dixi, podagricis, articulorum uitio laborantibus  
 quolibet tempore, cum dolores intensi nō sunt, qui fōtus  
 & cataplasmata lenientia postulent. Incipientibus igitur  
 atq; augescentibus etiamnum id genus uitij, liquefactum  
 pharmacum refrigerare finito, ac *σπάθονελα* deradens  
 pilæ iniicito, cui uinum superfundito: quod ut recipiat,  
 manibus subigito. Erit autem uinum austerius, ætate qui-  
 dem

dem medium, substantia non crassum, sed quàmmaxime fieri potest lucidum. Nam huiusmodi, utpote substantiæ tenuioris, in altum corpus penetrat: tantisper autem liquefacto medicamini ipsum infundito, manibus conterens, dum excipitur tempereturq;: nec humidum restet, quod non cōtrito ac emollito pharmaco mixtum sit. Ad hæc etiam si non prius refrigeratum medicamentum deraferis, liquefacto & adhuc calido uinum superfusum permiscere licet. Itaque in phlegmonōn principijs uim repulsoriam ualidiorē esse oportet. In incrementis uerò hæc nonnihil imminuenda: quæ digerit uirtus augenda est. Porro cum in statum proprium, seu uigorem phlegmones tumor peruenerit, pares inuicem esse potestates conuenit repellendi & digerendi: nisi quis uehemens dolor pharmacum leniens requiratur. Cæterū inclinante phlegmone digerendi uim augebitis, ut prorsus nihil uini eo tempore misceatis. Præterea dum id liquefcit, si quando astrictoriam qualitatem euidenter excellere uolumus, Hispanum oleum, uel Histricum, uel quod omphacinum seu omotribes, Latine immaturum, seu crudum appellant, iniiciendum est. Vbi æquales utrasque facultates habere cupias, oleo dulci, nec recenti, nec uetusto liquandum est. Si ut digerat expetis, uetus oleum, uel cicinum commodè sumitur. Itaque hoc emplastrum medicamen dum liquefit, in hunc modum temperatur: Oleum paulò copiosius quàm medicamentum esto, ut pondo uidelicet unum absoluat: medicamenti uerò decem uncias iniēcisse abundè suffecerit. Clarum est cuilibet, hoc efficacius reddi emplastrum, quò plus medicamenti

habuerit : tanto lenius ac mitius , quanto liquidius fuerit ex Rhodino liquefactum . At cerati quod inungi possit , temperamentum recipit , dum medicaminis pondo in olei selibra liquatum fuerit . Tale uerò phlegmonon inclinationibus ex usu est . Item sedis , rectiq; intestini tumores phlegmonodas sponte abortos omnibus melius iuuat : atqui tunc liquefactum oportuit cum oleo copiosiore , ut per cornu recti foraminis , cui uesica suis alligata sit , immittatur , uelut in eiusmodi usurpare consueuimus . Ad hæc frequenter ipsum in his ex Rhodino liquefecimus , cacabo uasi in quo liquecit prius subiecto , qui calidam contineat : prunis uerò ardentibus incumbat , aut flammæ fumo carenti . Iam uerò pro superioris temperaturæ modo liquatum , ut liquidi cerati spissitudinem habeat , & naturalium & podicis ulcera persanat , imò & alia omnia , uel etiam ulceratos perniones , & ambusta : etenim uniuerfa statim inflammatione liberat , puraq; reddit , & solida implet carne , præsertim ubi plus chalcitidis adiectum fuerit . Insuper nemo ignorat , uinum quoq; medicamento id effecturo admiscendum esse . Quòd si acetum acceperit , ambustis optimè facit , & statim , & postea quolibet tempore impositum : siue illa iam pustulas , siue non habeant . Constat idem facere medicamentum hoc , si quis in aqua feruenti ustus fuerit : qui etiam affectus Græcè πυρκαυτός , Latine ambustum igne dicitur . Porro si pharmacum antè imposueris quàm phlegmone sit orta , nihil adeò ipsius generationem impedit prohibetq; . Quapropter , ut dictum est , nonnulli qui hernias secant , statim eo utuntur , nec prius uulnere madefacto .

Ad

Ad hæc contusionibus, fracturis, & qualibuscunque plagis, si liquidum imponitur, præsens est remedium. Ligamentis autem circumdatum fasciarum instar quibus rupturæ deligantur, *καταγματικὸς* uocant, œdemata omnia & inflationes mirificè iuuat. Cùm malo succo corpus abundat, uel admodum sensibile est, quàmprimum contusis & percussis partibus illud impones, hyoscyamos recens adijcietur: qui si non est propter anni tempus aut locum, nihilo magis desiderabis, si adiungas eum qui uere depositus est, qualis etiam singulis annis ex Creta Romanam apportatur. Hoc magis adhuc lene ac blandum medicamen succus mandragoræ mistus efficiet. Noni autem uos latet, & hunc à Creta optimum fictilibus poculis huc afferri, cuius unciam unam libræ olei emplastri liquefcentis miscere sufficit. Atque interim amplius, interim minus impones, prout dispositio postulat. Conducit etiam in eiusmodi corporibus pharmacum ex Rhodino liquefactum esse. Cæterum ex casu conquassatis partibus, uel ligno, uel lapide percussis, etsi ecchymosis quædam contigerit, protinus ab initio medicamen commodè imponetur ex uino, ut docui, liquefactum. Quod uinum, inquam, die tertio, aut certè quarto, si particula inflammatione careat, auferri oportet: oleo autem ueteri emplastrum liquare. Nam si plenius astringantur ecchymomata, uix queant per halitum digeri. Hoc medicamentum etiam utor aduersus erysipelata, præsertim phlegmonode: adhuc longè magis ad phlegmonas erysipelato-dēs. Principio igitur impono ipsum liquatum ex Rhodino, quod oleo omotribi, id est crudo & salis experte

constet: cuiusmodi erysipelatus est accommodatissimum. Ita iam liquefacto solani sucus per totum accuratè permixtus uniuersus & irriguus mortario superfundatur: qui si non adest, psyllij: si æstas fuerit, etiam uua acerba cum portulacæ, uel semperuiui succo. Etenim uua liquor per se plus quàm oportet, astringit. Tanta autem astrictio erysipelata promouet, ut quæ calorem ipso= rum cutem densando includat. Rursus portulacæ succus, neque is solus præ lentore nimio potest exprimi. Optimum igitur est, qui ex uua acerba prius tussa exprimitur, portulacæ in-pila committere, & sic iterum contundere. Deinde ubi mixtorum unitas diligenter facta fuerit, liquorem elicere. Simili modo etiam semperuiui succum exprimes: nam seorsum neque ex hoc, quemadmodum neque ex cotyledone succum copiosum exprimere quisquam potest. At mandragoræ pomorum uirentium succus recens adiectus magis aptum medicamen efficiet: quem si tempus non admittat, illius quæ à Creta, uel alio quopiam loco aduehatur, mescere nō dubitabis: quin & hyoscyami succum temperare ei consueuimus, interim meconiū, qui papaueris esse Latinis dicitur. Satius autē est, unā cum hoc & glauci quippiā superindere. At his multo imbecillior, sed acquisitu facilis lactucæ succus est, tum agrestis, tum hortensis: quam uniuersi Græci huius tempestatis non θρίδακιν, sed θρίδακκα nomināt: agrestem solam θρίδακιν appellantes. His rursus cico= rij, polygoni, trifolij, & auriculæ muris succi minus ad refrigerandum efficaces sunt: quanquam & ipsi refrigerent. Sed euidētius lenticula palustribus locis proueniēs.

Horum



Horum omnium penuria miscebis acetum & aquā, quæ ascititias qualitates frigidas habeant: uasis uidelicet admodum frigida, aut niui insistentibus, atque ipsum Phœnicinum medicamentum æquè refrigeratum erysipelatis admoueat, donec uehemens ipsorum ardor subsidat. Liquet autem, subinde ea quæ aduentitia qualitate frigida erysipelatosus affectibus succurrunt, immutanda esse, maxime, ubi exactum erysipelas citra phlegmonem fuerit. Posteaquam uerò acris illa inflammatio quieuerit, aut nec perfectum planè erysipelas affligerit, sed uel erysipelatodes phlegmone, uel phlegmonodes erysipelas, non adhuc externum frigus admolienmur, uerum à succis etiam impense frigidis abstinēbimus: eos medicamini liquefacto miscētes, qui mediocriter refrigerant. Ab his iam & linospermī & chamæmeli succum temperamus, ex eoq; solo postea medicamine liquato utemur, nihil aliud præterea immittentes. At si quando liuidum ex frigefacientium ui erysipelas euaserit, non id amplius erysipelas appellandum est: sed abstinere non à uini mixtura modò, sed Rhodini quoq; & astringentium oleorum oportet. Nam solum Phœnicinum ueteri oleo liquefactum, quod liuorem contraxit per halitum discutere potest: & tunc affectæ partes aqua calida fouentur, & scarificantur. Vobis si fuerit uisum hoc interdum facere, protinus Phœnicini liquefacti humidum medicamen, cui uinum adiectum sit, imponere conuenit: altero die uinum auferendum. Quòd si plus impendiò erysipelas medicamentorum uiolentia refrigerit, ut iam quoque nigricet, perfusione & scarifica-

tione utemur. Atque citra hæc calcis uiuæ quippiam liquefcenti pharmaco immuttemus. Dum uerò laborantes teneri sunt, lotam ipsam usurpabimus: tunc prodest etiã succus coriandri pharmaco inditus, qui sanè cum cerato rhodino iuuat non mediocriter. Ad hæc quæ iam similes affectus alia pleraque medicamenta curant, sequenti sermone dicentur: quædam pari uirtute Phœnicini, nonnulla efficaciore prædita. Porro aduersus fluxionũ uitia, omnium facile optimum hoc remedium est, ut quod spe maiora frequenter præstiterit. Cum itaque femur aliquando prope inguen cruda phlegmone totum id affligente suppurasset, crus ita nobis figurabatur, ut sanies ad inguen conflueret. Facto autem ulcere, dum hoc longiore interuallo contingeret, fluxio quæ in femur decubuerat, euacuata est. Sed fistulosa quædam dispositio sub femoris totius cute orta est, ut ipsam iuxta patellam, quæ genu pars ἐπιγονᾶς Græcis dicitur, diuidere cogitarem, quò saniei utrinque liber esset exitus: medicamentis autem liquidis inditis altius penetrandi uia prœptior. Vbi iã femur soluissem, postero die quo incidere ipsum decreueram, inuenta sunt omnia concocta, arida, madorisq; expertia. Nemo igitur non nouit quod rationi consentaneum erat, & postero die, & sequentibus similiter uti pharmaco: quando quidem particula quotidie coloratior ac sanior quàm antea reddebatur. Curato itaque hoc modo adulescente, postea multas rheumaticas affectiones hoc medicamine sanaui, quæ quidem oras simplices haberent, sed ut committi non possent, & fistulosæ intus essent. Non tamen ab ipsius pharmaci usu desistendum

dum esse suadeo, etiam si multis diebus evidens nullum præsidium afferre uideatur, ut quod postea uno interim die simul uniuersam utilitatem maximam ostēdat. Quare bono animo hoc semper in rheumatis utamini: in corpore tenero quidem, uel puero, uel muliere ad prædictā mixturam quatuor uncias chalcitidis immittentes, in ualido ac duro pro aliorum portione, uel unciam unam, uel duas apponentes, ut quinque uel sex chalcitidis uncie sint, tres libræ utriusque, nempe olei ueteris, & argenti spumæ. Duæ uetusti adipis, quem institores axungiam appellare diximus, diluatur in rheumatum uitij oleo dulci nec nouo nec ueteri: assumaturq; uinum austerum ætatis mediæ. Hoc pharmacum coarguit Thessali nugacitatem, efficacissimum auxilium à contrarijs potentij compositum ostendens: unde si alteram adimas, nihil prædictorum fiet. Neque enim ex astringentibus solum, siue laxantibus ad rheumaticos affectus magnam commoditatem afferet, uel certè ad phlegmonas incipientes, & augescentes. Neque lenimentum, neque discutiendi uim ex solis relaxantibus sine astrictione confectura nanciscetur: quæ indurata habent emollire. Porò laxabit perfectè, & mediocriter emolliet, si non admodum uetus oleum & adipem receperit. Quod itaque Mnaseus pharmacum condidit, æqualia inuicem continet, tum oleum, tum argenti spumam, tum adipem, sed maximè phlegmonis incipientibus incrementibusq; est contrarium. Habet & nostrum hoc eadem quæ Mnasei, argenti spumam uidelicet, adipem & oleum: si nihil ex ijs quæ astringunt acceperit, particulas enervat, & ro-

bur earum dissoluit: ob quod etiam fluxioni fiunt obnoxie. Didicistis enim, non semper ob calorem immodicum, ut quidam arbitrantur, corporis particulas fluxionibus laborare, sed hoc raro accidere: imbecillitatem uero illarum id genus uitij progignere, quæ ut plurimum ex intemperie frigida proficiscitur. Itaque si humectet eas quispiam, calefaciatq; medicamentis laxantibus, dissolutione prorsus & infirmæ fiunt. Rursus si tumores in rheumaticis morbis fortiter astringat, initio quidem proficere uidebitur: cæterum qui restat, cõtumacem & scirrosam faciet. Nam tales affectus subinde ne quidem ferunt nimis astringentium impositionem, ut à quibus dolore & tensione molestantur. Atqui omnis dolor inflàmata excuit irritatq; & fluxionibus occasionem præbet: quamuis rheumatica intemperie æger non afficiatur. Sed miri nihil est Theßalum medicæ artis operum inexpertum, & qui morbos ratione inuenire nequeat, omnem phlegmonarum curationem ignorare. Vobis autem qui crebrotum Phœnicini huius, tum aliorum medicamentorũ, quæ contrarijs constant uirtutibus, efficacissima in multis morbis auxilia uideritis: conandum est interim, ubi iam composita desiderantur, eadem methodo ex illis quæcunque regio præbet, cõficere: cum phlegmonẽ suspicamini futuram, uel incepisse modò, quæ magis astringũt: in augmento, quæ minus: in statu & inclinatione, quæ magis relaxant, & digerũt. Semper tamẽ utraq; misceatur, & repellẽdi, & discutiẽdi facultas: nisi quãdo fluxio prorsus cõstiterit, et corpus uacuum fuerit, tũc ad digerẽtẽ, sicut in primis incurfis ad repulsiuã uirtutẽ, tuta est accessio.

De emplastris quæ ex argenti spuma præparantur.

**Q**uoniam in emplastri mei Phœnicini confectura adipem uetustam & oleum, digerendi potestatem habere dixi, chalcitidem uerò & palmam colligendi repellendiq; : hæc autem medicamen emplastrū sine argenti spuma procreare non possunt: ob id uisum mihi est de ipsius spumæ usu deinceps uerba facere. Siquidem Phœnicini uiribus nec eam obesse, nec conducere, sed materiæ ad emplasti pharmaci compositionem idoneæ rationem obtinere putandum est. Non absurdum itaque mihi apparet, si de eiusmodi medicamentis, exempli gratia, de spuma argenti disputationem instituero. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullam, aut exiguam admodum pharmaco quod præparatur simul afferunt: commoditatem uerò materiæ præbent, ut uel emplastri, uel ceræti speciem referat. Neque enim argenti spuma manifestò Argenti spumæ usus & uires. calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed modicam siccandi habet uirtutē in primo abscessu, ab his quæ adanussim media sunt inter humida & sicca. Non tamen uis eius est ferruminare, sicut nec aperire: item nec abstergere, quemadmodum nec expurgare euidenter, sed paulum à medijs ad crassius recessit. Verum hoc quoque ex diuturna coctione deponit fusa ob ignis potentiā, & alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modicè exiccare cognoscitur. Ad hæc neque acrem, uel suauem, neque acidam, uel amarā, uel austeram, uel acerbam, uel omnino astringentem facultatem ipsam habere gustus abundè testis est.

Quem

Quemadmodum etiam ulcera nec ab ea derodi, nec cale-  
fieri, nec refrigerari, nec purgari, nec carne impleri, nec  
cum caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaq; no-  
bis in uarium usum administrare argenti spumam, inte-  
rim ex oleo & aqua coctionem eius adusque emplastri  
spissitudinem molientibus, interdum ex oleo & aceto,  
aliquando ex oleo & uino. Porro in quibuscunque isto-  
rum coquatur, melius id medicamento redditur, quod ma-  
gis coctum fuerit, quod liquidorum quæ miscentur co-  
pia continget. Est enim ex ijs pharmacis, quæ liquefieri  
possunt, etiam spuma argenti, dum tota funditur, sicut re-  
sina & cera: sed non statim ubi ignem contigerit. Vnde  
multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant.  
Igitur cum oxelæo cocta, liquefcit citius perinde ut cum  
ærugine, quæ & ipsa fundi solet, uti chalcitis & misy.

De metallis  
quæ liquefiunt

Omnium itaque celerrimè chalcitis funditur: tardissimè  
argenti spuma. At in horum medio sunt ærugo & misy:  
funditur & fori, sed lōgiore tēporis interuallo, ut quod  
terrestre magis & saxeum sit quàm chalcitis & misy:  
sed de his iterum dicetur. Argēti spumam per oxelæum  
coquens ocyus liquefacies, per hydrelæū tardius: tamen  
funditur sic quoq; , si duplum eius sit utrunq; liquidum.  
Ego certè plus etiam quàm duplum miscui frequenter,  
ut paulò post exponam. Atqui melius est statim ab initio  
hæc tria in mortario temperare, argēti spumam, aquam,  
& oleum. Quòd si candidum medicamen esse cures, o-  
leum purius lucidiusq; inijcito, atque aquam simaliter pu-  
ram ac candidam, coquaturq; in loco sub dio soli expo-  
sito: quia nubilus aër pharmacū denigrat: syncerus ma-  
gnus

gnum ad albedinem adiuumentum adfert, sicut aqua in huiusmodi aëre aspersa. Cæterum obseruato, ut coctionem lignis, aut carbonibus peruri incipientibus moliaris. Nā Vt cādidum  
 fumus ei facile nigredinem conciliat. Perustis igitur an= sit emplastrū  
 tea carbonibus cum exacte ardent, tunc coctionem auspi-  
 care. Quod si illam protinus non absoluant, in alio foco  
 simili modo carbonibus preparatis cacabum superponi-  
 to. Quæ ergo medicaminis candidi faciendi gratia ob-  
 seruanda sunt, abunde satis indicatum est. Iam uerò hoc  
 fit glutinantius, quo plus, ut demonstratum est, liquoris  
 affuerit. Quemadmodum si singulorum trium pondo li-  
 bram unam iniicias, firmitus adhærebit. At si argenti spu-  
 ma non illique scat, causa est potissimum, cur id facile de-  
 cidat: sicut diutius adhæret, cum argenti spuma cocta fun-  
 ditur, alteraturq; . Candidius sanè erit, citiusq; coquetur,  
 libris duabus aquæ in tres utriusque, puta spumæ argen-  
 ti & olei iniectis . Atque hoc in paruis ulceribus uti con-  
 sueuimus. Medicamenti, quod aqua coquitur, potestas  
 nota est, si meminerimus eorum, quæ in commentario de  
 simplicibus medicamentis dicta sunt.

De emplastro quod ex argenti spuma  
 & hydrelæo conficitur.

**A**qua peculiari substantia semper humectat & re-  
 frigerat. Ascititio autem calore assumpto, donec  
 ipsum perseruat, excalescit: frigida facta refrigerat.  
 Oleum sanè si recens sit, pharmaco non renititur: perma-  
 net enim humidum & modicè frigidum, quali maxime  
 tenera corpora & uitiosis humoribus obnoxia indigēt.

Mulieres

Mulieres itaque & pueri, atq; ex grandioribus mollem corporis habitum sortiti, nempe candidi cute, eius generis medicamenta requirūt. Porro coctum ostendimus ex oleo copiosiore, & aqua reddi tam glutinans, ut ne quidem à lotis decídat. Etenim ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt, multis diebus subsequētib; pharmacū immānare expedit, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Notum est huiusmodi pharmacum pruritus, desquamata, & ut uno uerbo expédiam, praua ulcera persanare, in quibus & subliquidum, ut uocant, ceratum, aliāq; id genus utiliora sunt ijs, quæ ualidam potestatem occupāt, qualia magnis uulneribus imponuntur. De quorū omniū simul uirtute in tertio libro de morbis curandis dictū nobis est: in quo generales communesq; sermones (uniuersales nuncupant) de quaque ulceris differentia tradidimus, ostendentes, quales medicamentorum, quibus illa curabuntur, uires esse conueniat. Hic uero particulares materias recensemus, temperaturas eorum definientes & modos, quibusq; in præparatione reddantur optima demonstrantes. Ex hydrelæo itaque argenti spuma, sicuti comprehensum est, præparata, emplastrum tactu blandissimum, & adhærendo pertinax efficit: præterea aspectu album, refrigeratoriā uim habens mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & iam influxū denuò ad partes extimas retrudit, ut res fiat huiusmodi, qualis cum spongiam aqua frigida humentē particulæ cuidam corporis imponimus. Nam illa rugosum contractumq; totum locum facit, non tantum expellens quod influit, sed etiam quod in eo continetur ad uici-

cina



cina extundens. Atque emplastrum modò commemoratum, non ex prima facultate, sed per accidens exiccare dicetur. Propriè nimirum & primariò ea quæ digerūt, & temperamenta ad sicciorē statum perducunt, nominantur siccantia: ex accidenti uerò etiam ea, quæ frigoris causa id quod influit, remittunt: quod continetur, expellunt. In summa, nullum humectans, uel primariò, uel ex accidenti ulceribus commodum est, ut in tertio Methodi medendi libro demonstrauius.

De emplaistro quod ex argenti spuma  
& oxelæo componitur.

**D**E argenti spuma quæ ex hydrelæo præparatur etiam hæc sufficiunt. Digrediendum modò est ad eam, quæ oxelæo cõponitur. Itaq; mediocriter exiccans medicamentum fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumæ misceatur. At si uetus oleum sit, multo magis exiccat: copiosior uerò duplo utriusq; mensura ualentius facit pharmacum. Quæ propter fistulas, quæ nondum callum durum habet, curat. Cæterum spumæ argenti una pars inijcitur: illorum singulorum duæ s. Quinetiam tripla cuiusq; parte temperata nonnunquam toto die coxi medicamentum. Vnde quidem reddebatur nigrum, sed perinde ac bitumẽ probum splendebat. Porro maxima siccandi potetia pollet, curatq; ulcera perdifficilia, & fistulas, quales dixi, iūgit, tū uulnera cruēta glutinat: uno uerbo, exiccat sine morsu. Huius rei gratia etiam alia uniuersa ulcera sanat, maiora minoraq; donec ad cicatricē perueniāt. Aequum est & alia quædā eius opera cõmemorare, quæ forsā ne quidem

quidem speraueris, quantū ad materiæ humilitatē attinet. Nam cum febris solutio ex parotide suppurata cuiusdam accidisset, fistulam fieri suspicatus sumus, quam sex mensibus post principium in agro mihi ostenderunt. Erat enim puer agricolæ annos natus circiter quindecim: huic cum ex emplastro illo, quanta tunc mihi copia aderat, imponendum dedissem, ipse in urbem reuersus sum, pluribus negotijs medicis occupatus: interea oblitus sum eius qui pharmacum acceperat: sed à bimestri præter animi mei expectationem uenit incolumis: immittentibus enim nobis suillum pilū per fistulam, ad articuli commissuram usque procedere uidebatur. Non multo post, cum alius puer forte fortuna eiusdem cum priore ætatis, eodemq; morbo laborās mihi esset ostensus, emplastrum hoc imposui, quo ille pariter integræ sanitati restitutus est. Ab eo tempore plurimos simili uitio huius medicamenti uirtute liberaui, tum pueros, tum adolēscētes, tum mulieres. Vos igitur, si uti eo ad huiusmodi affectus uolueritis, uetustissimum oleum, & acetum quāmacerrimum, ex uino uidelicet solo confectum inijcitate: non ut quidam aqua mixta ipsum præparant: sed purum sit, & quāmaxime licet pellucidum. Tale siquidē tenuius commodiusq; ijs erit, ad quæ ipsum requirimus. Hoc pharmaco etiam musculos induratos subinde curaui.

De emplastro quod ex argenti spuma & ænelæo præparatur.

**R**eliquum est, ut de argenti spuma dicam, quæ ex ænelæo componitur, & parem prædictis temperaturam

turam ac uirtutis excessus pro humorum copia resson-  
dentes habet. Etenum æquali portione tria iuxta præpa-  
raui, & duplo maiore utriusque liquidi mensura quàm  
argenti spumæ: interdum triplo imposita. Confeci au-  
tem nonnunquam hoc modo: Per æstatem sole calido ar-  
genti spumam ex uino falerno conterebam singulis die-  
bus quindecim continuus, uinum rursus, si fortè primum  
euaporarat, infundens. Ab eo tempore coctum medica-  
men exiccans abundè factum est: quo in rheumaticis con-  
stitutionibus perinde ac Palmeo, quod *ποιμνίου* appella-  
ui, usus sum: ex oleo liquefaciens, ut in illo prædictum  
est. Ac femur iamdiu induratum, cruentaq; uulnera eo  
sanauimus. In summa, ad omnia fuit optimum. Atqui si  
falernum ad manum non habeas, aliud sumito colore ful-  
uum, sed tenuæ substantia, ut pelluceat: cuiusmodi est  
Ariusium, quod in Chio nascitur, & odorum uehemen-  
ter Lesbium: in Mitylena paucum, in Eresso & Me-  
thymna copiosius meliusq; proueniens. Item quod faler-  
no simile est, Tmolites. Est & hoc tenuissimum, fuluum  
colore, dulce mediocriter, nimisquàm odoratum. hoc in-  
ueteratum omnibus usui esse potest, quibus & falernū.  
Insuper aliud Tmolites uinū est simile ei colore & sub-  
stantia: uerū nec dulce, nec odorum. Habet autem uim  
quandam astringendi, sed suauitate multò inferius est.  
Hæc itaque ex cocta spuma argenti fiunt medicamenta.

De crudæ spumæ argenti usu.

**I**N cocta quidem per se, ut annotauimus, attritus emen-  
dat. Ex oleo autem seu uino trita siccataq; ulceribus  
medetur, quæ ob humiditatem uix cicatricem recipiunt.

Quòd si rosionis expertem esse cupis, clota utitor.

Quomodo lauare oporteat argenti spumam, & reliqua metallica.

**F**Acilè cluitur, ut quæ statim propter innatam grauitatem liquoribus, in quibus læuigatur subsidat: unde totam rosionem in aqua lota exuit: acuti uerò sensus homines, parum adeò mordacem percipiunt, si ex aceto uel uino eluatur. Porrò conuenit, diligenter toto die contritam cum liquore per noctem relinquere: postero die mane illum auferre: alium mox superfundere: postea rursus terere similiter: iterumque sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciundum est, donec simul cum liquido argenti spumæ uelut tenuissima quedam portio appareat: cùmque nihil sorditici amplius inest, nihil etiam magis effundendum est. Attamen conterere diebus pluribus, etsi nihil ei insistat, sole fruenti satius est: ita enim accidit, ut medicamentum exiccet ualentius. Porrò nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, uerum in alijs etiam quæ hoc modo præparantur fieri commodius. Siquidem cadmua, æris squama, æs ustum, item quod uocatur diphryges, cerussa, nussy, fori, stymmu, & omnes lapides, præterea calx perinde ut argenti spuma ex liquore aliquo prædicto eluuntur, læuiganturque: interdum ex marina præparationem ipsorum molior, de quibus in sermone processu rursus agitabitur. Nunc enim propositum mihi est emplastra per censere, quæ iuniores medici cum s̃ in ultima syllaba & scribunt & enunciant: quemadmodum

modum in Centrio, & Milotride facere omnes consueuerunt. Siquidem in his prima nominum positio uidetur sine *ῥω* facta fuisse à uerbo quidem *κεντρῆς* Centrio nominato, ultima syllaba *ῥω* non habēte: Milotride uerò cōposita ex *μολῶ* & *οτε*. At cū hoc tēpore propè omnes ea cū *ῥω* effrānt, non peccaueris, si eodē modo cum illis pronūcies, præsertim in Centrio. Quippe ostendimus in opere quod cōtra illos, qui barbarè loquentes corripūnt, prodidimus, & ipsos Atticos uiros ualēscētē usum & consuetudinē secutos fuisse. Nā alij quoq; ante me indicarunt Atticorum linguam permultū à proprietate sua decidisse: ac omnes, quorū eloquentiæ laus ac gloria maxima apud Græcos extat, suæ quēq; tēpestatis morem imitatos fuisse. Et nos itaq; cum nullum non inueniamus nunc medicamentarios libros emplastri nomen cum *ῥω* scriptum habere, usum præualentem sequemur.

De medicamētis quæ ex molybdæna cōficiūtur.

**R**elatum est superius quoq;, molybdænā & argenti spumam in eūdē fere usum adhiberi. Omnia enim quæ ex argenti spuma componuntur, etiam ex molybdæna fieri possunt: sed facultate inuicem differunt, tantum ut molybdæna substantiæ crassioris frigidiorisq; sit: argenti spuma tenuioris, & inter calidam ac frigidam mediæ. Cæterum colores medicamentorum, quæ inde præparantur, molybdæna nonnihil euariat, quāto magis giluos ipsos efficit. Quare & alborum emplastrorum, quæ non modo cerussam, sed argenti spumam quoque habent, nullum ex molybdæna constat. Cuius mistura color

albus, cinerius redditur: potestas autem ut in albo emplastro, quod ex hydreleo componitur, melior etiam euadit, præcipue in teneris corporibus, tantum abest ut pereat. Cũ discutere quid uolumus, argenti spuma quàm molybdæna potior est. Pari modo in reliquis medicamentis, quæ ex argenti spuma compositionis titulum sortita sunt, cum molybdænam adiicimus, color & uirtus immutatur, quantum paulò ante uobis indicaui.

De emplastris albis quæ ex argenti spuma,  
& cerussa fiunt.

**V**EL coloris causa medici cerussam argenti spumæ ad emplastra alba conficienda miscent, uel ut quâdam astringendi, ac refrigerandi uim medicamento concilient. Quippe uidentes huiusmodi nigrescere, cum largius coctum fuerit, præsertim lignis, & ijs forsitan funidis, nec in aëre puro, mox ab igne tollere coguntur: ob quod ipsum nec aquam copiosam, nec oleum temperare. Merito igitur resinam ei adiungere considerarunt, quo se quax, ac sibi continuum fiat, uiscosum quid assumens, maximè cum liquida resina immittitur. at ex tali mixtura deterius efficitur pharmacum: etenim mordax aliquid resina repræsentat: quod siccet nihil adeò generosum: cuius usum priuatim ulceribus esse necessarium didicistis. Quædam itaque resinæ uel insigniter derodunt, de quibus uniuersis iterum sermo futurus est. Mitissimæ uerò duæ inter eas sunt: prima terebinthina, laryx altera nuncupatur. Has igitur miscere satius est, ubi id genus emplastri conficere cogitas. At multò leniora tactu  
omnia

omnia fiunt, tum quæ resina constant, si ceræ quid adiectum sit : tum quæ ex cera, si resinæ nonnihil admixtum habeant : quamobrem cera resinæ temperanda est, ut autem color emplastri albus seruetur, albam esse congruit. Est sanè alba, quæ suapte natura provenit, pontica : sic nominari consuevit, licet aliunde ueniat, quòd plurima in Ponto alba nascatur, alijs in regionibus paucissima. At candida, quæ tyrrhenica nominata est, non sponte crescit, quare nullam euidentem habet acrimoniam. Quæ uerò suo instinctu crescunt, nonnullæ acres sunt, quas prius eluere oportet in hunc modum: Liqueantur primùm ad ignem, deinde in aqua fontis pura demerguntur : ubi permouentur expurganturq;. Simili ratione & pix, & resina, & quod physema dicitur, lauandum est. de quibus iterum exactius commentabimur. In præsentia, quoniam albi emplastri compositionem tradimus, reliquum eorum quæ præcepta sunt deinceps percensebimus. Posteaquam ergo cerussæ, spumæq; argenti coctis prius usque dum medicamen digitos non inquinans appareat, cera simul cum resina fuerit adiecta, candidum emplastrum, si placet, habebitis : interim aquam iniicientes, interim oleum duntaxat : idq; nunc recens, nunc uetus. Prius enim iam audiuiſtis, quam uirtutem aqua & oleum uetus habeat : Nouiſtis item, quod omphacinum oleum, & id quod colitur in Hiberia, quæ nunc Hispania dicitur, astringens quippiam pharmaco adiicit. Histricum non modò exiguam astrictionem, sed amaritudinem quoque refert. Proinde different tantum ex astringentibus confecturæ, ab ijs quæ dulci oleo constant, quanto initio ula

ceris & fini potiora sunt omnia quæ nonnihil astringēs continent : in medijs, dulcia . Nam in principio medica-  
menta repellentia prosunt ulceribus, ne phlegmone cor-  
ripiantur . Inde quæ magis relaxent , si non phlegmone  
adsit, transpiratus gratia: quòd si affuerit, etiam ob illam  
ut citius dissoluatur . Atqui clarum est, de parua phleg-  
mone uerba fieri : siquidem exigua ulcera, in quibus al-  
bis hisce emplastris utimur, magna comutari phlegmone  
non potest, si error nullus accesserit . Cæterum ulceribus  
quæ ad cicatricem ueniunt , astringendi qualitatem uti-  
lem esse cui obscurum est ? Tempus igitur iam postulat,  
medicaminum quæ emplastrum album utilissimum con-  
stituunt, temperaturam exponere .

#### Pondus emplastri.

Acqua sit portio utriusque metallici , cerussæ & ar-  
genti spumæ : & hæc, si uideatur, esto singulorum pon-  
do libra: olei uerò mensura amborum simul pondus ab-  
soluat, uel ut Romani dicunt, sint pondo libræ duæ, ceræ  
pondo selibra, terebinthinæ illius dimidium, hoc est, pon-  
do uncia tres . Quòd si thus admisceas , primum lenius  
euadet, seu ut Græci dicunt, ἀνωσυνώτερον, tum parua ul-  
cera, quæ phlegmone infestat, ocus concoquet : sed ad  
cicatricem ducendam erit imbecillius . Nam carnem su-  
percrescentem promouet, quoniam thus σαρκωτικόν est,  
ut in tertio libro de morbis curandis legis . Satius itaq;  
est, iniicere & aluminis paululum, tum ad cicatricem du-  
cendam, tum alterius causa: quandoquidem laxantia me-  
dicamenta plethoricis, & uitioso succo obnoxijis corpo-  
ribus adhibita, affectus partibus fluxū concitant . Ex his  
it. iq;



itaq; omnibus cōpositū medicamē, tumores præter naturam in molli corpore, qui nec magni adeò, nec dolorifici sunt, discutere poterit: præsertim cū thus abundè assumperit. Erit itaq; in prædictis copiosum thus, si æquale terebinthinæ pōdus accipiat: sin eius dimidiū, minorē digerēdi vim medicamētū habebit. Magis autē cicatrici ducēdæ erit idoneū, q̄ quod duplo copiosius id receperit. Iam si plenius adhuc digerere cupiatis, etiā piperis albi pauxillū adijcitate, quod ulcerū cicatrici obducēdæ nihil obesse potest. Sit igitur aluminis pōdo uncia, in piperis semūcia: Ratio siquē est, huius tres denarios, illius sex iniicere. Quoniā uerò præstat alumē, et aliās quod sciñil le nominatur, & colore cādidū est, id immutare expedit.

Quomodo candida emplastra componenda  
sint aduersus vlcera, cacoëthe, & quæ  
cicatricē difficulter admittunt.

**Q**Uæ dysepulota, id est, uix ad cicatricē uenientia, quæ item каконѣ, id est, maligna uocē, distinguendum modò est: quia non solū in præsentē disputationem, sed etiā in futurā commodū est. Quæ itaq; ex humorum cōfluxu, uel multorum, uel acriū oriuntur, sine eo quòd locus affectus huiusmodi iam dispositionem habuerit, ut licet bonum sit quod influat, tamen ipsum corrūpat, dysepulota nomino. Porro quæ iam dictū obtinent affectū, singulari uocabulo cacoëthe appello. Nunc igitur cum priores me emplastra quædā alba, ut quæ dysepulotis cicatricē probè obducāt, cōscripserint, propterea ego quoque alba scribo emplastra, quæ aduersus dysepulota omnia, & cacoëthe nōnulla, quæ nō prauū admodum ha-

bent statum, composui : Nam in illis denuò medicamenta accommoda dicuntur . Primum hic methodum dicturus sum, qua id genus emplastra quàm plurima conficere discetis . Duplex enim scopus est : alter omnium quæ ratione componuntur medicamentorum communis : alter peculiaris colore ab his differens . Quæ igitur in commentario de simplicibus medicamentis cognouistis , sine rosione quidem ac morsu, ualidè tamen adeò exiccantia, hæc in memoriam reducite. Omnino autem referebat ea, præterquam quòd non erodunt uel astringunt, manifestò etiam detergere posse. Siquidem caua plurima eius generis ulcera tanquam ab exesione humorum malignorum facta apparent : eiusq; rei gratia carne impleri desiderant . Ostendimus in tertio Therapeutices libro , omnia quæ carnem generant medicamenta detergendi facultatem habere : Multa etiam alia siccam obtinent uirtutem, huiusmodi ulceribus curandis accommodam . Sed age nunc repetamus ea, quæ candorem tueri possint, aut non adeò lædere . Hoc ex genere est cadmia , pompholyx, calx, ostrea cōcremata, purpura, buccina, & sepie pars ossea : parum officiet colori & æris squama, & ustæ chalcitidis non fuluum, sed cinereum, uel subalbidum. Quomodo autem huiusmodi præparandum sit, rursus in theriacæ antidoti sermone dicemus . Porro dictorum quodq; si lauetur, totam rosionem amittet : quemadmodum cera quæ medicamini conficiendo admiscebitur, tum resina. Cæterum quòd cera tyrrhenica, uel pontica dicta, ad cādidi emplastri præparationem sit idonea, prius explicatum est : resina uero & laryx, & terebinthina,

uti

uti uocantur, aduersus ulcera maligniora magis ualent. Thuris partem aliquam indere non abs re fuerit, ut ulcerum maleficorum dispositio coquatur, & ad suppurationem ueniat. At non solum ex prædictis medicamentis unumquodque lauandum uenit, sed etiam metallica, tum quammaximè in loco soli exposito, uel aqua, uel aceto, uel marina, uel uino læuigare oportet: pura autem & candida, & perspicua singula erunt, candoris cuiusdam medicamento conciliandi gratia. De cerussa, oleo, coctionis modo, aëre circumfluo, & igne, quomodo quodque eorum albedinẽ adferat exposuimus. At quemadmodum in alijs, ita in his quoq; facultatis aquæ, aceti, marinæ, uiniq; albißimi peritum id in compositura temperare conuenit, quod insigniter curando morbo profuturum est. Etenim in ulceribus prætumidis, ὀχθωδῆ ἀpellant, quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuationem requirentes habent, ex aceto & marina curiosè læuigata, magis quàm quæ per aquam idonea sunt. In quibus autem acre & mordax est humidum, quod in ulcera fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est. Quemadmodum rursus ex uino magis, ubi copiosus humor ulceribus influens apparet. Hæc igitur singula quæ dixi, in unoquoq; iam nominato humore læuigata diebus pluribus, inieci frequenter pharmacis, & omniũ cicatricem ducentiũ, quæ cerussa & argenti spuma constant, expertus sum optima. Verũ scriptiones quasdam amicis quoq; dedimus, qui huiusmodi pharmaca desiderarent: à quibus ipsis in usum ac experientiam producta, quod titulo promittunt tueri uidentur. Itaq; argenti

*spuma cum cerussa prius cocta, & medicamento ferè ad puram consistentiã perueniente, inijcienda est larix, uel terebinthina resina cum cera candida. His pulchre unitis adde metallica, quæ huiusmodi temperaturam habent. Argenti spumæ & cerussæ pro cõsuetudine singulorum pondo: coquatur cum olei libris duabus, frequenter etiam aquæ selibra addita. Liquefcit enim argenti spuma citius, tum coctio aquam consumit, ut nihil ad humiditatẽ phar-  
 maco aperte prosit: resinæ pondo tres uncia, ceræ duplũ sufficit. Quanquã si duas resinæ indideritis interim, quatuor ceræ, sic quoq; compositiones non adeò differre inuenientur: thuris pondo uncia semis satisfacit post cerã & resinã: deinde tres aliorũ iniectæ, quæ drachmæ quatuor sunt ad uiginti: impones autem duorum, trium, plurium, ac omniũ quæ numeravi: quorum singulorum tibi copia contingat, ut si omnia habeas, æquani portionẽ cuiusq; inicies, cadmiæ dico & pompholygis, buccinorũ ciueris, uel ostreorum, & æris squamæ, singulorum denarij septẽ erunt, qui tres uncias absoluunt. Quòd si calcem lotam misceas, singulorum drachmæ quinque ponentur. Si ustæ chalcitidis, singulorũ drachinæ quatuor, ut ex omnibus sex cõnitis tres uncia fiant. Verũ chalcitis usta sit, elota, & colore cinereo, non qualem multi ex ijs, qui urũt eam, faciũt: ueluti si dicas ex pallido flauã: si duo quædã ex his habeas solum, tres uncias ex ambobus ponito: hoc est utriusq; unã semissẽ. Hæc in præsentia ad alborũ emplastrorũ constitutionẽ ulceribus dyssepulotis curãdis cognoscere uobis sufficit. Atqui cerata albã et li-  
 πάγουρα. quida, πάγουρα uocãt, etiã ex ijs ipsis præparãtur: diffẽ-  
 runt*

runt tamen ab emplastris, quòd neq; argenti spuma, nec cerussa coquatur. Adeps uerò uel anserinus, uel gallinæ, uel suillus, uel uitulinus indatur. Quòd si unum interim habeas, uel acetum, quæ albißima, lucidißimaq; sint, aquæ loco ipsa admiscebis.

## E secundo libro Galeni

### DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

### KATA GENH.

#### *De colorum in Emplastris uarietate.*



EDICAMENTA colore similia tradere non est artificum.

Quoniam uerò potentes quidam uiri interdum nos iubēt emplastrum sibi melinum cōficere, quod ulcera glutinet, uel cicatricem ducat, uel indurata emolliat, uel aliud huiusmodi facere possit, coacti sunt nonnulli recentiorum medicorum, ubi similia colore seriatim conscriberent, proprias cuiq; appellationes apponere.

De medicis imperitis, & vlcus cauum curandi ratione.

Quòd si affectus cuiuslibet eorum, quos curandos suscipiunt, naturam scirent, methodumq; cognoscerent,

scerent, qua & simplicium singulorum medicaminū ui-  
 res, & scopum curationis inuenirent, non utique compo-  
 sitionis modum desiderarent. Exempli gratia: statim ca-  
 uum ulcus, apertum (nihil enim mali est, ut quidam uo-  
 cant breuioris disciplinæ gratia, sic nos quoque non una-  
 re) quomodo quis sanare queat consideremus: tanquam si  
 nondum aliquod ei curando aptum medicamen inuentum  
 sit. Nam quum docuerimus, à ratione cauorum ulcerum  
 curationem subministrari, nascente alia carne loco per-  
 ditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, cogitauimus fieri  
 non posse hoc, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas  
 insit. Verum sordes medicamina detergentia auferunt,  
 humorem exicca-ia discutiunt. Quoniam ulcera car-  
 ne implenda pharmaco exiccante, & detergente medio-  
 criter sine morso, indigere demonstrauimus, conuenit e-  
 iusmodi pharmacorum materiam quenam sit in memo-  
 riam reducere. Indicata est in libro de simplicium me-  
 dicamentorum facultatibus, insuper conueniens singulo-  
 rum ordo: Hoc etenim, sicut dixi, admodum utile est, ut  
 si quando fortiore quis pharmaco opus habeat, ad quod  
 digrediatur cognoscat. Verum cum simplex nullum ha-  
 bemus, composito utimur. Atque primum fingamus nos  
 habere ceram & æruginem, aliud nihil quod cauo ulceri  
 manifestè conducat: thus dico, irim, aristolochiam, fari-  
 nam eruorum, radicem panacis, & quæcunque ex hoc  
 sunt genere. Quum igitur sciamus, quòd cera sola im-  
 posita sordidum ulcus efficiat, quia neque detergere, ne-  
 que exicare possit, ærugo rosionem infret: præterea  
 exedet, atque phlegmonem excitabit: quæ sanè utraque  
 deuita

deutabimus: medium ex ambobus aliquot conficiemus, imbecillius quidem æruginē, ualentius autem cera. Sed quoniā hæc paululo inferior est eo quod commodè queat adijci, ærugo autem multum præcellit, multæ ceræ modicam æruginem admiscebimus. Quantam autem quantæ? Hoc enim deinceps uenit dicendum, exactè quantitatem cuiusq; ante experientiam inuenire posse neminem: coniungere tamen & iudicare, & componere pharmacum, primum adeò nullum insigniter improspere successum habiturum: quemadmodum ego aliquando feci in quodā uico, ubi neque ipse quod me sequeretur habebam, neque alius ex ijs qui ibidem agebant, copiam mihi facere poterat. Reperi solum ad compositionē idoneam æruginē & ceram: quibus acceptis, & ad ignem cera liquefacta cum oleo rhodino, ut liquidum ceratum fieret, nuscui cerati libræ unciam unam æruginis, hoc est duodecimam partem: statui enim decimam uel duodecimam temperare: suspicatus quidem maiorem, ut acriorem cera futuram, minorem tanquam imbecilliolem. Experiuntibus autem nobis compositionem, uisæ sunt partes decima & duodecima rectè pro corporum differentia commutæ. Ostendimus enim, quod etiam usus attestatur, ualida corpora ualidiora sustinere medicamina, imbecilliora huiusmodi non ferre. Validiora dico corpora, quæ temperamento sicciora sunt, ueluti agricolarum, nautarum, & uenatorum: imbecilliora, molliora, uel natura, uel uictus consuetudine, cuiusmodi sunt mulierum, eunuchorum, puerorum, & qui naturali temperamento sunt humidi, candido molliq; corpore præditi. Dura igitur ex co-  
pio

piofiore æruginè cerato admixta carnem recipiunt, mōlia ex pauciore. Vnde, ut frequenter dictū est, unū pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest, sed oportet medium esse, ceu ad mediam temperaturam aptatum: ducere uerò ad utranq; eius medijs partem, dum quotidiana usu, & experientia probatur: si ut res postulat confectum sit, in eo manere cōsiliū est: si paulum deficiat, augere ipsius uires: quemadmodum etiam adimere, cum præter modum efficax sit, uelut in ipso hoc proposito pharmaco, quod cerato & æruginè constat, considerare prius oportet, ulcūsne carne obductum sit, an nondum, sed sordibus humoreq; madeat, uel præter quòd carne impletum non est, erosione sensus aliquis laboranti oratus sit, & calidior, uel rubicunda magis pars ulcerata apparuerit. Quòd si igitur imbecillius uideatur, melle uel æruginè admixtis potentiam eius augebis: si ualidius, oleum uel rhodinon miscebis, resoluens pharmacū, quod linamentis excipiendum est. Commodè quidem ceratum & ærugo sic temperantur, quemadmodum à me nonnumquam esse mixta retuli. Confectura autem medicantibus hæc esto emplastri compositi (uiride à colore uocant) sanantis quidem recentia uulnera, quæcunq; non adeò magna sunt, sed quod ex rhodino simul ad mediocris pharmaci consistentiam potest liquefieri. Quin & resinæ uel colophonix, & pīryctæ nominatæ, uel terebinthinæ nonnihil ipsum habere oportebit. Ostendimus autem laricem uocatam terebinthinæ quodammodo esse similem. Porro quantitas earum mixturæ & hic coniecturari potest: si enim plus resinæ quàm ex usu sit admisceamus, donec



donec manibus subigitur molle apparet: in linteolum uerò illitum paulò post instar pellis indurefcit, facile à corpore decidens: Sin minus æquali portione resinæ cum cera mixtum fit, non habebit hoc quod glutinet, ἰχόκολλος Græcis appellatur, ut pars ulcerata magis extendatur. Liqueat autem, si alicui particulæ imposueris, difficulter fore conglutinans, & protinus ab ipsa relabi. Quæ igitur mediocris temperatura, ceu emplastri consistentiæ conueniens? Siquidem mihi fidem adhibes, par utriusque portio: nec cera, nec resina siccitatē uetustatemq; repræsentet. Optimum siquidem huiusmodi mixtionis temperamentum est, si ambo pingua & mollia assumantur: si alterum excedat, resinam præpollere satius est: quare nõnulli duplam huius mensuram stactæ ceræ admiscunt.

Confectura simplicis emplastri viridis,  
& virtutis ipsius explicatio.

**V**iride nonnulli, sic enim ipsi nominant, ex dupla resinæ portione confecerunt: duas quidem eiusdem libras, unam uerò ceræ, & binos olei cyathos immiscetes. Aeruginis autem alij duas, alij tres uncias huiusmodi ceræ & resinæ mixtionem immittunt. Sed etiam in præparatione liquefactis, quæ liquari possunt æruginem inspergunt. Quidam ubi refrigerauerint, mox raserint, in mortario temperaturam moliuntur. Porro qui medicamentum cruentorum ulcerum glutinantius facere statuunt, æruginem in pila prius cum aceto leuigatā injciunt, ceratū radentes. Proinde si quis uestrum roget, quale horum uiridum emplastrorum sit præstantissimum, succurrat id quod  
iden

identidem à me prædicatur, omnia esse optima ei, qui affectus quibus singula offeruntur cognoscat : sicut eos ignoranti omnia pessima. Mei etenim officij est dicere, id exiccare euidentius, quod acetum pariter assumit. Constat autem, quod plus æruginis continet, id tum ualidum esse, tum magis exiccans, tum sordida ulcera rectius purgare. Finis ipsius est, ut hæc citra erosionem ac morsum efficiat. Nam adeò ualens, ut iam puris ulceribus impositum erosionem pariat, nec ea tandem carne repleat, sed utroq; modo humida sordidaq; reddat, simile est ijs quæ parum integrè siccant detergentq;. Iam uerò ex acrioribus cauum magis ulcus euadit, & rubicundius calidiusq; est, quum æger etiam ipse morsum eius percipit.

#### Refinarum differentia.

**R**esina strobilina resinarum longe calidissima est: sicut terebinthina ambabus qualitatibus omnium moderatissima. Omnes siquidem calefaciunt & exiccant: sed hæc magis, illæ minus. Validissima igitur est strobilina, moderatissima, ut dixi, terebinthina. Quinetiam siccatur celerrimè strobilina, & quæ priuatim pitynon physesma dicitur : resina quidem & genere ipsa siccans, & calefaciens : siccando autem à strobilina non superatur: calefaciendo plurimum. Hæ ergo exiccate pinguis expertes sunt, ideoq; emplastra bene adherentia conficere non habent, ut uiscosæ & liquidæ. Inter pitynon physesma, id est, piceam & strobilinam media calore abietina est : liquida tamen diutius perdurat : sicut etiã colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia,

nia, odoratu suauitatem quandam referens, calore sicut abietina mediocri prædita, nascitur admodum modica, atque ob id preciosa est. Humidissima tamen omnium est altera laricis appellata differentia: nam hæc quoque duplex est: una quidem similis terebinthinæ: altera hac acrior, calidior, magis liquida, & odoratu grauior, tum gustu amarior. Conditur hæc liquida resina uasis fictilibus, piceam resinan continentibus, consistentia & colore terebinthinæ admodum similis: odore & gustu diuersa: ingrator quidē olfactu, sicut etiam acrior & gustu mordacior. Quare satis est, terebinthinam omnibus medicamentis, quæ ulcera recte curabunt, admiscere: quoniā primus præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offertur non mordeat.

De frictione metallorum cum  
aceto ad solem.

**M**eminisse uos puto & huius quod toties repeto: fortium medicamentorum, cuiusmodi est ærugo, misy, chalcitis, fori, æris squama, uel chalcanthum, ex aceto diu contritorum, morsus, seu erosionem obtundi, uires augeri. Quoniam uerò metallica ceu crassiorum natura partium potestatem suam in altum usque corporis, quod curatur, non extendunt, ideo ut tenuiora fiant conterere, & ex aceto ipsa dissoluere conuenit, quæ curiosè ita attenuata ad penitiora usque penetrant. Accedit autē & aliud quoddam cōmodum in huiusmodi medicamentorum confecturis, quod diligenter elaborata corporis meatus nusquam inter eundū retenta pertransseunt, eiusq; gratia si calidioris naturæ sint, sine morsu munere suo

funguntur. Quin & inter humores ipsos in corpore generatos, tenues facile citra erosionem per spirant: crassiores retenti obstructiq; molestant, ubi mordaces fuerint. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis commercio nonnihil mordax, seu erodens perferuant, quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Quibus autem simile quippiam uestioni ex frictione cum aceto ad solem facta ignis loco accidit, ea ne quidem ex igne calorem consequuntur: laeuigata tamen ex aceto & combusta multo præstantiora fiunt. Hæc sanè multorum medicamentorum communia necessario cognoscenda sunt: tum usus ipsorum similiter: alius quidem in alijs affectibus: in cauis uerò ulceribus quum linamentis excepta imponuntur.

#### Olei differentia.

**O**lei sanè nomen unum est, qualitas & facultas diuersa: Nam omphacinum frigidius, ex maturis oleis pressum calidius est: temporis autem processu calefaciendi uim auget: sic etiam quod salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius est, magisq; siccatur, quàm quod ipsius expers est. Quod surculos oleæ, ῥάδιους Græci nominant, continet, ualentius astringit. Indicabit autem utilius & ulceris forma, & corporis ægri natura: ulceris quidem sanandi contrarijs, corporis autem ulcerati similibus. Quapropter medicamentum, quod emmoton futurum est, myrteo liquefacies: quum generata caro flaccidior quàm par est appareat, præsertim ulcere ad cicatricem perueniente propemodum. Nam cum paucillum quiddam phlegmones in ambientibus particulis relinq

relinquitur, optimum est pharmacum ex rosaceo liquore. Rosaceum uerò præstantissimum esse nouisti, quod solis rosis pluribus oleo citra salem præparato plenius imbutis confectum est.

De usu viridium emplastrorum.

**Q**uatenus medicamentum exiccet detergatq; cum ex simplicium facultate, quæ id constituunt, inuenimus, inde simul dispositionis naturam cui conueniet indipiscemur. Vbi enim humiditas multa & copiosa fordes est, desiccans euidenter purgansq; medicamentum applicare oportet. Vbi apertum (Græci ἀπέριστατον uocant) ulcus est, carnis indigum, moderatissimum inter exiccantia detergentiaq; competit. Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab ægri natura sumere conducit: Siquidem durioribus uel ex temperamēto naturali, uel ætate, uel loco, uel studijs corporibus magis exiccantia exhibenda sunt, humidioribus minus. Quapropter primus cuiusque medicaminis linteolis excepti (ἡμωτον appellatur) usus ex prædictis nuper scopis coniecturali artificio sumitur: secundus, ut etiam antea monuimus, ex signis in corpore curando apparentibus. Si nanque cauum ulcus citra phlegmonem & purum inueniatur, nihil nouum tentare oportet, si humidius, uel sordidius intendere desiccans detergensq; pharmacum ratio postulat, si cauum magis quàm prius existit soluere. Intenditur itaque mellis temperatura: mitigatur ex oleo & cerato, uel oleoso quodam, cuiusmodi est rosaceum, myrteum & cyprinum, simpliciter præparata sine spissamentis, σύμματα Græci uocant, quæ addunt odoris gratia, uel ut confecta diu-

tius ab iniurijs immunia permaneant. Iam uerò si contentiosus quispiam nos increpet, tanquam præter institutum initio ad medicamentorum usus orationem deducamus, polliciti nos de eorum compositione uerba facturos, ille considerato, quòd in usu etiam confectura quædam sit, silentium sibi imponat. Prima enim pharmacorum, quæ cerato miscentur, in eo confectio est: altera rosaceo, uel myrteo, uel cyprino, uel lentiscino oleo, uel melle appposito constat. Atque de his satis.

De viridum emplastrorum commixtione,  
eorumque quibus constant  
proportione.

VERùm ad emplastra, quæ iam per experientiam abundè probata sunt transeamus. Hæc igitur Andromachus memoratu digna medicamenta usurpare ipsa scientibus præscripsit. Vnde cùm talia sint, ea deligenda ueniunt, quæ paucioribus, paratuq; facillimis simplicibus componuntur, tum quæ ad plura ualent, & proposito maxime scopo seruiunt. Res fiet exemplo ita dilucidior. Finge cauum ulcus apertum in sano corpore: tale uerò ab emplastro uiridi, quod Lite uocatur, liquefacto ex rosaceo curabitur. Appellant autem Liten, quod ex æruginè, cera, & resina cõficitur. Ego sanè, ut ostendi, æquam utriusque portionem misceo, æruginis decimam uel duodecimam, uel octauam. Est uidelicet duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantundè, æruginis uncias duas temperemus: decima, si duabus æruginis uncijis, uiginti ambarũ resinæ & ceræ, hoc est, utriusq; decem adijciantur.

tur. Quinetiam si octauam æruginis partem cerato ex cera & resina confecto apponamus, etiam sic bene habebit. Acrius enim magisq; detergens huiusmodi medicamentum erit, non tamen inutile: nam duris corporibus percommode adhibebitur. Melior euadet compositio, ubi octauam portionem æruginis confecturæ ex cera resinaq; immiscuerimus, ærugine pariter aceto quamacerimo diebus plusculis antè in leuorem redacta. Præstantior erit, si etiam thuris partem dimidio maiorem, quam fuit in ærugine, indiderimus. Olei pares cyathos æruginis uncijs adiunges, cū sine aceto & thure medicamē cōficias. Quando autem thus acetumq; adijcis, si quidē frigida resina pinguior molliorq; sit, ac æstate pharmacum præparas, miscebis nihil: si uerò dura, idq; per hyemē, cyathum unum infundes. Quod si liquidam quandam resinam ceræ temperes, oleo prorsus carere licet: liquidissimæ quidem tertiam ceræ portionem, nūnus liquidæ dimidiam. Porro fiet huiusmodi quædam compositio: Ceram resinaq; liquidā ubi refrigeraueris, æruginis parti nunc octauæ, nunc decimæ, aliàs duodecimæ commisce to: cognoscens duris corporibus primam temperaturam conuenire, mollibus tertiam, medijs mediam. Aeruginem ex aceto læuigabis: si lenius medicamentū uoles efficere, thuris pondus dimidium eius quod continet adiunges: sin hoc nutius, thus & æruginem æquali modo committes. Atquire sinam cum cera liquefactam sine rasura refrigerantes, ærugini thuriq; in pila ex aceto tritis supersundimus. Hæ igitur primæ compositiones sunt uiridis emplastri, quod cruenta quædam uulnera non adeò magna

glutinat, & reliqua adusque cicatricem sanare potest, & carnem in eis producere, ex humido quodam oleoso liquatum. Voco autem oleosa, rosaceum, quo maximè ad illum quem retuli modum confecto utendum est: statim myrteo, cyprino, & lentiscino. Sed ipsum oleũ, ubi medicamento liquefcenti caloris quippiã adijcere cordi est, commune hoc miscebis, in quibus refrigerare studes, id quod omotribes appellatur: ubi astringere, myrteum: ubi mixtæ facultatis aliquod, concoquens puta & repellens, rosaceum: in quibus modicam astringendi uim cum maiore caliditate desideras, cyprinum & lentiscinum. Porro pleræque aliæ compositiones erunt, dum medicamentis simplicibus iam cõmemoratis uel incarnatiã, uel emollientia, uel astringentia, uel quæ difficilia ulcera curant, temperantur. Nonnulli uerò digerentia miscuerunt, sicut etiam cicatricem ducentia: alijs quidem omnia cõmuscantibus, uel confecturam inutilem, uel medicamentum uarijs accommodum præparare contigit: quorum materias cognoscentes, tum inuentis iam uti, tum similia componere ipsi potueritis.

Quomodo viridia fiant.

**A** Erugo non modica immittitur, ut & aliorum colorem uincat, & omnia in suum permutet. Porro conijcere oportet eum qui tale emplastrum confecerit, præter æruginis quantitatem, & colorem illorum quæ ipsi commiscuntur, ad hæc coctionis rationem, in simplicibus quidem colores pertinaces obseruare: cuiusmodi flaua & nigra, & rufa medicamenta occupant. Dico autem flaua & rufa, qualia sunt melitites, chalcis combusta,



sta, auripigmentum, sandaraca. Nigra uerò, quod genus sunt pix, bitumen, terra ampelitis, lapis gagates. At inter coquendum non oportet æruginem super ignem coeuntibus committere: uerùm ubi in mortario unitas facta est admiscere, si colore uiride medicamentum permanere desideras: sin autem melinum uoles emplastrum cōficere, intelligito in coctione æruginem primum in hunc colorem perducendam, postea in rufum, ut emplastrum, quod bicolor, Græcè διχρωμον appellāt, euadat. Etenim à coctionis tempore paucis diebus post, in summo quidē fuscū magis redditur, in imo rufum simul apparet. Quoniam uerò de ipsorum colore abunde satis diximus, rursus ad facultatis sermonem reuertemur, memores unde primum hoc in libro exordiū sumpserimus. Eginus autem in eo, nisi me fallat memoria, de medicamentis carum generantibus: quorum potestatis scopus est, ut mediocriter & sine morsu detergāt exiccentq; . At speciales confecturæ pro diuersa simplicium pharmacorū materiæ differunt. Cæterum nemo ignorat, ea quæ propriè & primariò σαρκωτικὰ nominantur, aperta ulcera carne implere, hoc est, quæ caua quidē sunt, non tamen sordes, aut inflammationem coniunctam habent: iusuper nec prauorum humorum influxionem, neq; carnem in cauo ulcere intemperatam. Nam prædictorum aliquo cavitati imposito prius illud curandum est. Consilia curationis ipsorum sunt, sordidis detergentia pharmaca adhibere, profluentibus exiccantia, atque id quod influit repellentia. At si copiosum & contumax existat, fluoris causa prius amputanda est. Constat autē inflāmati phlegmonē

sanandam esse, carnem intemperatam ad temperiem reducendam. Porro intemperatæ iam factæ, quatuor sanè modis simplicibus, quatuor item compositis, per contrarias qualitates succurritur. Sed de his postea: nunc autem de medicamentis uehementer detergentibus agemus.

De pharmacis valde abstergentibus.

**Q**UOD hæc ex prædictorū genere sunt, quæ ob moderatam deterfionem cauis ulceribus puris, apertis sine omni morsu admoueantur, antea comprehendimus. Intensam uerò detergendi uirtutem obtinent, quæ copiosas sordes auferunt. Quare nonnulla ex prædictis uiridibus medicamentis una re solū, nempe æruginis copia, ab ijs quæ simpliciter carnem producant, euariant. Quædam & aliorum insigniter detergentium mistura, sicuti uocatum Isis, & Machæionis emplastrum, quod nos pro more usurpamus: oleosum ex usu nuncupant. Vbi enim sinū implere proponimus, copiosiore oleo iam liquefaciētes, per cornu rectum modo clysteris porcine uesicæ cōiuncti ipsum infundimus. Quin & piulcis, hoc est, pus trahentibus, in eo utimur. Etenim inter clysteres etiam, quibus latius foramen est, ad huiusmodi administrationem commodi sunt. Cui uerò non est perspicuum, sinus oppletos sordibus, ex meraciore hoc medicamento purgari, id est, oleo pauciore adhibito? rursus puriores effici ex humēte magis olei uberioris tēperatura? Itaq; si parua adhuc phlegmones sinū infestatis suspicio quædā existat, medicamētū ex rosaceo prorsus liquefiat: Sin à phlegmone fuerit liber, ex oleo: et si citra erosionē ueteris

ueteris mīsturam sustinuerit, illo pharmacum liquatur. Cæterum in huiusmodi usum non solū hoc, sed Machæ-  
 rionis quoque emplastrum & Isis, tum alia faciunt, quæ  
 maiores nostri perscripsere, cerato mixta, cauis ulceri-  
 bus carnem inducere. Omnia nanq; huius notæ sine ce-  
 rati mīstura ex oleo & rosaceo liquefacta sinibus immit-  
 tuntur, eò quòd consistentia, quæ linamento excipitur,  
 emmoton uocant, sinibus illini non potest. Pari modo &  
 medicamentum siccum, quod combusta charta constat,  
 rosaceo copiosiore diluentes, ipsis infundimus. Quemad-  
 modum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent,  
 dum crassiora imponi nequeunt, ita quæ in summo caua  
 ulcera affligunt crassius medicamentum desiderant, hac  
 uidelicet occasione, quòd liquida statim ab eis decidunt,  
 & linamēta sicca relinquuntur. Merito igitur in id ge-  
 nus uitij ceratum ualide abstergentibus admiscemus: in  
 sinibus oleum, uel rosacei plurimum. Atqui hæc in eum  
 modum abstergentia pharmaca omnino etiam digerunt,  
 ideoq; uehemēter exiccant, ac commune quoddam ipso-  
 rum genus efficitur, quod Græci πολύχρηστον appellant.  
 Accedunt huic generi emplastra euidenter acria, qualia  
 sunt Λι ἀλώμ, quæ non offerenda sunt, ubi carnē quam-  
 piā progignere cogitamus. Nam præter alia hoc quo-  
 que sal eximium habet, ut astringat magis quàm purget:  
 siccare uerò nihilominus quàm nitrum, ac eius spuma po-  
 test. Sed illa astringendi facultatem non agnoscunt, sicut  
 nec Asiæ petræ flos. Atque huius rei gratia discutere,  
 & ceratis admixta ulcerum sordes tollere nata sunt: Sal  
 propter astringendi potestatem hoc efficere non potest.

Proinde cum hæc in memoria habeatis, & methodum compositionis, ususq; omniū eiusmodi medicamentorum audiueritis, deinceps illa, quæ à clarissimis medicis propter optimorum medicaminū cognitionem usu atque experientis cōperta sunt, enumerabo. Primum sanè Mantie, atque eius discipuli Taranthini Heraclidis sectatorū permulta pharmaca, quæ subsequentibus annis per experientiam probantes distinxerunt, & præstantissima ipsorum denuò literis mandarunt: quæ uerò munus efficacie habere uidebantur onuserunt. Iure igitur & ego maiorem facio mentionem eorum qui illis successerunt. Sunt autem inter hos, qui in medicaminū experientia rectissimè se gessisse uidentur, Petronius Musa, Heras, Andromachus, Asclepiades, & Criton. Iam uerò Archigenis & Philippi studiosi non pauca medicamenta prodidere. Quinetiā liber unus est Menecratis, cui nomē inditum est, Insigniū pharmacorū αὐτοκράτωρ ἐλογράμματοϛ, id est quasi dicas, Imperator (nam ei dicatus est) integris literis descriptis. Quæ ergo pulcherrima ipsis tradita sunt medicamina, & cōmendantur, quorumq; nos inter omnia relata experientiā habemus, & quibus præceptores nostri usi sunt: ad hæc, si quod nobis inuentū sit, deinceps adducā, quo singula genere cōtineantur exponens. Nunc autē uiridibus relatis melina protinus subiungam.

#### Melina emplastrā.

**Q**uemadmodum uiridium emplastrorum plurima propter æruginem præpollentem talia fiunt, præsertim quæ sunt ex ipsis coloratiora, ita quoque melina. Sed uiridia æruginem incoctam habent, melina uerò coctam,

Etiam, sed mediocriter : Nam si largius coquas, ambigu coloris emplastra quibusdam appellata, quibusdā rufa, efficies. Solent medici uiridia simpliciter melina, & rufa nominare, quæ non adeò magna uulnera glutinant, & ulceribus cicatricem obducunt : quæ mos est medicis appellare ἀνδισατα, quasi dicas aperta. Item ex rosaceo liquefacta cauis carnem gignunt. Multiplicis usus sunt inter ea, quæ plura pollicentur. Quædam multa non promittunt, sed unum mentione dignum, uidelicet uel ulcera ca-coëthe bene curare, uel pus digerere, uel meliceridas, uel duritias emollire, uel huiusmodi quid non continendum, aut curatu facile. Andromachus itaque quatuordecim melina conscripsit: ex quorum numero quinque æruginem habent, reliqua sine hac confecta sunt. Porro ex his quæ æruginem constant, unum quidem primum inter quatuordecim positum est : alterum uero quartum, post hoc aliud sextum, inde septimum & decimum. Quibus ergo nihil eximij apposuit, omnia simul & conglutinant ulcera, & cicatricem inducunt. Quod si ex rosaceo liquefeceris, carnem procreant. Quin & mediocribus phlegmonis medetur, sicut etiā duritias emolliunt : atque hoc euidentius, quæ gutta ammoniaci continet. His adhuc magis, quæ copiosior rem quæ pro reliquorum portione aestimetur, eā assumpservit: in quibusdā uero apposuit ipse tenerum, hoc est, teneræ cuti cōueniens: cui præfixit ἀντιστικόν, & ὑπὸ τικόν, innuit membrorum doloribus synanchæ & lateri benefacere, uel interiores abscessus discutere magis quoddam testimonium his adferens, quàm simplici sermone scriptis. Igitur omnia ipsa deinceps subiiciam:

Melina di-  
uersa pro-  
mittunt.

Argenti

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram, postquam deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atque molliter incoquito. Huiusmodi coquendi modos melinorum emplastrorum me priores tradidere, iuxta quorum similitudinem etiam alia melina coquere potueritis.

In Melino Serapionis, Argenti spumam sanè primum iniicere conuenit, mox resinas & ammoniacum, deinde galbanum & æruginem, postea si uel thus, uel myrrhā, uel aloē capiat: hæc immittenda sunt, cum medicamentum ab igne tollitur: quippe coctionem non ferentia. Prædiximus autem, lentè coquenda esse, præsertim cum ærugo indita fuerit: quin & ipsam miscendam, dum cacabum in terram deponis, ac modicè refrigerabis, idq; magis, si uas paruum sit in quo coquitur: Nam effervescenti immixta ærugo, frequenter ex ipso uase diffundi medicamentum cogit. Porro in Menœti primo melino, πικτικόν uocat, ideo quòd pugiles eo utantur, ammoniacum ex aceto læue in mortario fieri posse, alijs omnibus in cacabo mixtis, deinde ipso affuso, prius instituti sumus.

In Melinis emplastris dixi neque æruginem crudam esse oportere, ut in uiridibus, neque nimis coctam, sicut in his quæ incerti coloris & rufa nominantur. Verùm ubi iam cacabus ab igne auferendus propemodum est, iniici ærugo debet. Deinde cum mutet colorem, & melinum redditur, medicamentum tollere iam ab igne temperius est, quatenus purum iam euaserit. Sin minus, paululum super ignem lentum remorati sic tollemus. Nam in  
uehe-

vehementi admodum flamma facile in rufum degenerat.

De rufis emplastris quæ *λίχνομα*, id est,  
incerti coloris dicuntur.

**Q**Uædam ex eadem materia prodeunt qua melina,  
sicut prius quoque diximus, hoc solo discrimine,  
quod diutius coquantur: Omnia siquidem propter cru-  
dam æruginem uiridia fiunt melina, ubi mediocriter ipsa  
cocta fuerit: rufa, ubi liberalius. Manifestum igitur, me-  
lina rufa; oleum copiosius quàm uiridia necessariò ha-  
bere: etsi reliqua omnia eadem recipiant. Atque huius  
gratia primum spuma argenti cacabo injicienda est, in  
quo tantisper coquetur, dum sordium crassitudinem con-  
sequatur: mox ærugo. deinde si metallicum aliquod, ceu  
æs combustum, eiusq; squama immittatur: ac quando  
spissitudinem acceperint, tunc ceram & resinam (si hæc  
etiam medicamentum recipiat) indere conueniet: postre-  
mo thus, myrrham, aloën, aliq; id genus. sicut celebra-  
rum rufum, quod *ἱεὶς διατάμου* uocatur, sacrum & *ἱεὶς διατάμου*  
ipsum appellatum: uelut Isis, quoniam aiunt ea ex sacris  
Ægypti locis adferri: polychreston igitur hoc est,  
quod interpreteris licet, usus multiplicis, eoq; in sequen-  
ti sermone inter ea quæ sic nominantur adnumerabitur.  
Impræsentiarum de alijs rufis omnino simplicibus, quæ  
inter hæc & polychresta consistunt, uerba facturi su-  
mus. Ut igitur uiridia emplastra ex cera, resina, oleo,  
& ærugine conficiebantur, iuxta dictam illic tempera-  
turâ, sic rufa ex argenti spuma, & oleo copiosiore quàm  
in uiridibus sumpto componuntur. Itaq; si emplastrum  
lar

largius uoles coquere, augeasq; oleũ, medicamen habitu rus es quod magis siccet, ideoq; uulnerũ cruentorũ glutinãtius: sin autẽ mediocriter, tantũ olei mēsuram, quantũ argēti spumæ pōdus esse sufficit: libram enim olei mensuralẽ Romanorũ in argēti spumæ librā ponderalẽ iniicie mus. Iã si pharmacũ plenius incoquere placet, nō unā libram s, sed etiam duas & plures temperabimus. Porro inter hæc rufa emplastra sic præparata, plus siccant quæ nec resinam, nec ceram omnino habent, sed ex solis, ut uocāt, metallicis conficiuntur: quemadmodum alij quorūque nonnulli ex prioribus huiusmodi scripserunt.

Rufum Galeni.

Cæterũ quo ego semper mea industria cōposito utor in hunc modũ coquitur: Argēti spumæ cū oleo prius coctæ metallica ex aceto læuigata immitto, & sic coquo, donec purũ fiat. Addo his olei libras quatuor. hoc autẽ quanto uetustius, tãto erit melius: magisq; si id fuerit Sabinũ. argenteæ spumæ libras tres, aceti quãmacerrimĩ libras duas. Horũ triũ metallicorũ, squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis uncias duas, hoc est, denariũ pōdo sedecim. At quum uetus oleũ existit, crassumq; ex uetustate, quatuor libras s immittito. nos quinq; interim, idq; per hyemẽ indidimus, non ignari, hyeme plus olei quàm per æstatẽ immiscendũ. At argenti spumã prius uidelicet coques, donec sordiũ crassitudinẽ recipiat. Quòd si oleũ cicinũ habeas, id pro uetere usurpato, certe medicamentũ hoc cruẽta uulnera faciliẽ glutinat, magisq; in duris corporibus q̃ mollibus, cuiusmodi sunt mulierum & eunuchorũ, dilutũ potius ex oleo cicino quàm ueteri. Itẽ quũ  
linleo



linleo exceptum imponitur, mirū est quā ulcerā curatu difficillima cōcoquat, quæ pus nequaquā reddūt. Ad hæc sinus cōglutinat, & fistulas implet, exiccat, & prorsus claudit. Vbi iam ipsum hæc pulchrè uelis efficere, metallica pluribus diebus aceto lōgè acerrimo conterito, ac potius in sole: pari modo argenti spumā tritam exiccantq; & oleo postea mixtā, eo quo dixi modo incoquito. Attamen ad ulcera, quibus cicatrix difficulter induci potest, metallica sic elaborari, & argēti spumā cōterere nō est neceßum. Etenim sine his *ἡ πούλωσις τῆς πορῆς*, quasi dicas, cicatrici ducēdæ prōptius illud euadit. Adijciatur autē tunc ei diphrygis & chrysocolle singulorū uncia. at hæc nō simul cū squama & ærugine cōmittuntur, uti nec ubi iā coctū medicamentū fuerit omnino, sed eo quod intercedit tēpore. Tantā enim huiusmodi pharmaca coctio nē requirūt, ut exactè cum prioribus in unū coeāt: quod mediocri interuallo accidit, neq; multo antè, nec paulò minus q̄ cacabus ab igne tollatur. Solum itaq; hoc emplastrū fistulas, sinus, & magna uulnera glutinare potest. Iuuat ipsum spōgia recēs, nō dura, ueteri uino respersa. Deligatura in sinib. ab imo fiat, ligamēto ad orificiū perueniente, sicut in sermone de fistulis clarius ostendetur.

De iis quæ cicatricem obducunt.

**E**Mplastrā cicatricē inducentia, siue synulotica, siue epulotica nominare uelis, sicut etiā alia medicamēta epipasta, & quæ linamentorum usu apponuntur, nihil ad curationes eorū differētiae adferet, si qualis quodq; facultatis medicamētū esse debet memineras: quam simul cū reliquis omnibus in Therap. lib. explicauimus. Quanto enim

enim glutinantia sarcoticis siccare magis dicta sunt, tanto glutinantibus epulotica. Nam ipsorum beneficio carnem cauis ulceribus generatam, cutem reddere statui-  
mus: ob quod tale pharmacorum genus, siue ὀνίχιδιον, siue ὀνίσκιδιον sit, astringere oportet. Hic autem illorum duntaxat emplastrorum mentionem facere cogitamus: siquidem ea quæ linamentis excepta imponuntur phar-  
maca, ex his rosaceo uel myrteo liquatis fiunt. Atque myrteum rosaceo hoc magis conducit, quo uehementius astringit: at si neutrum habeas, ex cyprino, lentiscino, & melino liquanda sunt: si his quoque careas, ex om-  
phacino, uel eo quod ab Hispania portatur, πικρὸν Græci nominant: ubi nec huius copia adsit, teneros oliuarum surculos contusos, alij cuiusdam uulgari oleo admiscebis: quod si hos etiam desideres, præstat oleo uetere liquefa-  
cere: hinc enim medicamentum siccandi uirtute auge-  
bis. Proinde pleriq; medicorum à pharmacis, quæ opti-  
mi quiq; auctores longi temporis experientia satis pro-  
barunt, eoq; nobiliareddiderunt, hac ratione solum ab-  
stinent, ut ipsi melius quippiam præter maiores habere uiderentur. Attamen ex medicamentis celebribus cogno-  
scenda sunt quæ commendantur omnibus, nempe quod ὀλὴ καὶ μέλις, & ὀλὴ καὶ ἄνθος inscribitur, ad cicatricem du-  
cendam utrunque præstantissimum. Quanquam apud omnes mixturæ simplicium temperaturam eandem non sit inuenire.

De catagmaticis & cephalicis emplastris.

**Q**ui plurima ac optima pharmaca prodiderunt (antea omnes nominatim citauiamus) genus aliquod em-  
plastro

plastrorum cephalicum & catagmaticum uocant, à caluariae fracturis potissimum nomen eis imponentes. Sunt autem talia astringendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Plerique paululum ex astringentibus pharmacis eis admiscuerunt, idq; duplicis usus gratia, sicut diximus: nempe ut id quod affectus partibus influit repelleretur, & abstergentium facultas in altum usque penetraret: docuimus nos antea, nisi astringentia frictione in puluerem redigantur, noxam magis quam præsidium allatura ipsis, qui trahendi uim occupant. At optimè elaborari ostendimus, si ex aceto acri læuia fiant.

De emplastris quæ propriè Cephalica nominantur.

**C**apitis fracturarum, quæ ad laminam usque peruenere, emplastra cephalica dici consueverunt. Eorum uirtus est, ut ossium squamas regenerent, nutrimenta in caluaria, & alijs corporis ossibus reducant. Nonnulli comuni genere hæc etiam uocant catagmatica, quibus propriè nuncupatis fortiora sunt. Siquidem catagmatica ab eis dicta, purgandi siccandiq; facultatē habent: hæc autem acrimoniam quandam sortita sunt, ut ex alto in superficie extimam non ossa modò, sed his multo magis humorem crassum aliquem & uiscosum, uel omnino deprauatum extrahant. Meminit huiusmodi emplastrorum Asclepiades in tertio libro de exteriorum medicamentis, quæ sanè in quarto huius operis libro tractamus. Quoniam uerò ad cacoëthe ulcera, & chironia quedam ipsorum conuenire dixit, tum quod ad Deleontem auctorem

refert cephalicum, tum ex nigro uiride cephalicum, tum Philoti cephalicum, tum Isin, quod & ipsum simul cephalicum appellat, aliâq; nonnulla huiusmodi, quæ huc pertinere putandum, ideo nunc quoque ipsa non apposui, sed ad catagmatica & cephalica ab alijs medicis memorie mandata transgrediar, ubi generalem utriusque potentiam exposuerim. Quæ uero & antea in hoc libro protulimus, tum in opere de simplicium medicamento- rum facultate in memoriam reducentes cognoscere uos expedit, cephalica nempe catagmaticis esse nobiliora, eoq; cum cerato carnem producere. Quapropter & sarcoticis alio quodam modo similia sunt. Nam ubi ex cerato uim remiserint, sarcotica fiunt, quæ linamentis excipiuntur: adiecto uidelicet interim oleo, aliàs rosacco, nonnunquam alio quodam huiusmodi.

#### De emplastris glutinantibus.

**Q**uidam hæc *ἔννομα* & *τραυματικὰ* nuncupât. Opus eorum est, coniungere, & diuisas partes conglutinare, ut in pristinam unitatem particula reducatur. Verum non modò cruenta protinus glutinantur, ubi sanguinem ex diuisione profluentem adhuc spongia deterferimus, deinde suturis, aut fibulis coarctauerimus, sed etiam sinus ueteres, cum ab omni inflammatione immunes, & pueros medicamentis appositis effecerimus, cōmittuntur, coëuntq; dictum est in Therapeutices libris, medicamentum primariò, atque ex sese, serdis deterforium appellari: altero significatu sarcoticon, id est carnem producens & glutinans. Non enim tanquam ipsum sarcoticon, aut uiuens, neque tanquam hæc naturæ solius operâ non sint, sed

sed quòd talibus impositis medicamentis ulcera carne re=  
plentur ac coeunt, appellationem hanc sortita sunt. Opus  
ipsorum proprium est, affectam partem recrementis ua=  
cuare, ne uidelicet sanies carnis generationem, glutinatio=  
nemq; impediat. Indicatum est, glutinatoria sarcoticis  
esse sicciora: item sarcotica detergendi uim omnis rosio=  
nis seu morsus expertem referre. Glutinantibus autem  
non absterforijs prorsus, uerum desiccantibus solum es=  
se licet. At cum cicatricem ducentia pharmaca multò his  
(præter quàm quòd abundè astringunt) sicciora sint, sta=  
tuamus demum & quæ glutinant, & quæ coniungunt,  
moderatiùs istis exiccare. Finis autem glutinantium est,  
nullam inter coitura subnascentem humiditatem permut=  
tere: epuloticorum uerò non hanc tantum impedire, sed  
etiam nunc consistentem in ijs quæ mox cicatricem du=  
cent, consumere: ad hæc callo obducere, & astringen=  
do indurare. Sarcotica sanguinem ad refectionem ido=  
neum, tum pro quantitate, tum pro qualitate tuentur: ac  
tantum talemq; quanto natura & quali ad carnis gene=  
rationem indiget. Cæterum lenissimum medicamen pu=  
rum ulcus seruat, siquidem tale acceperit: sordidum uerò  
necesse est illud tantum pro sua ipsius potestate deter ge=  
re, quantum crassitudinis sordes habuerit: quinetiam car=  
nem recens iunctam mordere & exedere debet. Vnde  
palàm colligitur id, cum tale existat ulceri carnem non  
esse inducturum, nec cavitatem repleturum, sed quòd po=  
tius ipsa colliquabit, imminuetq;. Atque huius rei causa  
medicamentum quod sordibus copiosis repurgandis est,  
quo de antea dixi, non semper carnè potest gignere, nisi

uel ex uberiore oleo, uel rosaceo liquatum, sicut quod  
 ἐλαῖωδες & ἡ χάρις inscribitur, deterfionis uehe-  
 mentiam remittat, uel ex cerati mustura rosionem depo-  
 nat. Huiusmodi multa multiplicis usus uires ostendunt,  
 quemadmodum Machæionis emplastrum, tum Isis. Sco-  
 pus igitur singulorum id genus in Therapeuticæ libris  
 declaratus est: simplex facultatum materia in alio opere  
 priori composita, in præsentī tractatur. At primum in  
 eo memuisse oportet naturæ corporum, quæ curanda su-  
 sceperis. Nam humida, eoq; mollia, quemadmodum mu-  
 lierum, puerorum, eunuchorum, & qui muliebriter de-  
 gunt, imbecillioribus medicamentis indigent: uirorum  
 corpora, potissimum qui ex uirilibus munijs & sole du-  
 rum corporis habitum conciliarunt, ab imbecilibus ni-  
 hil præsidij sentiunt. Quapropter nec glutinantia utri-  
 usque sexus corporum communia sunt, sed quæ ex ar-  
 genti spuma, oleo, & aceto præparantur (in priore li-  
 bro de ipsis egimus) imbecillam mollemq; carnem gluti-  
 nant. Quæ bitumine, ærugine, squama, aloë, & myrrha  
 constant, robustam & duram. Itaque bitumen ipsum per  
 se in harum uirtutum scopo continetur: at nulla ratione  
 solum ex oleo liquatum usurpare poteris, ut quod fria-  
 bilius sit, quàm medicamento emplastrodi faciendo con-  
 ueniat. Ut igitur emplastrum fiat, ceram & resinam ei  
 admiscemus, à quibus denuò uirtutē eius solutam iri sciē-  
 tes, interdum æs, uel eius squamam, sæpe aloën, uel myr-  
 rham, uel in summa siccans aliquod medicamentum non  
 inepte adijcimus.

Nigrum

Nigrum EMPLASTRUM quod inter glutinantia Emplastrum recensetur, hæc recipit: Cerae, picis, bituminis, pityinae, nigrum. singulorum pondo libram, mannae pondo uncias sex, cerussae pondo uncias quatuor, chalcanthi pondo uncias quatuor, opopanax pondo uncias duas, olei semuncia, alij selibram, aceti heminas duas. Ceram, bitumen, oleum, acetum paululum relinquens in olla recenti liquato: deinde picem & resinam adijcito: in minima frusta diligenter concidito. Vbi semucoctum fuerit, tollito ollam, & a Coctio-  
liquandiu refrigerato: inde atramentum sutorium per= modus.  
colatum, laeuigatumq; ex duabus aceti heminis paulatim inspergito, ne effruescat: effusum leuiter subu-  
uens: cum tactum non inquinat, cacabum deponito: opo-  
panacem antea in reliqui aceti parte madefactum insun-  
dito, ut dissoluatur: mox cerussam, mannam unà pariter trita inspergito: & paululum tepefaciens, ut in unum coeant, obserua, ne opopanax & manna adurantur: re-  
fusa in mortarium, ibi refrigerari finito: ac rursus sub-  
acta reponito, atque utitor. Porro manifestum est, etiam  
alia barbara, quæ tum Andromachus, tum reliqui tra-  
diderunt, eodem modo confici oportere. Quidam opo-  
panacem cacabo non iniiciunt, sed leui ex aceto facto li-  
quata in mortario superfundunt. Cum eo nonnulli mi-  
scent mannam, & cerussam, quemadmodum ego quoque  
sepius feci, in mortario terens ex aceto, & quæ liquari  
possunt, liquefaciens. Subinde uerò atramentum suto-  
rium duntaxat cum opopanace laue factum cacabo indi-  
di, mannam cerussamq; inspergens.

# E tertio libro Galeni

DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

*Quis cōmunis uulneratorum neruorum  
curationis modus, & quæ medica-  
menta specialia.*

Præceptorū  
Galenī error  
in neruorum  
curatione.



PECTAVIMVS omnes  
præceptores nostros præsidio,  
quod iam recentiores medici <sup>ἡ νόσος</sup>  
μὲν & glutinatorium appellare  
solent, uti. Nam initio medica-  
mentum aliquod ex enæmis im-  
ponentes, uulneris oras commut-  
tere seu glutinare moliebantur. Si uerò phlegmone eas  
obsederat, calida aqua liberaliter fouebant, ac tritici  
farinam ex hydrelæo decoctam, cum oleo applicabant.  
Quare etiam gladiatores in patella uulneratos, supraq;  
hanc in lato tenuiq; tendine, pari modo ab ipsis curatos  
uidi: forsan melius dicas non curatos, sed perditos: pau-  
cissimi enim illorum, & ij claudi superuixerunt. Quid?  
quod permultos in manu summa tendones, per quos di-  
giti flectuntur extendunturq;, uel contusos, uel minimo  
puncto læsos, putrescentes adeò conspexi, ut coctis diu-  
tius in aqua similes apparerēt. Non enim secus exoluuntur

tur



tur & substantia emollescunt superiorem sanandi modum experti, ut quo uulneratam partem ueluti putrescere perceperim. Quoniam uerò omnia ex humiditate & calore putrescere cognoscebam, curationem per siccantia refrigerantiaq; moliendam esse deprehendi. Rursum apud me contemplatus, frigidum ferè ab Hippocrate neruis inimicum dici, optimum fore neruorum uulneribus medicamentum intellexi, quod & siccaret, & caloris frigorisq; particeps esset, uel parum ab horum medio ad calorem recederet: calidum tamen esse satis posse, modò sic candi potestate polleat. Etenim calor citra humiditatem putrefacere nihil habet. Insuper illud quoque præmeditatus, multum referre, nude parti affectæ medicamentum offeras, an per alia corpora ei præposita, conuenire aduerti alijs in nudato neruo uti pharmacis, alijs cum punctus fuerit, partibus, quæ ipsi præiacent, illis. Vbi etenim nudo neruo medicamentum adferas, ibi prædictam auxiliorum integram indicationem assumi ratio est. Præpositis autem partibus saluis, tenuius pharmacum inueniendum est, cuius uirtus interiacentes particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret. Quod efficere tale pharmacum potest, si ualide siccet: & si nō calore & frigidityte medium sit ac symmetron: non offendere, dum efficacia ipsius calefaciendi uel refrigerandi in particulis, quæ neruoso corpori præpositæ sunt penetrandis imbecillior est reddita. Atqui inueni to iam præsidiorum scopo, quàm uidelicet tenuia esse conueniat, deinceps materie mentionem facere oportet. Plurima igitur quæ calefaciunt tenuiorum esse partium,

Enumerat tenuium partium medicamenta.

permulta rursus quæ refrigerant crassiorum, in simplicium medicamentorum speculatione didicimus: quippe una solum qualitas acris cum tenui substantia nonnunquam ipsis accidit, eoq; inter omnia, quæ refrigerantium obtinent, tenuiorum partium acetum est quamacerimum, quod etiam caloris modici particeps esse demonstrauimus: calefacientium uerò liquores prohi tenuissimam habent substantiam: & apud omnes iam homines Cyrenæus primas tenere cognoscitur, quo non præsentem etiam medico utimur: & ijs quæ cum ipsis ab orientalibus plagis afferuntur: cuiusmodi est, quod Sagapenum appellamus. Hoc genere comprehenditur & liquor euphorby iuxta occiduas orbis regiones natus, siue liquorem ipsum, siue aliud quid nominare uelis, nobis in præfenti commentario euphorbium hoc medicamentum uocare sufficit, quemadmodum iam omnes consueverunt. Quinimò in nostra regione proueniētes, & panacis, & tithymalorum liquores subtili facultate præditi sunt, & quidem omnes nominati liquores generosi calefaciunt, opobalsamu uerò subtilis, & ipse non admodum calefacit. Atque ex terrestribus nitri spuma tenuem substantiam habet, item quod ex aqua facile soluitur aphronitrum, si ad corpora terrestria uidelicet relationem fieri inaudiamus. Subsequitur nitrum nomine beroniceum, & asia petra, cuius flos etiam omnium terrestrium est subtilissimus. Porro ex metallis auripigmentum, & sulphur, tum subtilia, tum calida sunt: quibus succedit masys, æris squama, & chalcitis, paululum simul astringentia. Quare uisita quoque chalcitide frequenter in subtiliorum medicamen-

torum

torum compositionibus utimur. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentiae metallica sunt, spodium, & phospholix: adde quod uocatur psoricum: subtilis abudè est & chrysocolla. Cæterum inter succos laurinum simul cum eo quod calefaciendi uirtute ualida pollet, quæ sensibus percipi queat, tenuem esse didicimus. Nihil enim minus eo cedrinus excalfacit, calore tamè qui sensibus subijcitur, propter substantiæ tenuitatem, illi cedit. Huius generis est lixiuia, quæ stacte dicitur: atque hanc ipsam, quæ ex materia subtili uisita fit, cedrinum oleum uirtute superat. Ex malo igitur & ficu, eaq; magis agresti, quàm <sup>ἐρ. π. 60 p</sup> Græci uocant, item ex tithymalis combustis, huiusmodi lixiuiam conficimus. Præstantissimus est ex tithymalis, qui χαρφαίος nuncupatur. Cæterum ex seminibus frumētarijs, σίτηρα nomināt, subtilissimus est eruus sine insigni calefaciendi potestate: lolium uerò cum insigni: hordeum nequaquam calfacit. Mediam interea materiam obtinent, qualitatibus amara, quæ multum tenuibus substantia cedūt, craffi licet nihil habētia. Nonnulla ipso rum à medijs tantillum declinarunt: alia ad calorem, alia ad frigiditatem: quarum omnium materias in opere de simplicibus medicamentis executus sum: quemadmodum etiam omnium fructuum (Græcis ἀγρόδια dicuntur) in quorum numero sunt amygdalæ amaræ, & pistacia: at stirpium materiæ in præsentia non memini: redire enim ad principium cogito, atque exponere, quando, quoq; modo singula per rationem nobis inuenta usurpauerimus. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum materiam cognoscant, }

ipsimet inspiciētes, non semel aut bis, sed frequēter: quoniam sensibilium rerum cognitio sedula inspectione confirmatur: cuius rei indicium est euidentissimum, quod didymi per omnia similes esse nobis uisi sint, differentes autem ijs, qui ipsos inspicere consueuerant. Itaq; herbarum, fruticum, & arborum materiam priusquam e terra exinantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum æduntur, dum augeſcunt, & dum uigent. Hæc siquidem cōtinua speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias, ne à solis radijs exurantur, neq; ab humiditate ex tecto uel muris madefiant: id optime fiet, si domus neque subterraneæ sint, neque alijs uicinæ, neque sub tegulis, sed ostia ad meridiem spectantia habeant, prope quæ tamen medicamenta reponi non debent. Amici hic quoque uos admonco, ut me sequamini, si artis opera pulchrè obire uolueritis: nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis medicamenta mihi adferantur, eò quod per diti illi omnigenarum rerum cōemptores uarijs modis ea contuminant. Præstiterat forsā non hos solum, sed multò magis etiam mercatores, qui illa aduehunt, incusare, atque his multò magis ipsos herbarios: item nihil minus eos, qui radicū liquores, succos, fructus, flores, & germīna extra anni tempus in urbes conferunt: hi siquidē omnium primi in eis dolum exercēt. Quisquis igitur auxiliorum undique copiam habere uolet, omnis stirpium materiæ, animalium, metallorum, tum aliorum terrestrium corporum quæ ad medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut

ex eis

ex eis & exacta, & notha cognoscat: deinde in cōmentario meo, quem de simplicium medicamentorum uirtute prodidimus, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instruetus ad præsentis operis præsidia ueniat, uerbotenus quidem medendi modum sciet, opus uerò nullū ipsa dignum perficiet. Finge nanque ipsa, quæ de neruorum uulneribus prædixi, quædā te cognoscere: adulterata uerò medicamēta per ignorantiam compositioni iniicere, uel neque omnino exactè facultates ipsorum intelligere, an nō erit necessarium, frequentius hic te errare, quàm rectè agere? Mihi quidem admodum uidetur. Iam uerò ad plenum uirtutes cognoscere ab eo multum differt, quod est cognoscere. Etenim solum cognoscere scire est, an medicamentum siccare, uel humectare, uel refrigerare, uel calefacere nos possit: accuratè uerò cognoscere, præter hoc etiam uirtutis quantitatem sciuisse est. Quædam enim pharmaca calorem tepidum generant, corporibus nostris admota: quædā moderatum, quemadmodum alia hoc paulò ualidiorem, nonnulla iam sic feruentem, ut urere possint. Conuenit igitur, medicum non modò affectus qualitatem, sed etiam ipsius quantitatem, ut ita dicam, coniecturare: nam haud ita propriè quantitas in qualitate dicitur, quanquam dicatur tamen, ut febris magna & parua: ac tantus usus est eorum quæ sic dicuntur, ut iam proprii uim obtineant ipsa, perinde ac pyxis, æs, pictor, quercus incisior: in totum, quæ ex grammaticorum, ut aiunt, abusu inceperunt: deinde uerò propria dici credita sunt. Hæc quidē attulimus propter eos, qui parum opportuno tēpore de  
ser

sermonis proprietate argutantur. Quod autem dicere desij tale est, nempe quod exiccari desiderat, non simpliciter siccante indiget medicamento, sed conuenienti mensura. Copiosa quidem humiditate auctum, insigniter exiccante: parua, modicè hoc faciente, quemadmodum multa, admodū resiccante: non tamen extremè, neq; in summo: siccitatis enim quantitatem humiditatis copiae respondere conuenit. Ego itaque dum communem neruorum uulnerum curationis modū immutare primū ausus sum, conieci in quantam humiditatem caloremq; affecta pars recidisset. Et cum adulescens quidam mihi ostendisset in primo articulo medij dextræ manus digiti, totum in ea circa neruum locum humentem adeò ex contusione habentis, ut iam computresceret, partem sanè putridam lixiuia stacta & cataplasmate ex hordei farina (ὡμὴν λυεῖν Græci nomenclant) foui: non putrescentem, sed tensam dolentemq; oleo calente liberaliter perfudi: inde quum lana sicca madorem exhaustissem, ceratum tam humidum illeui, quàm in fracturis utimur, cui euphorbium sit admixtum. Confectum autem mihi est hoc quoq; mea industria, huiusmodi occasione: Profectus ad me quispiam hyeme uehementi, ostendensq; genu facile dicebat rigore se affici: statim uerò calefacientibus iuuari. Volebam igitur huiusmodi aliquod medicamentum acciperet, ut qui profectus in frigore inalgeret doleretq; uehementius quàm aliàs. Nunc igitur, inquit, loturus discedo: mitte à balneo medicamentum: hæc cum dixisset, abiit. At ego cum tale nullum medicamen ad manus haberem, euphorbium cum oleo triui, & ceram liquatam immiscui.

paulo

paulo post cum amicus pharmaco ferendo puerum misisset, exhibui. Doloꝛe protinus cessante, inde in alijs particulis similiter affectis uti præcepimus, de quibus mox dicitur: nunc ad nerui uulnerati sermonem redeo, propter eos, qui nihil à me nunc dictum intelligunt: increpant autem interpretes, quos deprehendunt (ut uaticinor) perperam nominare νευροτρώτους in tendonibus uulneratos. Tendones enim ipsos puto uocari, qui extra manum toti uolæ, & digitis circumtensi sunt. Quanquam sanctè non ignorem, manifestius magisque proprie \*τε = \*νευροτρώτους ipsos nominari: tamen cum omnes neurotrotos nuncupare soleant, & ego, ne quis innouare me appellationem dicat, consuetam pro uera suscepi, etsi nec illa sine ratione fieri potuerit, plerisque medicis tendones etiam nervos uocitantibus. Verum siue neurotrotos, siue tenontotrotos appellasse mauis, neque ob has uoces incolumes erunt, neque conuulsione laborabunt, quemadmodum neque mancipient, nec morientur. Appellatio siquidem nec seruauit hominem unquam, nec perdidit, sed medicamentorum facultas utrumque efficit. Atq; ego hæc immutans, putrescentes, conuulsos, mancos, nonnullos etiam pereuntes, sanos uiuosq; reddo: nervos enim contusos habentes sicut illum neurotrotos, non neurothlastos nuncuparunt. Cæterum curatio communis est, & periculum simile amborum, nempe contusorum & uulneratorum, uel neruis, uel tendinibus. Itaque homo ille putredine iam circa primum medij digiti articulum orta, tensus doloremq; ex superiacentibus concipiens, multo melius habere cœpit die postero, quo uice hordei farinæ

rinæ eruorum farinam stactæ lixiuiæ commiscuimus. Vnde triduo similiter curatus est : iam quidem in alijs quorūque particulis dolorem omnino non percepit, ex contusione uerò neruosum quoddā corpus crassæ membranæ persimile inclinauit : quod mediocriter me commouente facilè totum semiputridum excidit . Videbatur omnibus contemplantibus hoc corpus neruus totus esse putris , ut qui ignorarent, quo pacto tendones hi neruosis membranis conuelati, per uolam procedunt , & in totam seriem digitorum extenduntur . Mihi uerò putridum ex contusione attollenti tendo saluus apparuit . Cum igitur uel pastillo uno, uel trochisco, uel utcunq; uocasse libet, quorū in numero est & polyidæ , ex epsmate soluto , uel syraeo, id est sapa ( nam & hoc pro arbitrio nominare liceat ) apparentē nerui particulam prius inunxissem, rursus eodē modo & cataplasmate, & unctione ex euphorbio in iisdem locis sicut prius utroque usus sum . Quarto iam die omnia commissa circa contusum quidem antea, ulceratum uerò tunc primum digiti articulum intuitus, considerabam quorsum à cataplasmate transgrederer . Visum igitur est, si neruus inflammatione prorsus uacaret , ad cicatricem ducentia transire : si uerò phlegmone ipsius scirrhusus tumor remanserit, abundè siccantia exhibere . Quoniam uerò nōnihil ex ea reliquum esse uidebatur , medicamentum ex dracunculi radice confectum usurpauī, quòd præter alia, eadem cum Aegyptio phar-maco Iside continet : assumpsit autem dracunculi radicem . Ab hoc Athena dicta usus : inde ad ea, quæ cicatricem ducunt, perrexi . Ex altero pastillo sapa diluto nu-

datas



datas uulneris partes illinens, euphorbium extrinsecus  
 imponebam, tantum ceræ ac resinæ temperans, unde em=  
 plastrum crassitudo simul fieret, & euphorbij uires con=  
 seruarentur. Cæterum quomodo his scopis considera=  
 tis medicamentum componas, postea declarabimus. Ete=  
 nim aliud ex aceto pharmacum confecimus, hoc spectan=  
 tes, uti ipsius spissitudo, & subtilis aceti uirtus, cum re=  
 frigerandi uis interim exoluitur, incolumis permaneat.  
 De his sanè quomodo præparata sint, post paulum tra=  
 ctabitur. Nunc quia neruis uulneratis medendi modum  
 ex rationali indicatione, nugatoria illa Empiricorum  
 periptosi repudiata, inueni, totam cogito ipsam dicere,  
 sed ita, ut nullam distinctionem præteream, sermonem  
 ab initio rursus repetens. Quando igitur uulneratum  
 aliquem protinus offendero, interim per liquida phar=  
 maca curationem molior, interim emplastris, lanam ex=  
 trinsecus quàm mollißimam oleo calente imbutam appli=  
 cans. Quòd si medicamentum ex aceto usurpem, aceti mo=  
 dicum oleo adnascès, bis tēue quotidie soluo, & oleo ca=  
 lente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiā in his \* soluere \* λούειν.  
 consueui, idq; magis dum ulcus à medicamentis eroditur.  
 Nam ubi initio tali medicamento utēti æger nec se mor=  
 deri, nec dolere, nec tēsiōnē percipere mihi dicat, die sol=  
 uo, & foueo, mane semel, & uesp̄eri iterum: oleū uerò,  
 quo fouemus, satis calēs esto, uerū ita ne uulneratā par=  
 tem offēdat. Sicut enim frigida huiusmodi affectib. ma=  
 ximè est contraria, sic tepens non omnino utilis. Quoniā  
 in primo de Simplicib. Medic. uolumine didicimus, ut  
 aqua calens aut frigida maximè cōtraria facere nata est,  
 ita

ita quoque oleum. Nam frigidū corpori admotum, per-  
 spiratum ipsius obstruit, imò prohibet: calidum uerò di-  
 gerit, ac extenuat: quod tibi etiam ex carnibus in eo co-  
 ctis licet condiscere: similiter enim pridie decoctis, fria-  
 biles efficit: etsi protinus cum animans mactatum est, co-  
 quas, aut in sartagine frigas: propter quod & ego sō-  
 mentum ex oleo calente satis usurpare malui, tepidū sem-  
 per uitans: hoc autem magis frigidum. Porro aquæ u-  
 sum in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem  
 ulcus: proinde cum sanguis initio statim à uulnerata par-  
 te detergendus est, ex oleo id facere expedit. Vbi iam  
 ægri mediocriter habentes, lauacro utuntur, neque tunc  
 affectum locum in aquam demergere ipsis cōcedendum:  
 magna siquidē ex parte nerui in manibus uulnerati sunt.  
 Memini cuiusdam ex huiusmodi uulneratis, qui cū diē  
 quartum citra omnem dolorem ageret, partemq; affectā  
 absque phlegmone uideret, multo in frigore domo egres-  
 sus ad opus quoddam necessarium, eiq; diu immoratus  
 domum redyt, membro uniuerso ad ceruicem usque ten-  
 so, idq; cum ingenti ipsius dolore. Postquam uerò quo-  
 dam me accersente, profectus ad eum, uidi quibus in ma-  
 lis esset: oleum ex itinere refrigeratum à particula au-  
 ferri iussi: calente uerò totum membrum foui, deinde cer-  
 uicis partem rectam lanis oleo respersis, & medicamen-  
 to liquido ex euphorbio, simul cum castoreo hominem  
 statim mitigauī: & somno accedente usque ad uesperam  
 omnia cessarunt symptomata. Plurimum igitur confert,  
 lanam permanere calidam, siue oleo tātum, siue oxelæo,  
 hoc est aceto & oleo quoque imbuta fuerit: fiet hoc, si  
 aliæ

aliæ lanæ siccæ extrinsecus circumponantur, & aeger in tra tectum, modò hyems fuerit, ad quintum usque uel septimum morbi diem sese contineat: nam si eousque nec phlegmone quadam tentetur, uacetq; prorsus dolore, & nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit. Curabis autem ne in aceto uinosum aliquid appareat: quemadmodum oleum quoque, ut omni astrictione uacet. Neque igitur crudum, quod ὠμοτριβὴς, uel ἐμφοκίνον duplici nomine Græcè dicitur, adhibebis: neque id quod ab Hispania uehitur, imò nec aliud quodlibet ex his quæ oleæ surculos habent. Optimum oleum est tenuissimum, quale in Deolco. Italia Sabinum: alibi uerò in nationibus Romano imperio subiectis, quæ nullam obstringendi uim occupant. Iam uerò qualis res sit rationalis indicatio, & quanto potior nuda experientia citra methodum hinc condisces. Cùm permultus neruorum uulneribus sæpe in itinere, in nauigio, in agro, uel in ciuitate, sed procul à meis ædibus incidissem, nec medicamēti ex euphorbio copia adesset, nec illius quod ex aceto cōficitur, nec alterius, phar maca, quorum eo loco facultas erat, uulneri imponentes, id quò tendimus semper sumus affecuti. Noui etenim me in agro propolim recentem, liquidā & pinguem, quam agricola habebat, uulneri imposuisse: interim fermentum solum, interim ambo commixta. At fermentum quānue tustissimum esse, propolim uerò secus habere conuenit, quantum ad tempus attinet. Sin autem uetustior sit, ex oleo iuxta ignem, uel in sole emolliatur. Rursus in alio quodam rustico succum tithymali fermento mixtum imposui, quem prope ipsius aulam succreuisse conspexi.

ram: quippe fermentum ut recens deprehendi: nonnunquam propolim ex oleo liquefactam fermento immerfi, sed prius aceto quam acerrimo dissoluto. Præstat oleum esse uetus in huiusmodi temperaturis, puta ex oxymelite & fabarum farina, uel eruorum, uel lolij, uel ciceris, uel lupinorum amarorum, uel tenuiori polætæ puluere, uel hordeacea farina: quibus in urbibus usus sum cataplasmatis, non solum in his, quos iam phlegmone prehe-  
derat, sed etiam protinus ab initio. In agro cum picem li-  
quidam apud fabrum inuenissem, fermento temperatam  
imposui: item apud alium cruorum farinam illo imbutâ,  
cuius penuria etiâ prædictorū quoduis nasceri potest.  
Quinetian oxaleum solum quod caleret lana exceptū,  
statim dum aliud nihil haberem obtuli, confusus aceto  
abundè acri & uetusto. In alio refrigerato, quod ante  
horam unam, uel longius etiam tempus neruus contusus  
esset, quousque aliud quoddam idoneum medicamen di-  
lutum adferretur, partem oleo foueri præcepimus, inte-  
rim aceto prius admixto: cum aer per æstatem calidissi-  
mus erat, temperatura ex utroque diutissimè foui, donec  
aliud medicamentum asportaretur. Singulis autem præ-  
dictis farinis permistam statim sæpe illeui, & mox à  
principio, & postea cum homo medicamine quodam e-  
nemo non probè usus esset. Hæc itaque omnia quomo-  
docunque applices, calida qualitatibus offeras. Ego sanè  
cùm nullum domi meæ aliquando medicamentum compo-  
situm in promptu haberem, festinabundus dedi cuidam  
famulari uctus euphorbium, iniunxiq; læue factum ex  
oleo ueteri, donec humidi cerati spissitudinem haberet,  
tendi

tendinis puncturæ in manu admouere. Reuersus igitur, interrogavi uulneratum, multumne caloris in parte affecta sentiret: ille mediocrem aliquem respondit se percipere. Rursus igitur quærebam, an rosionem à medicamento iuxta uulnus sentiret: ille cum se non rodi, sed ueluti pruritum quendam sentire dixisset, pharmacum ad noctem usque adherere permisi. Quoniam uero dum imposita auferrem, calor in affecto loco mediocris mihi apparuit, neque punctus hians, satius uisum est eodem uti medicamento: & cum uulneratus altero die prosperè haberet, item tertio & quarto, ad finem usque idem pharmacum usurpavi: quod contemplatus aliquis in alio uulnerato similiter recenti euphorbio in eundem modum usus est. Quare necessario calor ægrum multus, & comorsus, & dolor in ulcere subsecutus est, adeo ut homo ad me deductus sit, tanquam hoc præter omnium opinionem accidisset. Ego statim re intellecta, quod impositum erat abieci: fotum autem per oleum ipsi adhibito, medicamentum ex aceto imposui: quod si non in procinctu fuisset, pharmacum ex euphorbio copiosioris ceræ particeps admouissem. Quapropter non oportet, uti paulò antè diximus, probatorum medicamentum facultates ac species ignorare, nec quæ celeriter uirtutem mutant: tum quæ rursus diutino tempore conseruant. Nam ex his, quæ caducum ac statim euanescentem calorem occupant, euphorbium est. Id autem cognoscas, etiam si non manduces colorem contemplatus: quippe non ut ab initio cinerium, uerum suppallidum & subflauum redditur inueterascens. Statim etiam siccum abundè uidetur tunc, & uix inter

*Leuigandum ex oleo recenti protinus imbibito dissolui-*  
*tur. At subito ipsum oleo miscendum non est, sed prius*  
*in mortario sensim terendum, ne dilatescat. Quid uerbis*  
*opus est? quod etiam gustanti tibi recens percipitur fer-*  
*uentissimum, ut linguam adurat, uetus autem modicam*  
*efficere caliditatem? Iam alyis multis pharmacis exilem*  
*adeò potentiam pauculis annis retinere contingit, attamen*  
*euphorbium tapsiam excellit: hæc enim ab anno admo-*  
*dum imbecillis redditur, ut binula prorsus expiret: eu-*  
*phorbium sanè cum principio bonum fuerit, & probè*  
*urat, etiam anno tertio adhuc uim aliquam retinet: inte-*  
*rim anno quarto: quinto autem & sexto iam exoluitur:*  
*deinde procedente tempore in totum elanguescit. Sic ego*  
*dixi, oleo me nonnunquam usum esse uetusto sine cera,*  
*quod annos ferè quinq; uel sex natum esset. Vnde usum*  
*ipsius euphorbij mensura comprehendere nemo potest.*  
*Nam recens oleo decuplo cum cera tripla commiscetur,*  
*ueterascens copiosius ei immittendum est: trimum uerò*  
*& quadrimum, uel duplicatum prioris pondus, uel æ-*  
*quale ceræ. Cum igitur pharmacum consistentia simile*  
*ac opis dictis unctionibus habere uolueris (quæ spissitu-*  
*do liquidi etiam cerati est) oleum ceræ quadruplum esse*  
*curabis. Vbi uerò emplastri speciem referet, cerā omni-*  
*no æqualem oleo temperare oportet, maxime si sicca fue-*  
*rit, & uetusta: sicut recens & pinguis pauciore oleo in-*  
*diget, ut ceratum emplastrodes efficiat, idq; magis adhuc*  
*per æstatem. Itaque si ceratum emplastrodes facere sta-*  
*tuis, ceræ ex oleo liquefactæ, qua dixi temperatura sex-*  
*xtam recentis euphorbij partem admiscebis, ut illius una*  
*fit*

fit drachma, ceræ sex, olei item sex, uel quinq; . Sed quoniam cera glutinans ac uiscosa non est, quemadmodum resina & pix, ideo hanc, uel illam, uel utriusque partem cerato admisceo. Clarum igitur est, dum hæc miscentur, non amplius oleum pari illis portione affundendum. Et enim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: resinae quæ quidem aridæ prorsus sunt, modico: liquidæ & siccam quandam substantiam ad emplastri crassitudinem assumere postulant. In cera igitur non magna humiditatis ac siccitatis differentia est: inter resinas, sicut etiam in picis genere contrario modo habet: aridæ præsertim ab humidis permultum differunt. Omnium uero siccissima est, quam nonnulli frictam, alij colophoniam appellant. Huic succedit, quæ ex figulinis impura, nec despumata sumitur: quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur pitynon physema, ac si dicas, picea germinatio. Hanc sanè ceusquallidã, in præsentis emplastri compositionem non esse idoneam ratus, abieci. Vsus autem sum fricta & liquidis. Iam uerò ex his nonnullæ diutius liquidæ permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ citò inarescunt, sicut strobilina: media utriusque est abietina. Quinetiam facultate calidior est quidem strobilina, mox uerò abietina, deinde terebinthina: cupressi resinam miscere non ausus sum, ut quæ nonnihil astringeret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis hunc in modum scribentem, primo de medica materia commentario: Ex omnibus resinis principatus terebinthinæ datur, post eam lentiscinæ, tum ei quæ de picea raditur,

Resinatũ dicitur  
differentiæ.

Et abiete: ultimū locū pinea, strobilinaq; obtinet. In his enim Dioscorides tanquā de infima strobilina, optima uerò terebinthina sentire uidetur. Verū ego ex his tribus resinis, strobilina, abietina, terebinthina, principem certē strobilinā calore, secundā abietinā, postremam terebinthinā esse diximus. Quēadmodū igitur, qui inter Italiæ uina aūstera optimum ponit uinum Italicum: alius ad qualitatem unam sermonem referens, alius absolute de tota ipsius substantia pronuncians, uerus deprehenditur: eadem ratione etiam inter resinas optimam tanquam medicamentum in multiplices usus accommodatum, meritō terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Itaque, ut aiebam, licet tibi quamlibet resinam ceræ miscenti simplex ceratum glutinantius efficere, quod ex oleo et cera duntaxat componimus. Hic uerò experientiæ quoque utilitas est, quæ de coniectura nostra decernat: potes enim, ubi triplicatam ceram terebinthinæ commiseris, intelligere, emplastrine spissitudinem medicamentum acceperit, an ea adhuc siccius, copiosorem insuper resinam desideret. Quapropter ubi hunc in modum experienti tibi mediocriter habere uideatur, miscebis tunc medicamento, quod conficis, duodecimam partem euphorbij. At si ignores euphorbium exactē sit calidum, an nonnihil ab eo discedat, post confectiōnem luteo paululum medicamenti illitum tuæ ipsius tibie uel cubito horis aliquot imposito: postea si modicē calefacere deprehenderis, temperatum esse medicamentum arbitraberis. Quod si uel nullum sensibilem calorem edat, uel iusto feruentiorem, integrum est aut pharmacum

remat



remittere, aut intendere : remittere quidem niſtura ce-  
rati, intendere appoſito euphorbio. Atqui ſi propolim  
pinguem habeas, eam omnibus reſinis aptiorem fore tibi  
intelligito, ut quæ uaporofam ſpiritus craſſitiem, humo-  
resq; ſuperfluos elicere, ac ex alto foras ductitare ſoleat.  
Siquidem reſinæ cum cera emplaſtri ſpiſſitudinis gratia  
non tanquam curationis conſilio aſſumuntur, propolis  
autem curationis ipſius ſcopo continetur, atque hac ſola,  
ut dixi, recenti, quantum ad humiditatem attinet, uſus  
ſum in agricola quodam duro corpore : ac mirum eſt,  
quomodo ſola aduſque finem adhibita adiuuerit, adeò ut  
nullius pharmaci præterea uenerit neceſſitas. Alteri qui  
puncturam nerui profundioreſ haberet, tithymali cu-  
iuſdam modicum admiſcui : mollioribus uerò corpori-  
bus medicamentum tactu durius apparet, niſi olei niſtu-  
ra uehementer ipſum mollias. Quin & alia medicamen-  
ta omnia, quæ neruorum uulneribus adhibentur, liquida  
& mollia eſſe conuenit. Molliciem igitur quoduis o-  
leum conciliare, robur uerò medicamenti uetus oleum  
tueri poteſt : ſicut propolim in agro nonnunquam ac-  
commodauimus, tanquam melius pharmacum iſs, quæ tum  
aſſuerant, eligens : ita fermentum ruruſ adinuui alte-  
rius medicamenti inopia, quoniam hoc quoque in alto fi-  
xa extrahere & diſcutere ſciebam : quanto autem uetu-  
ſtius, tanto eſt præſtantius. Porro huiuſmodi non ſolum  
facile in agris reperiuntur, ſed etiam ſulphur uiuum,  
quo nonnunquam & ipſo ſum uſus, temperans cum te-  
trapharmaco. Huic igitur & aphronitrum, & beroni-  
cium litrum, & aphrolitrum non lapidoſum, ſed uerè

aphrolitrum, quod spumæ consistentiam habeat, adijci-  
ens frequenter usurpauit, non modò in agris aliorum pe-  
nuria, sed etiam præsentibus enumeratis medicamentis  
hoc nomine, ut animi sensum experientia explorarem,  
probaremq; : ac uulneratus talis rei solo usu conualuit,  
fotus uidelicet oleo. Hoc enim commune tibi esto in o-  
mnibus medicamentis, quæ hic dicuntur, neruorum uul-  
neribus cōducere. Iam uerò quod à medicis uocatur ar-  
senicum, ab his qui Atticè omnia uolunt proferre ar-  
senicum, adiunxi tetrastapharmaco, rationem experientia uo-  
lens confirmare: rursus cum id non adesset, sandaracam,  
uti uocant, sicut calcem restinctam & uiuam, lotam &  
illotam, nunus autè uiuæ, plus restinctæ, & hac plus ad-  
huc lotæ adieci. Cæterum de exacta cuiusque composi-  
tionis quantitate paulò pòst dicemus, ubi hæc simplicia  
omnia, ususq; ipsorum distinctiones retulerimus. In hoc  
enim sermone propter Empiricos, qui ex periptosi, id  
est incidentia, seu casu plurima compositorum medicami-  
num inuenta esse putant, uisum mihi est commemorare,  
neruorum uulnera curandi rationem à me citra illam pe-  
riptosin repertam, inde quòd sanationis ipsorum scopũ,  
& simplicium pharmacorũ facultates cognoscere. Ete-  
nim ex casu unum aliquod simplex medicamentum inue-  
nitur : rationalis autem methodus plurima simul inue-  
nit, & uarias ipsorum compositiones. Quæ iam ex alto  
humores educere digerereq; possunt, neruorum uulneri-  
bus ex usu sunt. Quandoquidem uerò nonnulla calidi-  
tatem immoderatam, uel mordacem uehementer acrimo-  
niam, uel acutiem coniunctas habent, alia ipsis pharmaca  
admisce

admisceri ratio est, quæ prædictos excessus sine uirtutis offensa temperare queant. At hoc fieri non potest, nisi cuiusque medicamenti non modò qualitatis genus, sed etiam quantitatem in ea cognoscas. Quædam nanque, ut ostendimus in commentario de simplicibus medicamentis, in primo calefacientium ordine collocantur, à temperatis paululum abscedentia, alia in secundo magis inde declinantia, alia tertio, nonnulla quarto, quæ irere iam queant. Igitur ex uehementiæ uirtutis cuiusque pharmaci portione mistorum facultas inuenitur, modò simplicium omnium temperamenta intelligas. Empiricorum hæresis sola homogenia propter uniuscuiusque medicamenti naturæ ignorantiam temperat: & qui hanc nouerunt, sola homogenia miscent, quia excessus quantitatem certò non cognoscunt. Quod itaque ipse primum præparavi medicamentum, ex multis eiusdem generis compositum est, quoniam nondum cuiusque uirtutis quantitatem exactè pernoscebam. Inieci etenim nonnihil arsenici, sulphuris, musyos, calcis lotæ & illotæ, & pompholygis, similiter spodij, item squamæ æris, chalcitidis uistæ, lotæ & illotæ: ad hæc non uistæ. Hæc igitur prius in aceto quam acerrimo diebus multis sole æstiuo læuia reddidi. Quæ fundi ex his debebant, cera erat necessario, & mellis nonnihil prius expurgati: resinæ prope modum omnes, propolis, pix, & ladanum. Liquida, oleum cyprinum, susinum, opobalsamum, amaracinum, gleucinum, cedrinum, ricininũ & uetustum. Ex singulis autem liquoribus, quos non multo antè recensui, paulum aliquid: postremò aliàs aliud auferens experientiæ gra

tia, nihil simpliciora singula, quibus in hunc diem utor, à uirtute pristina abscedere animaduerti : atqui temperaturæ ipsorum mox ponentur . Itaque ex aceto, & liquoribus talia confeci, ceræ, resinarum, propolios, & picis nonnihil adiungēs, pari modo ex columbarum stercore & herbis tenuium partium . Minus ergo molesta sunt liquida pharmaca cum alijs, tum neruorum maximè uulneribus, quibus utimur etiam emplastri modo compositis, propter eos qui se lauare uolunt . Lanis enim ablatis, ac tali pharmaco solo adhærente, lauant minus duriter, sed liberius . Prædictum est, neque tunc læsam partem aquis respergēdam, si in manu uulnus contigerit, pedem uerò si is læsus sit, non madefieri qui potest : sed tunc à balneo primis quatuor diebus abstinendum est . Quoniam uerò omnium huius tempestatis hominum, & eorum etiam qui ruri degunt fortitudo perijt, qui lauare se quotidie consueuerunt . Equidem qui non adeò delitijs affluunt (sunt hi maximè pauperes) ut plurimum obtemperantes nobis habemus : diuites uerò, & præsertim potentes illos, uel ægrè obtemperantes, uel prorsus immorigeros experimur . Optimum igitur fuerit, nec ipsis mæderi : uerum cum, nescio quo modo, alius ob aliam causam, quidam nostrum inuiti, quidam ultro ipsorum molliciem tolerare coguntur, tale quippiam facitare consueui : uulneratæ parti pharmacum aliquod emplastrum imponens, extrinsecus iterum multiplices pannos oleo tintos plures superinijcio : quibus rursum extrinsecus fasciam ex linteis accommodo, quam deinde in ipso balneo, cum æger in solum ingreditur, oleo prius perfundendo : &

do : & loto iam omnia imposita aufero , utorq; prædi-  
cto totius curationis genere . At uerò patet omnibus , eum  
qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est , etiã  
particularum naturæ peritum esse oportere . Nam antea  
comprehensum est , tendines pariter in quos muscoli com-  
plures desinunt , non mediocriter condolescere , primum  
quidem conuulsione tentatos , dein putrescentes & ipsos ,  
uicinas simul partes uniuersas inficere . Nonnulli eorum  
ceu membranæ tenues lati q; sunt , quales in femorum ter-  
minus ad genua spectantibus , tum intra manus , infra q; pe-  
des subteni sunt . Omnes enim qui in manibus pedibusq;  
cernuntur , satis quidem coeuntes cutem contingunt : qui  
uerò in patellam perueniunt , à circumposita cute iuxta  
tarsum abscedunt .

Confectiones medicamentorum ex metallicis,  
ad neruorum vulnera.

EX metallicis medicamentis astringentia uitare consul-  
tū est , præsertim ubi cõpositi pharmaci usus in pun-  
ctura eueniat : quæ uerò detergendi uim occupant , sicut  
æris squama , ex usu sunt . Cæterum omnia metallica , cum  
crassiorum partium existant ( multū enim terrestris sub-  
stantiæ in se continent ) artificij nonnihil in præparando  
requirunt , quo tenuiora fiant . Hoc igitur ex aceto fieri  
quamacerrimo cõsideraui , præsertim quòd ex uino non  
austero confectū est : at si ex tali non sit , sed uetus , eo uti-  
tor . Attende tamen diligenter in gustu , ne tibi uel mini-  
mam uini qualitatem referre uideatur : tale quippe ace-  
tum ualidam exedēdi , secandi q; uicina potestatem habet .

Iam

Iam uerò metallica ex acerrimo, & quàm fieri potest uetustissimo, substantiaq; tenuissimè læuigare oportet, quò felicius spissitudo auferatur. Præstiterat id in sole æstiuo perficere. Quædã enim ex metallis ne uel scindi possunt, nec communui, in aceto ad dissolutionem facilia, sicut chalcitis, & misy. Nonnulla & contundi, & concuti, & postea læuigari desiderant, quemadmodum æris squama. Cum igitur primum præpararẽ medicamentum, immiscui ei & arsenicum appellatũ, postea superfluum esse putauì: etenim ex æris squama & misy, & chalcitide medicamen compositum iri abundè satis uidebatur: temperauì autem prima confectiõne etiam æruginẽ combustam: nam quæ ignem experta non erat, tanquam iusto mordaciorem suspicatus sum: deinde tamen non ustæ pauxillum simul adieci, quantum aliorum portio ferebat. Pari modo chalcitidem, crudam sanè paucissimam, ustam uerò æqualem misy & æris squamæ indidi. Præstantius autem omnibus compositis fore sperauì, imò etiã usu deprehendi, in quo copiosa æris squama inesset, dein chalcitis combusta, postea misy. Quocunque igitur miscebis pharmaca, ad solem, ut domi uerno tempore, multis diebus in puluerem ex aceto quàm acerrimo rediguntur: quanto enim longiore tempore trita fuerint, hoc tenuiorem substantiam consequentur: ideoq; angustis uulneribus aptiora: sicut in neruis carne denudatis, admodum tenuia exedentiaq; cauenda sunt: ob quod prædicti pastilli omnibus id genus conueniunt: siquidem nonnulli astringentia quoque assumpserunt. Porro celebres ex illis sunt, qui ad Andronem, Polyidam, & Passionem auctores

flores referuntur. Sunt & alij quidam, quartus, & quintus, illis ualentiores, quibus ego subinde utor. Temperaturæ uerò ipsorum perfectæ sermonis processu dicentur, nunc de eorundem usu tantum explicasse sufficiat, quod tritos ipsos aridos, postea rursus siræo ( id est sapa) adiecto ita terere conuenit, donec sordium spissitudinem recipiat medicamentum, & æqualiter læue fiat. Vocant autem nunc omnes siræon, ex musto decocto natum: id autem nihil uini habeat, quale nō ex austerarum uuarum, sed quàmmaxime dulcium musto præparatur, neque ex primo fluente, sed postremo. Si igitur tale mustū extiterit, coquendum est, dum ad dimidiam partem mensuræ consumatur: sin minus, ad tertias concoquendum est. Huiusmodi quidem decocto pastillos soluere expedit, ut mellis crassitudine linamentis excepti, neruis denu datis imponantur, maximè temperatiores, qualis Polyidæ est. Atque hoc multò magis, si corpus sit tenerum ac molliusculum, in quo prorsus à pastillorum usu te abstinere tutius est, alijs utētem pharmacis, de quibus iam sermo factus est, iterumq; fiet. Neruo autem cooperto, qui nudus erat, linamentis extrinsecus unum aliquod ex ijs, quæ ad angusta uulnera conueniunt, superdandum est. Sunt huiusmodi quatuor genera, unum quod ex metallicis conficitur, alterum ex liquoribus: inter quæ referatur & illud, quod ex euphorbio constat, tertium ex columbarum stercore, & quartū nunc à nobis appellatū, quo etiam ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos utimur. Ex his quatuor unum quoddam toti affectæ particule circundandum est, ita ut sanas quoque  
par

partes unâ comprehendat, præsertim superpositas: quas bis die, uel ter, si necessitas incidit, fouere oportet. Quin etiam nocte interim linamentis quidē denudato neruo impositis: cæterum eo quod extrinsecus admotum erat ablatum. Porro cum permagna humanorū corporum sit differentia, tum in temperamentis, tum ætatum mutationibus, insuper uitæ studijs, nulla ratione quodque medicamentum omnibus conuenire potest: quamobrem duo in promptu habeto, alterum ualentius ex simulibus genere confectum, alterum mitius, quæ inuicem mīsta dum usus postulat, permulta inter hæc iuxta mīsturæ quantitatem constitues. Si nanq; parem utriusq; portionem temperaueris, mīstum exacte medium amborum erit: quod si altero plus adijcias, tantum à medio ad illud summum recedet, quanto mīstura superauerit. Est igitur ualentissimum metallicum ex his constructum: unam partem crudæ chalcitidis habeat, duas misyos similiter crudi, tres æris squamæ: inualidissimum unam itidem misyos & chalcitidis, sed utriusq; combusti, squamæ quatuor. At uerò amborum medium, quo subinde usus sum, tale esto: Misyos, chalcitidis, æruginis, cuiusq; usti partem unam, æris squamæ partes tres: his, sicut prædixi, contritis, ceræ inualentissimo duplum, in altero duæ partes & s miscentur: in medio, quod intra hæc consistit, partes duas & quartam, sicut in primo trium, quod ualentissimum esse dixi, omnes partes numero senæ ex misy, chalcitide, & squama collectæ nascuntur, quibus ergo duodecim ceræ partes adijciuntur. At in medicamēto inualidissimo

Aliàs \* o = si metallicorum sex partes existant, ceræ \* duodecim etodecim .

appo



apponas, in mediocri amborum medium. Sunt autem inter octodecim & duodecim media quinque & decem. Quod si denarium unum statuas, unā omnium esse partem, tot denarios adjicito quot partes, siue unciam, siue libram: Sic enim apud Romanos consuetudo est nominari, tot uncias uel libras. Porro mēsurā apud ipsos est, qua oleum metiuntur, insecta discretāq; lineis, totam in duodecim partes diuidentibus: atque integra mensura ab eis libra nominatur: duodecima eius portio, uncia. Metallica igitur & cera in lance alijs uncys consistunt: oleum cornu metiuntur. Itaque prædictis pharmacis omnibus iuxta ceræ portionem oleum immittatur, superetq; in singulis dimidio: ut si cera uncias octo cōpleat, oleum duodecim, hoc est integrā libram pēdeat. Esto autem id sabino simile, essentiae tenuioris, minimeq; astringens: si uetus sit, præstat. Crudū uerò, & quod ex oleæ surculis confectum est, nequaquā conuenit. Cæterum omnibus medicamentis cōmemoratis, ubi metallica ex aceto pluribus diebus in mortario trita fuerint, thus candidissimum & pingue admiscetur: deinde rursus unā cū metallicis diebus aliquot læuigetur, priusquam ceratum eis temperes. Quanta uerò ex omnibus metallicis copia colligitur, huius partē dimidiam thus cōtineat: si mollius medicamentum facere postulas, amplius quā dimidiā: sicut ubi acrius expetis, minus dimidio adiūgas. At uerò ceræ cum oleo liquatæ resinam quandam misceas licet, sciens acrius ipsum adiecta strobilina fieri: mollius terebinthina, mediū utriusq; abietina. Ex harū genere larix quoq; est, prædictis planè humior: substātia uerò similis li

lis liquida picea, quam loco terebinthinæ institores uendunt ignorantibus eas discernere : est autem talis odore, gustu, & facultate quam terebinthina acrior : cum hac igitur & terebinthina larix persimilem potentiam obtinet, sed tenuiori substantia, maioreq; discutiendi uirtute prædita est. Miscebis igitur ceræ sextam superiorū resinarum partem uolens medicamentum emplastri figuram induere. Nam uni ceræ pondo resinæ uncias duas adicies : sin autem liquida insigniter fuerit, uel unam tantum miscere satis est. Attamen si ut emplaston pharvacum fiat nihil curas, resinam addere non admodum opus est : galbani uerò æquale thuri pondus indes, ubi mitissimum reddere statuis : dum ualentius, dimidium : quando ipsorum medium, id quod inter æquale & dimidium est. Verbi gratia, si quatuor thuris denarij fuerint, duas galbani impones, ualidum permanere medicamentum postulans : nute quatuor, medium tres. Vt enim molle & anodynon quippiam habet, ita quoque σμητικόν, hoc est exedens : quod sanè plurimis mollientibus accidit. Quare cum neruo denudato pharvacum adhibes, non adeo galbanum esse commixtum oportet. Quod si nudus ille non est, haud mediocriter ipsius temperatura dolore auferendo conuenit : ideoq; tale etiam medicamentum acuto sensu præditis, teneris & cachochymis paratum habere expedit, in quo plus galbani adiectum sit. Omnia siquidem metallica aspera sunt, doloremq; concitant, ex liquidis acetum : unde merito ex illis confecta pharvacula aspera uidentur, & dolorifica : ob quam rem fœtus ex oleo & galbani mustura similiter ipsis idonea est : nihil  
autem

autem minus tenuium partium adeps galbano lenis est. Quare uelim aliud quoque medicamen ex his præparatum habere, quod ex metallicis composito temperare poteris, tum in dictis corporibus, tum in his quæ asperum & dolorificum quandoque medicamentum percipiunt: deligendus autem adeps, qui tenuioris essentiae existat, cuiusmodi sunt agrestium animantium, maxime leonis, pardī, apri, & ursi: ad hæc uolatilium, maxime anserū: horum inopia agrestium gallorum gallinarumq; ita uero anserum quoque syluestrium. Nam animalium, quæ in urbibus aluntur, & tanquam in ocio conclusa sunt, humidior est adeps & crassior. Quando pharmaci substantia cerati spissitudinē habebit, ceræ tertia uel quarta pars admisceatur: uel si adeps humidus nimium esse tibi uideatur, licet & ceræ dinudiam adijcere: quemadmodum ubi sicca fuerit, quartam: cum mediocriter habet, tertiam. Quod iam ceratum multis utile futurum est, ὡς τεύχεον, id est, ex seuis nominetur.

De medicamento δι' εὐφορβίου.

Dictum mihi est & antea, uetus euphorbium recenti multo inferius: si igitur anniculum sit, etiam cyrenæo magis liquore excalfacit: præsertim eo, quem nunc habemus: ex quo per aquæ irrigationem stirpes augent, & ad liquoris copiam generandam conficiunt. Nam post annum unum abunde calidum est: deficit autem non mediocriter à recenti: bimum adhuc magis à nouo degenerat, quemadmodum trium aut quatuor annorum etiam hoc magis. Vetustioris uirtus omnino resoluitur. Cognosces autem, ut dixi, quam ætatem, quamq;

uim obtineat, & colorem, & substantiam eius respiciēs. Colore quidem uetus nouo flauidius, pallidiusq; apparet: substantia durius & siccus. Iam si gustu uoles discernere, non coniecturalem eius dinotionem, sed firmā habiturus es. Quod uerò dixi calfactoriam unctionem ex eo me confecisse, exactissimè pharmaci facultatem tibi indicabit. Constat hac temperatura: Vna pars est euphorbij, tres ceræ, olei duodecim: ceram quidem euphorbij triplicatam, oleum uerò ipsius ceræ quadruplum esse conuenit. Vbi igitur in hunc modum medicamentū composueris, fricata quadam eius parte manifestò licet dinoscere, quantam uirtutem obtineat, maxime autem in balneo innotescit. Siquidem ab aëre moderatur, sed magis adhuc ualidè ab aqua, cum euphorbium sit calidum, recens, & forte. Tale igitur consecutus, & hanc ipsam cōmemoratam unctionem audacter pūcturis imponito, ubi oras hiare metus est. Si imbecillius fuerit, auge mensurā euphorbij pro imbecillitatis ratione, interim partem dimidiam iniiciens, interim duas nonnunquam pares ceræ, & plures, si uetus numium extiterit. Primus sanè usus in puncto neruo, uel tendone, ad secundum te deducet. Si nanq; uulneratus ipse erosionem sensisse dicat, tibiq; partes puncturam ambientes calidæ appareāt, tum ipsa punctura magis ac par est elata, & oræ inflammatione nonnulla afficiantur, uel olei copiosioris mīstura uim medicamenti remittes, uel compones aliud ad priorem temperaturam, aut euphorbio uetustiore moderatum ita efficies. Quòd si è contrario quàm dixi, eueniat, uirtutem pharmaci adaugebis. Si mediocriter omnia habere uidebuntur,

buntur, seruabis. Itaq; confectura ceram euphorbij triplicatam continens, aliarum est ualentissima: cum illud (quemadmodum diximus) recens additur: quincuplam habens, inualidissima: quadruplam capiens, medio inter utrasque ordine consistit: at si unguenta proponis efficere, qualia à medicis ἀκοπα nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscebis. Si uerò, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum: quando cera & sicca & pinguitudinis expers fuerit, duplo etiam amplius: plerumque uerò sufficit unius partis dimidium duplo appondere, ut tota ceræ mensura duarum pondo partium & s. fiat. Atqui emplaston medicamen cupiens componere, oleum pari mensura ceræ miscebis, si quidem ambiens fuerit calore temperatus: si cera uetus & arida, & illud frigidum est, paulò amplius: sicut cum cera est pinguis, ambiens calidum, paulò minus. Id autem minus duodecima in utriusque medij portio est: etenim & undecim, & tredecim nonnunquam olei uncias ceræ libræ temperaui, pro eius consistentiæ quantitate, tum aëris circumflui caloris frigorisq;: rarò autem paulò plus, uel minus: uerum ut deligari posset, pinguitudinem uiscositatemq; haberet, nec friabile esset, aut facillè solueretur, aut à cute decideret, adiunxi resinam ei, potissimum, si aderat, terebinthinam ueram: sin minus, paratissimam ubiq;: quam frictam & colophoniam appellant, eamq; pari cum cera pondere: conseruat enim medicamentis, quibus iniecta est, priorem consistentiam, ubi & ipsa mediocriter habeat: quippe notum est, ut in omnibus alijs, sic in resina quoque, maioris minorisq; rationem consistere. Itaque

si pinguior, liquidiorq; nonnunquam appareat, sciendum est, ceratum quod ex cera cum oleo liquata proueniet, liquidius multo quam erat euasurum. Summatim, in neruorum uulneribus, cum interim ab exacta mediaq; medicamentorum emplasti modo confectorum substantia errauerit, ad molliorem potius tendere, etiam si inquinaturum sit: simili ratione & quod substantia mediocri est. Pix autem cerati consistentiam seruat; optima uerò, si cut dictum est, in talem musturam pinguis conuenit, quæ admodum & resina. Si liquidam resinam iniicias, quali substantia est terebinthina, tertiam ipsius partem ceræ esse oportet. Atque ipsa terebinthina recens ueteri longe est liquidior. Cogitate igitur, quod de cera & resina audiuiſtis, id in omnibus obseruandum esse: nec enim ex siccis, & aridis, uel tempore, uel ex primaria natura, uerum ex mediocribus consistentia, tantum cuiusq; nascendum est in medicamentorum compositione, quantum à me scriptum inueniatur. Fingamus iam, quod uim & substantiam prædicti medicamenti mediocrem habeat, ceræ, resinæ frictæ, & olei pares portiones continere, ipsius euphorbij sextam: ut singulorum sit libra, euphorbij uncia duæ. Quod si mollius reddere uoluerimus, octauam euphorbij partem iniicere sufficit, hoc est unciam s. in recente & calidissimo, uelut præcensui, euphorbio temperatura hac definita: nam si uetustius sit, eoq; imbecillius, copiosius hoc aliorum portione esse debere, prius indicauimus. At si non resinam duntaxat, imò etiā picem iniicere est animus, selibram utriusq; miscebimus, ut modus ceræ sit æqualis: quanquam multo præstat me-

dica

dicamentum, si resinae picisq; loco propolim ceræ parē adiungas. Quod si ipsa pinguitudinem non habeat, simūliter resinis, si adhærēs pharmacum, ut fascijs ligari non opus sit, esse curemus, terebinthinam, uel laricem nominatam, uel etiam syncomūsten pineam indemus: uoco syncomūsten, quam ex fōdinis & figulinis accipiunt, ligna multa, ac lapidosa corpora in se habentem: quæ liquata, dum percolatur, pura tunc sicut colophoniam & frictē dicta redditur: quin & resinas αὐτῶν τοῦ quasi spōte fluē De resinis. entes admiscere licet, nominant ipsas in Lacedæmone, ac plerisq; alijs regionibus πρῶτον τοῦ: in Cilicia uerò nuncupant talem capnæleon, omnibus resinis tum liquidiorem, tum calidiorem, tum substantia tenuiore præditam: quare potentiæ medicamenti, quod componis conferet, tum maximè iniicienda, cum euphorbium roboris expers fuerit. Porro inter alias resinas odoratior est, sicut terebinthina, & abietina: ostendimus antea terebinthina abietinam esse calidiore, hac strobilinam. Differt autem strobilinum physema, & pityinum, siccum, pinguedinis expers, arescēs utrunq; celeriter, ut in pila contundatur, & cribro secernatur, quale ad propositi medicamenti compositionem neutiquam conuenit: usus tamen sum frequentissime, cum euphorbium anniculum existeret. Porro dum componitur, olei, ceræ, resinae frictæ, singulorum pondo libram misceo, picis pinguis sex libram: & his liquefactis, euphorby pōdo uncias duas: si imbecillius sit, tres: si terebinthinam ceræ adijcere uoles, unam: mediocrem pharmaci consistentiam facies, si cera terebinthinam liquidam & recentem triplo sua

peret: huius exiccatae temporis spacio dimidium pondus oleo tribues. Totum autem ex tribus mixtum, oleo, inquam, cera & terebinthina, cum sit, libræ unius semissis, euphorbij anniculi unciam unam accipiet: si tale non extiterit, unam semissem: unde, sicut iam subinde dictitauimus, euphorbium pro temporis ratione augere nobis est integrum. Quinetiam si uulneri impositum phar-macum primo usu uidetur imbecillius, euphorbium oleo leuigatum, medicamuni emplastro, manibus antè subacto licet admiscere: sic enim nobis facientibus, promptè unitatem accipit. Cæterum iuxta primam pharmaci compositionem satius est ceratum rasum seorsim ubi præparaueris ita leui facto euphorbio cū oleo admiscere. Quippe ijs, quæ liquata sunt, ipsis superfusis in mortario, plerunque fiunt encerides, præsertim ambiente frigido. Aquam uerò ceræ liquefactæ cum resina cōmittere non est necessarium: sicut ego ab initio factitabam, tantum ei temperans, quantum in ipsa coctione consumendum erat.

### Medicamentum ex liquabilibus confectum.

**L**iquabilia uoco medicamenta, quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, & uino constant: ex aceto itaque citra ignem liquefcit gutta ammoniaci, sagapeni liquor, & panacis, quem appellatione composita opopanacem uocant. Igni uerò liquefcunt propolis, cera, resina, ladanum, seuum, galbanum, quæ in duplici uase colliquare melius est. Nominamus autem sic, cum in cacabo, qui aquam calidam habeat (prunis enim incumbit) uas alterum consistit, præ-  
ter



ter liquabilia etiam galbanum continens . Habeto autem tale quoddam medicamentum saltem unum , etsi duo habere præstaret : inter quæ ualidius erit huiusmodi : Opopanacem ex aceto dissolutum diutius conterito, postea liquefacto super igne propolim, galbanum, resinam terebinthinam misceto : singulorum itaque pars una esto, propoleos recentis pinguisq; sex : si uerò sicca uetusq; contigerit, præstat omnino ea non uti . At si aliam non habes, duas portiones , non unam miscebis : sin absit propolis, eius loco picem pinguem, qualis est brusia, & quæ ex regionibus circa Pontum asportatur : pinguis simul & odorata, quam in nigrum amaracinum iniiciūt, quale prius totum conficiebatur : nunc etenim subalbidum amaracinum componunt : quo si careas, alia utitor, terebinthina, sicut prædiximus, duplicata . Ego nonnunquā uel solum medicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo etiam ad canum morsus utimur : hoc nanque solam picem pinguem ex aceto acri coctam huiusmodi symmetria continet : sextarium unum Romanum aceti, libram unam picis, opopanacis trientem, quod est uncias tres . Hoc pharmacum ulcus ex rabiosi morsu cicatricem ducere non sinit, sed punctis in neruosa quadam particula idoneum est : quippe quod puncturæ oras conuiuere nequaquam permittat . Quoniam uerò durum est, in duris solum corporibus eo utemur, qualia sunt aurigarum, & messorum . Sin autem puero, uel muliere, uel molliore corpore puncto , hoc tantum quispiam uestriūm præsens habeat , idem cum unguento aliquando discussorio, amaracino maximè & opobalsamo, colliquare licet, dea

inde cum irino & comageno : hæc si non adsint , leucino, susino, & cyprino : his quoque desideratis, oleo ueteri liquefaciat : & si in Alexandria degat , ricinino & raphanino : hæc siquidem copiosissima in illa ciuitate habentur , sicut etiam in uniuersa Aegypto . Atqui in illis regionibus sinapinū oleum haud facile reperiri potest : cuius & ipsius parte mixta pharmacum longè acerrimū fore , nemo ambigit : ut ad puncturas conuiuentes aperriendas conducat. Patere autē cuilibet arbitror ex prædictis, si loco opopanax sagapeno prius in pila ex aceto trito liquefactam resinam, propolim & adipē quampiam acriorem adijcias, eiusdem generis medicamen futurum : alterum uerò mollius est genus pharmacorum liquabilium, sed acetum non habet, quod propoli & seuis tantum præparatur, cera quoque propter spissitudinem adiecta, ex cuius mistura pharmacum tactui blandius redditur. Adeps tenuium partium acrisq; esto, sicut leoninus & pardalinus, hyenæ & ursi. Sed de anserino quid attinet dicere , præsertim cum anseres rusticæ fuerint? Quin & tauri uetustus adeps & hircinus huc conuenit: nam mustæ naturæ tum facultatis adipēs temporis intervallo ( quia terrestres acresq; sunt ) in maiorem acrimoniam declinant, similiter uidelicet plurimis quæ uetustescunt : sic nanque & ipse porcinus adeps omnium cum sit molliissimus, temporis processu acrimoniam acquirit. Idem uino, aceto, & melli accidit: in horum genere sunt etiam medullæ: longe uerò præstat ceruina, & uitulina: coagulum his acrius, & iam uehementioris pharmacorū generis propemodum existit. Itaque & huiusmodi ali-

quod

quod pharmacum habere uos consulo, ut cū à forti quodam medicamento supra modum morsam partem offendas, oleo prius eam sotam huiusmodi quodam contegamus: sic nanque placata rursus ad acrem curadi modum redire poteris. Ego itaque dum partem in neruo uulneratam quandoque soluissem, uulnus irritatum contemplatus, pharmaco liquido fortè fortuna presenti, quod ex adipe constat, ad aures inscriptum, eoq; in uase duplici calfacto illeui, ac subitò inde auxilium egrotanti accedere percepi: quippe statim omnis dolor quieuit, ac deinde uulnus soluenti secundum naturam habere uisus est.

De pharmaco ex columbarum stercore  
confecto.

Columbarum in turribus rusticorum agentium ster= cus acre est, quo interim ruri usus sum in adolescen= te nerui uulnere affecto: atque hoc agricola cum uidisset, loci consideratione (erat enim non imprudens) inu= tatus semper usurpat, & neruis uulneratis medetur. Por= rò compositio, tum usus idem omni medicamini ex eu= phorbio, & alijs qui similem confecturam habent: sed euphorbij loco stercore indito. Verum sterCUS hoc sub= tilitate euphorbio cedit, eoq; duris corporibus ex usu est. Temperaui aliquando ipsum metallicis simul, expe= riundi gratia, statim à principio cum eis terens ex aceto ad solem, sicut nuper docui, inultoq; acrius medi= camentum euasit, quemadmodum & cum æruginem uiuam ac= ceperit.

Aliud est

Aëtuario

De pharmaco  $\alpha\lambda\gamma$  βοτανῶν, id est, ex herbis  
composito. $\alpha\lambda\gamma$  βοτανῶν.

**I**nsuper ex subtilibus herbis ad neruos uulneratos me-  
dicamentum composui : initio quidem ex dictamno,  
amaraco & malo terræ, id est, aristolochia tantum, po-  
stea uerò ex alijs, mei ipsius periculum faciens, an rectè  
compositionem ipsorum coniectura assequeretur : atque  
omnia, quò uolebam, perduxi. Idoneæ uerò ad id herbæ  
amaritudinem sine astrictione gustu referant, uel acro-  
rem, non tamen immodicum : tales sunt præter prædi-  
ctas, maron, amaracum, polium, argemone, chamæpitys,  
centaurium, quæq; eius notæ in simplicium medicamen-  
torum doctrina commemoratæ sunt : quemadmodum e-  
tiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, ficus  
agrestis, bryoniæ, althææ, iridis, acori, mei, asari, phou,  
gentianæ, & panacis. Omnium siquidem id genus mate-  
riam in simplicium pharmacorum commentarijs expo-  
sui : at radices, herbasq; totas non modò intelligere oportet,  
sed etiam accuratè contusas tenuibus cribris secerne-  
re, imò etiam denuò exactè læuigare, ut arida collyria us-  
que in puluerem redigantur : nam crassa essentia neruos  
uulneratos nihil iuuat, qui subtilia, ut diximus, pharma-  
ca requirunt. Cæterum percolatum medicamen, læuiga-  
tumq; cerati modo excipiat, ea temperatura, quæ in eu-  
phorbio prius indicata est. Quantum enim in illo binuli  
euphorby, tantum ijs dictamni, mei, & acori iniiciendum  
est, tum quæ his similiter calida gustu percipiuntur : quan-  
tum uerò illis trinuli, tantum ijs aristolochiæ, iridis, dra-  
cunculi, gentianæ, aliorumq; id genus, quæ perinde ac il-

la ama

*la amara sunt, immitemus.*

De pharmacorum confecturis, quas Græci  
 πολυτελῆς, hoc est, sumptuosas vocāt, ad  
 neruos vulneratos.

**N**on abs re fuerit, etiam eiusmodi pharmaca cogno-  
 scere: usus enim ipsorum quandoq; sed rarius in-  
 cidit, quemadmodum simplicium frequenter. Vbi enim  
 quispiam pharmacorum medicorumq; studiosus, nō plu-  
 ra quingentis myriadibus haberet, nullo simplici puta-  
 bat uti: multo magis uel diues aliquis, uel monarcha,  
 odoratum simul & quod multa constet pecunia, uolet  
 habere pharmacum. Porro diuitis, quem citavi in primo  
 de pulsū prænotione, suppresso nomine memini, quem-  
 admodum & nunc: qualis autem erat, ex duabus ipsius  
 actionibus eiusmodi condisces. Vlcus famuli malignum  
 ipse sanare conabatur: ubi autem nihil promoueret, mi-  
 hi hominem tradidit: ac cum uideret curatum, medica-  
 menti scripturam postulabat, nesciens multas quidem ma-  
 lignorum ulcerum esse differentias, multas item medica-  
 mentorum, sed arbitratus unum pharmacum omnibus  
 posse mederi. Cum igitur qui offerebat, neque artificio-  
 se ipso uteretur, postquam audiuit, quibus constaret, es-  
 sentq; omnia uilis precij, hoc, inquit, mendicis serua, me  
 autem sumptuosius aliquod doceto: quinetiam puello diu  
 ex auribus laborante, ubi ipse multis, quibus usus erat  
 medicaminibus citra methodū, nihil attulisset præsidij,  
 nobis illum quoq; curandum adduci præcepit: posteaq;  
 audiens ex quodam sibi obuiio puerum sanatum, non po-  
 stula

stulauit pharmaci scripturâ accipere. Hic igitur ipse con-  
 templatus, multis, quibus nerui uulnerati erant, digitos  
 & abscissos, & putrefactos: quosdam uerò perijsse,  
 uel mancos redditos: deinde intelligens nullum ex eis,  
 qui à me curati essent, periclitatum, omnes uerò celeriter  
 sanos euasisse, pharmacum cupiebat aliquod à me acci-  
 pere odoratum simul & sumptuosum, quo neruorum  
 uulnera posset sanare. Ego sanè multas iam sæpe tum fa-  
 miliaribus, tum amicis medicis scripturas iuxta prædi-  
 ctam methodum ex tempore compositas tradideram, ut  
 experimentis compositionis ipsorum ratio confirmare-  
 tur: sumptuosum uerò, cuiusmodi ille uolebat, pauper-  
 culis hominibus nullum utiq; dedi, ratus melius esse re-  
 media ex paratu facillimis componi. Cum igitur diues il-  
 le odori sumptuosiq; medicaminis compositionem ali-  
 quâ accipere petiisset, plures ei scripturas donaui prædi-  
 ctâ methodo factas: quas cum experiri festinaret, tum li-  
 beris, tum seruis neruis uulneratos sibi conquirere in-  
 iunxit: medicamentis autem supra omnem spem opera-  
 tis, primum sanè me laudauit, ut qui citra inuidiam scri-  
 pturas ei communicauerim, postea etiam donis profecu-  
 tus est: etenim ad huiusmodi officia promptus erat. Por-  
 rò medicaminum, quæ ei dederam, confectura est talis:  
 Cinamomi, dictamni, mari, singulorum denarium pōdo  
 quadraginta: hæc nanque odorata sunt, & subtilia: at  
 amaracum quasi non boni odoris nequaquam nuscere co-  
 gitauit: deinde quoniam Romæ ægrè poterat inueniri,  
 sicut & marum, uidebam autem illum ægrè parabilibus  
 gaudere, quemadmodum & sumptuosis, apposui scri-  
 pturæ

pturæ etiam illius pauxillum quiddam partis unius, ut puto, quartam uel quintam portiunculam: hæc contusa, cribroq; subtili secreta temperare iussi, cerato ex opobalsamo optimo, & cera tyrrhenica facto: temperatum uero esse coniecturaui, si ceræ partes octo, opobalsami decem receperit: at ne friabile medicamentum foret, sed si bi cohærens unitumq; , etiam resinæ terebinthinæ, quæ & ipsa odorata, modò sit optima, partem unam adieci. Verum si generosius, ut dixi, medicamentum facere proponas, non unam cuiusque herbæ commemoratæ partem immittas, sed amplius, ut una & semissis fiat. Hoc igitur ab experientia probatum est medicamen: alterũ ex eodem cerato, & liquore ciryneo compositũ, mĩstura proportionẽ euphorbij facta, tertiumq; aliud ex utrisque temperatis confectum: quartũ deinde, quod staeten myrrham accepit: in quibus autem neruus nudus est, ibi ceratum ex cera, quæ uocatur *μυρτίνη*, & unguentis apud Romanos dictis spicato & phuliato cõposui: duodecimam partem pompholygis ei admiscens, siue eloti masculino genere, siue elotæ fœminino malis dicere: nihil enim, quomodocunque dicas, uel præsidij, uel nocu-  
menti pharmaco adferes: licet autem & ex tyrrhenica cera ipsum præparare: nec prohibet quicquã, sine prædictis unguentis tyrrhenicam ceram ex nardo usto lique facere, in duplici nẽpe uasculo, quod in omnibus unguentis commune est: at raso cerato spicæ nardi, amomi, folij malabathri, & põpholygis eloti pares singulorum portiones miscebis. Etenim in puncturis, sicut præceptum est, acriora pharmaca prosunt, quæ uulnus apertũ per-  
seruent:

*seruent: denudatis autem mediocri astrictione, cum dige-  
rendi uirtute absque morsu prædita offerre conuenit.  
Quanquam & amomum astrictiõis sit particeps, magis  
autem ipso nardi spica & malabathri folium.*

# E quarto libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

#### KATA GENH.



**P**RIMVS sanè liber in alborũ  
emplastrorũ confecturis, alysq;  
tum eorum quæ ulceribus cicatri-  
cem ægrè ducẽtibz conueniunt,  
finitus est: ubi distinximus com-  
muniter appellata dyssepulota, id  
est cicatricem difficulter admit-  
tentia, ab ijs quæ propriè cacoëthe, hoc est maligna di-  
cuntur, & ipsa nimirũ dyssepulota. Quoniam uerò quæ-  
dam saniei humorumq; ulceratis partibus influentiũ ui-  
tio cicatricem ægrè admittunt, quædam ipsa affecta sede  
influentem succum quamlibet probum corrumpente, se-  
cũda ratione ulcera dyssepulota & cacoëthe propriè no-  
minant: in quibus interim totam partem affectam excin-  
dere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis  
crustam inducentibus, aut igne utentes. At cum ampla sit  
latitudo utrinque in eo, quod alterum altero magis mi-  
núsue



nusue dysepulotum, malignumq; est, tantū medicantium pharmacorum esse numerum oportet, quantus ipsorum quoque ulcerū extiterit. Merito igitur omnes, qui unum duntaxat medicamentum ulceribus malignis cicatricem inducere promittens habēt, successu crebrō frustrantur. Nam duo (minumum) quæ idem pollicentur, eandemq; facultatem ostendunt, diuersa alioqui inter se, non simpliciter maioris minorisq;, uerū ut apertissimē dicam, maximi ac minimi ratione in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus uitia curare proposuerit. Quemadmodum commentario Therapeutices in uniuersis affectibus primam omnium communem auxiliorum potentiam inueniri docebamus, de in materias, quibus illa cōtinetur: ita nunc quoq; in ulceribus dysepulotis generalem pharmacorum, quibus illa curabūtur, facultatem, quæ tandem sit, uel prius inuentam esse oportet. Indicata mihi est & hæc in illo opere, cum quidē nullus uitiosus habitus uulneratas partes instat, duos scopos habens: unum, ut id quod influit, repellat: alterum, ut quod affectæ parti inhaeret, infixumq; est, discutiat. Atq; hæc contrariæ uires præstant: siquidem influxum reprimunt, quæ sunt astringentia pharmaca: digerunt impacta iam exceptaq; trahendi potestate prædita. Porro quæ astringunt ut plurimum exasperāt, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uerō, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis necessario sequitur, ulceratam partem erodens: atq; sic propter dolorem, quam exasperantia erodiētiaq; concitant, humores ulceratis partibus influentes irritari contingit:  
unde

unde quoq; ulcus phlegmone obsideri exediq;. Ex quibus dictis colligitur, ulceribus dysepulotis præsidia inueniri non posse, multò minus adhuc malignis. Quare talis pharmacorum materia, quoad eius fieri possit, inuenienda est, unde ulcus citra dolorem siccescat: quod accurate fieri nulla ratione licet, medico ignorante, quem affectum medicamen exhibitum ostenderit. Quippe ex ambobus compositum, erodente puta & astringente, necessario ualidum existit. Verùm sordes & humiditatis copia id genus ulceribus incumbens, ueluti propugnacula quædam ulceratis particulis facta rosionem ualentibus pharmacis adimunt soluuntq;. Itaque attendendum est, quantum primus usus humiditatis in ulcere desiccauerit: uel si etiam sordes habeat, quantum inde absterferit. Ac ita secundum, tertiumq; uti illo debemus, donec purum & siccum ulcus apparuerit. Vbi uerò id tale conspexeris, ad aliud medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius. Nam ualidiora, dum mordendo ulcus dolorem inferunt, fluores mouent, & phlegmonas concitant. Quòd si rursum aliquod multò imbecillius priore pharmacum adhibeas, ulcus humidum, sordidumq; cuadet. Hac igitur parte artificio utens medicus, eo qui experimento innititur melior est, quòd sciat ulcus non alia medicamentorum uirtute curari, quàm dum affecta pars eam siccitatem consequatur, quam in naturali statu sita possidebat. Quod factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat. Hanc dispositionem ulcera nanciscentur, quo dixi modo siccescentia, hoc est astricta, discussaq;: dein ubi  
sicca

sicca quidem fuerint, uerùm sordida adhuc appareant, deterforijs pharmacis repurgantur, quæ & ipsa in opere de simplicibus medicamentis commemorauimus, in quo prius exercitatum esse conuenit, qui hinc omnino frugem reportaturus est. Hoc uobis amici, quibus ista scribuntur, constare manifestò admodum noui: itidem rationem sine operum exploratione probabilem non esse, dicta iam mihi demonstrant. Etenim uidistis subinde medicos quosdam, illis ipsis pharmacis sine uia ac ratione usos, nihil promouisse: me uerò multa eius generis ulcera persanasse. Quamobrem in memoriam reducite medicamenta citra demorsum exiccantia: qualia sunt per multa metallica. Atqui hoc etiam memuneritis, quòd combustis elotisq; erosio, quæ prius absuit, edomatur ac interit. His igitur impræsentiarum uti uobis licet: elotis quidem in pueris, eunuchis, mulieribus, & qui molli natura a carne sunt præditi: item qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & uitioso succo laborant. In alijs corporibus etiam illa usurpare potueritis, mane primum ipsa partibus, quæ curantur, probè diffatis adhibentes. Si uerò corpus totum præparationem quandam requirat, & hanc prius factam esse oportuit, præcipimus de his in commentario de morbis curandis. Nonnullis siquidem uel purgatio sola sufficit, quibusdã sanguinis detractio, alijs utraque hæc adhibere profuerit. Sunt in quibus superiacentem uaricem excindere satis est: uel lien, uel iocineri prospicere: aliquibus ambiētes ulcus partes præscindere: quemadmodum interim labrorum callos amputare. Si horum quid experiri oportet, humoris copia si-

Q

mul cum sordibus inspicienda est : atque ita ad idoneum medicamen uenienus, rursus simplicium memores, quæ desiccant, non tamen ulceris sordes abstergunt: item quæ abstergunt quidem, non tamen probè desiccant. Porro quæ utrunque possunt efficere, prospiciemus ex quoto quodq; ordine existat, quod maximum inter ea censeo, quæ ad curationem pertinent, neglectum tamen medicinalis materiæ scriptoribus. Nam hi solas uniuersales ipsius uires dicere studuerunt: sicut etiam Dioscorides, quem nulli eorum qui in eadem quasi arena desudarunt, secundum esse quisquam dixerit. Ego igitur deinceps omnia pharmaca recensebo, quæ ulcera citra demorsum & manifestam exasperationem exiccare possunt. Incipiam à metallicis, quibus etiam terræ species adnumerantur. Porro cum uariè inter se differant, in eo quod magis minusq; siccent, à medijs orsus ad uehemētia, uel obscurius exiccantia me conseram. Siccant igitur modicè lemnia sphragis, & cadmia, præsertim quæ sua sponte nascitur, præter quod in torrentibus aut riuus queritur, ac in Cypriorum montibus, alijsq; locis inuenitur, maxime ubi metalla sunt. Consueui eam magis siccantem reddere per æstatem in sole, pluribus deinceps diebus terens ex aceto, aut uino colore giluo, substantia pellucido. Cuiusmodi est in Italia Falernum, in Asia Tmolites, quod multo maxime siccare natum est. Hoc genere comprehenditur & Ariusium in Chio natum: item odoratū Lesbium in Ereſso & Mithymna. His succedunt omnia uetera, cum ex albis & astringētibus inueterata sunt. In Italia Signinum, Tiburtinum, & Marsum: in Sicilia uocatum

catum ab incolis Aminæum : in Asia Aphrodisieum, & Misyum. Sufficit enim mihi horum facultates uniuersales ueluti exempla exposuisse. Iam uerò cadmiani ex aceto acri, similiter multis per æstatem diebus in sole præparo, siccatamq; repono, ut ulceribus malignitatem assumentibus inspergi possit. Valentius hoc pharmacum est, chalcitis combusta eodem modo prius in puluerem redacta : post hanc ignem non experta tam ualens medicamentum est, ut crustas faciat. Lotam igitur ipsam, deinde tunsam habere satius est. Minus enim lota, quam usta desiccatur, tum lōgè melior est, minusq; mordax. Per simile medicamentum est etiam ærugo cōbusta, quæ ignē non experta est, fortissimum medicamen est, sicut chalcitis. Verū hęc nonnihil etiam astringit, & ea multo magis chalcanthum, quod inter metallica maximè siccatur. At ærugo huius potentie omnino particeps non est. Misy autem & fori chalcitidi genere cognata sunt, ex una, ut dicam, radice producta: tenuius tamen misy apparet, tum minus mordax & urens : crassius fori est, & utrisque siccatur imbecillius: quemadmodū & sibi maiorem astringendi siccandiq; uim ac fori possidet. Porro diphryges appellatum pharmacum, ulceribus ægrè humiditatis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: ualidè namque siccatur, etsi modicè mordax. Ad hęc, præter acrem tum qualitatem, tum potentiam, uim habet astringentiam: quas tamen utraq; fortiores & chalcitis cruda, & chalcanthum repræsentat: siue id masculino genere, siue fœminino, siue neutro appellasse quis malit. Nam hoc uobis interim succurrat, de nominibus contendendum non esse,

ubi speculationem ipsius artis usui necessariam ediscere statueritis. Porro alumen quodlibet ulcera satus exiccat, generose astringit: unde nemo solis his ad ulcera utetur, sicut nec cruda chalcitide, & ærugine: ista uerò & hæc & misy utilia sunt, ut elota morsum quidem remittunt, uerum minus siccant. Itaque lotis uti tutius est: quoniam permulta corpora, quibus mederi cogimur, unam quandam dispositionem habent, qua uehementem comorsum ferendo non sunt. Audiuiſtis hæc frequenter, & nunc iterum commētationis gratia in toto subsequenti sermone repetere conabor. Quæ igitur plethora uitiosoq; succo laborant corpora, ad hæc quæ tenera carne prædita, & ad sentiendum insigniter habilia sunt, facile ex morsu, seu rosione phlegmonem recipiunt. In horum numero continetur mulieres uidelicet candidæ, pueri, eunuchi, uiri cute alba: insuper qui regionem frigidam incolunt, humidi hi quoque & pituitosi, eoq; molles & albi: quemadmodum ij, qui calidum tractum inhabitant, ut Aegyptum & Arabiam, duros corporum habitus, & siccos sortiuntur. Itaque hæc ueluti in mentem reuocando, appositurus sum & aliã pharmacorum simplicium materiem, quæ malignis ulceribus curandis sit idonea. Sarcocolla igitur & ichthyocolla, his magis adhuc chrysocolla tali facultate prædita est. Huc optimè facit & plumbum combustum: post hoc sori, stibiq; eaq; combusta: insuper plumbi recrementum, Græci σκαργίαν μόλις οὐ uocant, probè siccatur: quemadmodum & ferri squama, euidentius tamen stomomatis. Porro æris squama, præter quòd siccatur, etiam abstergit purgatq;. Vnde  
pura

pura quoque ulcera efficit, quod reliquæ squammæ non possunt. Quare si hæc omnia medicamenta arida ulceribus malignis ac contumacibus inspergis, mirificè uidebis citra erosionem ea desiccari sicut ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostreorum, aliorumq; id genus adhibueris. Quin & lapis specularis, græce ὄψακίς, Romanis olim specularium dictus, ex ijs est quæ leniter ac sine morsu exiccant: qui ustus ulceribus dysepulotis, non item malignis ac rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quàm illa requirunt. Idem potest uistrum ustum, ac ignitum illud quod in uasis æreis calefactorijs adhæret. Cæterum ægyptiæ spinæ fructus, galla omphacitis, hoc est, immatura, rheon, malicorium, tum radices, tum herbæ non paucae ultra siccâdi etiam astrin-gendi potestatem habent: nam & malum terræ, iris, æcorû, arthemisia, panacis radix, argemone, chamæleon-tis nigrî radix, ciperum, dracunculus, & gladiolus affatim exiccant. His euidentius adhuc centaurium, & polium: quibus paulò imbecillior est terra nomine erythrias, uti ualentior est ampelitis. Talis sanè medicamen-torum simplicium ad ulcera maligna ac contumacia materies existit: extrinsecus autem nonnulla ipsis apponuntur, quæ quidem per se uehementis potentiæ gratia non admoueri, sed alijs temperari solent, ueluti ærugo ignem nondû experta, calx uiuâ, & illota, & molle aphronitrum, quod reuera aphronitrum est. Quanto enim spumantius, tanto præstantius est utraq; facultate, tum quòd minus mordet, tum quòd magis digerit. Didicistis enim in opere de simplici medicina, subtiliora crassioribus

hac uirtute inter omnia, quæ simili specie comprehenduntur, præcellere. Porro nihil tam nobis cuitādū est, quàm pharmaca generis oleosi, quæ Hippocrates μαλακῶδη, id est mollia nominat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resina, postea cera: alia uerò ratione & quæ indurata remolliunt, μαλακτικὰ dicuntur, non conueniunt, galbanum, bdellium, gutta ammoniaci, styrax, medullæ. Item alio modo acria, piper, zingiber, sinapi, canchri, multaq; eius generis alia.

Quomodo medicamētis ficcis modò commemoratis, in vlceribus ad cicatricem agrè venientibus & malignis, vtendum sit.

**H**uiusmodi ulcera uitioso plena humore necessario existunt: pleraq; uerò ipsorum etiam sordes copiosas sustinēt. Quoniam ergo siccum aliquod pharmacum ipsis sumus inspersuri, conuenit prius ea linteolo molli, puro & sicco exprimere: ubi ulceris cavitatem medicamento impleueris, platysma labris attenuandis accommodo datum extrinsecus superdandum est: hinc rursus linamentum undique æquale foris inyciendum, cui spongiam, ex aqua aut uino tinctam applicabimus. At permultum refferre existimabis, ut spongia frigida maneat: quod ex facili fiet, si frigida continuè citra deligaturæ solutionem foueas: sed hanc ei imponere, ac cirtundare debes, ut Hippocrates in commentario de fracturis edocuit, maximam offensam fore ratus ex deligatura, quæ ad elegantē formam, non usum conducit. Si igitur fascia una fuerit,  
*siorsum*



*sursum tendet, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus, siue manus summa, siue alia quæuis pars laborauerit. Quod si duabus uti uelis, ut in fracturis, altera à parte affecta sursum feretur, altera deorsum prius, mox in superiore parte desinet, dum ipsa priori coniungatur. Quamobrem hasce fascias ex linteis, non laceros panniculos esse, ut omnes nouistis, expedit. Tertio quoq; die, non singulis soluendum membrum est, sic ut aqua non adhibita, quo dixi modo nuper, molli, puro, & sicco linteo saniem ulceri abstergas. At si ambientes ulcus partes phlegmonodes quippiam representent, humidum medicamen latum extrinsecus platysmati superaccommodandum est ex meo phœnicino, non simpliciter liquefacto, sed cui plurimum uini astringentis adiectum sit: non tamen cum refrigerante oleo liquare ipsum conuenit: uerùm si rubor quissiam, uel omnino calor in circumpositis ulceri partibus exuperet, astringente, & refrigerante id faciendum est. Sunt huiusmodi, myrteum & melinum: si hæc non adsint, adhibeto quod omphacinum, & omotribes nominât. Si durities maior extiterit, oleo ueteri, uel ricinino ipsum phœnicinum liquefacies. Sed tutius fuerit, si nihil in ambiente ulcus loco uitiosi appareat, superpositæ regioni liquidum medicamentum ad mouere, quod repellat, si quid prius uel prauum, uel plus quàm par est, influat: maxime cum in crure ulcus obortum superpositam uenam uaricosam habeat: quæ dum magna est, ac colore nec rubrum, nec probum sanguinem, sed atriores, magisq; melancholicum continere uidetur, excitanda uenit. Interim uerò contingit, ut ue-*

na tali excisa ulcus statim ad cicatricem ueniret, etsi iam annum durarat: uerùm ipsius loco iuxta diuisionem, ubi erat excisa, ulcus malignum ac contumax oriretur, cui cicatrix induci non potuerit. Igitur in id genus uitij præstat, uiribus ægri consultis, à uenæ incisione auspiciari: deinde pharmaco purgare melancholicum humorem, & cum hoc etiam pituitosum educente: quoniam is quoque unà nonnunquam cum melancholico influit, dum uarices generantur. Postea ipsam uenam ulceri suprapositam in longum scarificare commodum est: ubi abundè uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ prius medendum: postquam exactè iam cicatricem ducere uidetur, tunc maligni ulceris curationem, ut prædictum est, aggredere. Iam uerò lien interdum malè affectus uitiosi talis humoris auctor est, sicut & iecur: quibus antea prouisis, sic tandem ad ulcus curandum uenire oportet. Pari modo si uniuersum corpus cachochymum, uel plethoricum existat, prius expurgare uacuareq; expedit, quàm medicamentum ulceri admoueas. Porro intra ulceris per arida medicamenta curationem, quotiescunq; solueris, aduertendum est, qualèmnam in particula effectum ediderint: sciendùmque, ac in memoria habendum, nonnulla desiccare, non autem detergere, cuiusmodi sunt illa, quæ astringendi qualitatem obtinent, ulcus purum non efficiunt. At quæ præterquam quòd siccant, adhuc etiam deterguunt, ea non modò siccam, sed puram quoque totam partem exulceratam efficiunt. Præterea notandum uenit, pura ulcera ab ijs medicamentis, unde prius cum essent sordida nihil rosionis percipiebant, nunc erodi,

di, morderiq; . Quæ causa est, ut à ualentioribus absterforijs pharmacis ad mitiora lenioraq; digrediamur, ubi ulcus adamuſſim purum inuenerimus. Quemadmodum rursus in sordidis ad magis abstergentia transimus, nisi ex rosione sordida apparuerint. Hoc siquidem medicis etiam bonis existimatis nonnunquam imposuit, ut ad absterforium ualentius acriusq; se conferrent: unde iterum ulcus erosum, ex æquo sordidum, uel etiã magis adhuc, altera solutione uisum fuerit, carne quæ id foedat à medicamento colliquata: nam ita in prauam saniem degenerat. Cæterum quicquid in his ipsis tenuioris substantiæ est, à pharmaco diffiatur, reliquum ibidem ulceribus infixum sordes ipsis redditur. Quare animum attendere oportet, utrum ulcus carne quæ subest exesa ac colliquescente sordidum euaserit, an quia medicamen sordidis auferendis aptum requirat, impositum uero tale non sit. Quod indicat ulceris maior facta cavititas, tum oræ rubentiores calidioresq;, cum medicamento acrimonia abstergentur. Forſan igitur superuacaneum fuerit, in præſenti commentario compositorum medicamentum usus, rationẽ, modumq; adscribere: quippe in methodo curandi explicatũ. Quæ uerò necessaria sunt, & magnam noxam adferunt neglecta, satius est bis tẽrue, ut fidelius memoriæ inhæreãt, eadem repetere. Ponamus igitur & hoc in talium ulcerum curatione, si quidem citra totius corporis offensam fieri poterit, ægrum à balneo abstinere, perfricari linteis largiter, mox oleo, deinde ferulis exerceri, si crus fuerit affectũ: uel cursu, si partes superiores malè habeant. Quod si à balneo temperare sine totius corporis noxa non po=

terit, soluere deligaturam non oportet: uerùm ut ligatum est membrum lauare, & aquam calidam ex spongia exprimere, aliamq; mox frigidam infundere, ut nullus in deligatura calor sit reliquus. Iam si curatio succedere uideatur, etiam absque spongia alligata sanari potest, si phœnicinum liquefactum, ut dixi, extrinsecus imponas, uel citra spongiam, quæ fasciis comprehensa uelut in fracturis, ægrotx corporis parti orbiculatim circumdatur.

#### Compositio emplastrodis medicamenti.

**Q**uoniam malignorū, & difficulter cicatricem recipientium ulcerum curationis summus est scopus, ut medicamentum citra morsum exiccet: aqua uerò & oleum maximè omnium humectent, ab eis abstinendum est ita, ut nec per se adhibeantur, nec alijs siccis temperentur. At cera deligēda est, neq; natura, neq; uetustate sicca, uerùm recens & pinguis: quam in sole emollitam aridis medicaminibus dictis, quibuscunq; uoles, excipere licebit: sin autem sol absit, apud ignem calefacta subigatur, & in calidam aquam demergatur. Non enim aqua per tota misceatur, sed statim ab ea emollescente defluit, antequam ulceri fuerit imposita. Symmetria uerò mordicationis est talis.

Mediocre medicamentū hoc modo efficitur.

Quarta pars metallicorum ceræ adijcitur: ualentius erit, si tertia sumatur. Porro cum ipsa metallica minus magisq; lenia siccaq; existant, uirtus in ijs que magis siccant, intendetur: quæ minus, remittetur: quemadmodum  
rursus

rursus tutior leniorum usus est, mordaciorum periculo-  
sior. Dictum nanque frequenter est, nonnullas naturas  
corporum, tum cutem, tum carnes magis sensorias habe-  
re, quibusdam has minus esse sensiles. Item pro maioris  
minorisq; sensus ratione doloris etiam affectus sequitur,  
ut & phlegmones. Accedit huc non mediocris differen-  
tia, quòd quis molli sit carne, uel duriore, boni maliq;  
succis, uel plethoricus, uel uacuis, uel medio quodam mo-  
do inter enumeratos affectus: unde colligo, unum omni-  
bus medicamentum præparari non posse: sed quaecun-  
que ex similibus specie cõfectum fuerit, hoc uti sciet ille,  
qui methodum isto libro traditam artificiosè didicerit.  
Exempli gratia in subiecta materie: si pares utriusque,  
æruginis & æris combusti partes misceas, aluminis scis  
si partis unius dimidium, ut totum tribus uel duobus de-  
narijs s, uel uncys totidem constet, sufficiet ceræ dena-  
rios adijcere denarijs: decem uerò uncias uncijs, in tem-  
perati & medijs facultate pharmaci compositionem: me-  
lius fiet, manusque mordebit, si loco aluminis scissilis di-  
phryges accipiat: cuius uno denario integro iniecto,  
erit præstantius: & si æruginem mordacius facturam  
suspicati, lene prorsus ipsum fieri postulemus, com-  
bustam apponimus. Insuper si expurgare sordes sta-  
tuerimus, æris squamæ denarij dimidium addetur, ut  
tota medicamenti temperatura talis euadat: æris, æru-  
ginis ustæ, diphrygis, singulorum partes æquales,  
hoc est, cuiusque denarij pondo unius, æris squamæ de-  
narij dimidiū. Hæc pingui cera, ut dixi, excipiantur: ubi  
siccior paulò fuerit, quam ut cõmemorata excipiat, tem-  
perat

perandum est oleum myrteum quo mollescat, uel melissum, uel lentiscinum, uel ricininum, uel cyprinum, uel omotribes uetus, uel recēs hispanum, uel quod apud nos ex oleæ surculis conficitur. Aut si omnino nihil oleosum medicamento adhibere placet, laricem resinam admisce= to : cuius si copia non est, terebinthinam in locum resti= tuito. Cæterum hoc semper in memoria tenendum est ijs, qui hæc legunt, maximè ad primum nuper dictum, tan= quam præstantissimum ueniendum esse, mox ad secun= dum & tertium, deinde ad alia, ceu pro pharmacorum uirtutis, & potentiæ portione, sermonis ordinem nobis usurpantibus.

Quæ medicamenta Crito scripserit. Medica= mentum  $\delta\lambda\gamma\lambda\alpha\delta\alpha\upsilon\tau\upsilon$ , hoc est, ex Ladano.

**O**ptimum medicamen epuloticum, quod  $\delta\lambda\gamma\lambda\alpha\delta\alpha\upsilon\tau\upsilon$  inscribitur : conuenit prætumidis ulceribus, & ca= uis : deligatum uerò membrum in diem quartum conti= nendum est : Picis aridæ denarium pondo centum, æru= ginis rasæ denarium pondo uiginti quatuor, æris com= busti denarium pondo quindecim, squamæ rubræ dena= rium pondo uiginti quatuor, ladani pōdo uncias nouem, argenteæ spumæ pondo libras tres, olei sextarium s, ui= ni optimi sextarium unum s. Hoc emplastrum præpara=

Quæ uocet ui & ego, materia, quæ nullum  $\mu\alpha\lambda\lambda\alpha\kappa\acute{o}\varsigma\delta\epsilon\tau$ , hoc est, mol  
 $\mu\alpha\lambda\lambda\alpha\kappa\acute{o}\varsigma\delta\epsilon\tau$ . le pharmacum contineret. Sic enim uocat Hippocrates omne genus medicaminum, quæ connatam humiditatem habent, qualis in pingui est, singulisq; oleosis medica= mentis, & quidem in ipso oleo & aqua. Quin & resina, ce= raq;

raq; molle quippiam occupant. In medio ipsorum, dico autem siccorum temperamento & mollium, pix consistit: eoq; ambobus generibus citra offensam admiscetur, quemadmodum tum argenti spuma, tum arida phar maca, quæ circa mediam materiæ uersantur, etiamsi non nihil ad utrumvis excessum interim declinent. Hoc genere comprehenditur pix quoque, secundum siccitatis ac humiditatis oppositionem manifestò iam à medijs recedens, secundum alteram oppositionem calefacientium & refrigerantium non item: calefacit enim modicè, atque ideo medicamentis quæ pus mouent, admiscetur. Quamobrem in proposito medicamine arida pix medijs attribuitur, atque hac magis argenti spuma, tum alia quæ sic candi uim obtinent.

#### De indicationibus ad vlcera curanda.

Osten sum est in medendi methodo, præsidia ex indicatione ab ipsis affectibus contrariæ illis temperaturæ inueniri: item à tota animantis cuiusque figura, tum à singularum rursus partium propria & simili: unde si ulcus simplex, cauum habeat quis, ab ipsis generalibus, sed quæ non mediocrem differentiam in particularium speciebus habent, curatio sumetur: atque ob id demonstrauimus ulcerum omnino simulum quædam à medicamentis, quæ ad plenum siccent, persanari, puta, radice panacis, aristolochia, acoro, iride: nonnulla à solo thure, licet hoc carnem non inducat, sed illas naturas ad suppurationem perducant, quas aristolochia carne replet. Sicut autè in corporibus curandis differentia particularis per magna

magna est, ita quoque in ulceribus : nam cauum & purum ulcus à mediocriter siccantibus curatur : sordidum uerò, & malignum, & oris prætumidis quidem, sed carne cutis fluida, ualidiſſimè siccantia requirit . In his igitur ulceribus , quoniam de ipsis uerba facimus , thus est imbecillum medicamen , ut ne pus quidem concoquere, uel mouere possit : argenti spuma hoc est ualidius , sed medijs tamen & ipsum inferius. At pix arida mediorum gregi annumeratur : quemadmodum hanc superat exiccando æs combustum, chrysocola, & diphryges . Euidenter siccant & chalcitis combusta, ærugo, musy, & æris squama : atque alio modo acerba, quæ Græci σφόδρα uocant, galla omphacitis, malicorium, alumen . Exedunt autem non usta, chalcitis, ærugo, musy, & calx . Quæ iam fortissimas facultates habet , in omnibus corporibus eandem actionem ostendere uidentur . Imbecillia manifestam differentiam indicant : insuper si mentem adhibeas , neque minus in ualentibus pharmacis magnum actionis discrimen deprehendes, quàm in mollibus & duris corporibus obeunt . Etenim mollia citius accendunt, uehementius molestant, & maiores phlegmonas concitant.

E se



# E sexto libro Caleni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

QVINTVS enim quòd particu-  
laria solum tractet omissus est.



VPERIORE commentario  
emplastra dicta Græcè *πολύχρη-*  
*στα*, quòd multis conueniant affe-  
ctibus, distinguentes, ea potissi-  
mum collegimus, quæ præter a-  
lia ipsorum pollicita etiam ulce-  
ribus ægrè ad sanitatem perue-

nientibus mederi queant: in præsentia uerò ad aliud em-  
plastrorum genus *πολύχρηστον* digrediar, quæ tum ad a-  
lia multa singulatim faciunt, tum ad particulas putrescen-  
tes, aliter affectas, quàm ulcera propriè *δυσθεράπευτα* à  
curatione difficili nuncupata. Etenim illas putrilago de-  
pascitur, eoq; turba medicorum hos affectus nomas ap-  
pellat: illa uerò uno loco sine putrilagine circumscripta  
sunt, ut *phagedenæ* dictæ, uicina quidem depascunt,  
non tamen ea putrefaciunt, febresq; inferunt, quòd ijs  
quæ depastionem cum putrilagine sustinēt accidere con-  
suevit. Summa curationis erat in prædicto ulcerum ægrè  
curabilium genere (chironia quoque uocant) medicamen-  
ta inuenire, quatenus licet rofionis expertia, ualidè autē  
exiccan

exiccantia . Porro hæc quæ nunc scribentur omnia, mor-  
dacia sunt, si quis ipsis solis , non cerato temperatis uta-  
tur . Quæ cerato nuscuntur, purgare quidem ulcus sordi-  
dum & carne replere possunt, atq; etiam duritiem quan-  
dam & tensionem discutere, non autem difficilia curare.  
Indicant ipsorum uirtutem affectus, quibus bene adhibe-  
ri credita sunt . Quod iam superius admonui, & nunc di-  
cturus sum : meminisse uidelicet oportere illorum quæ  
in opere de simplicibus medicamentis prodita sunt . In  
cuius primo libro methodum seu rationem exposui, qua  
medicaminum facultates inueniantur : tum pluribus ex-  
emplis eius exercitationem proposui : in sequentibus sin-  
gulorum nominatim mentionem feci . Nam illorum me-  
mor, ex facili rationem eorum qui hæc pharmaca à no-  
bis modò proposita composuerunt, assequeris, & uide-  
licet ipse alia conficies, quocunque tempore prius exper-  
torum inopia laboraueris : multa siquidem huiusmodi  
non paucis contingunt in itinere, cum alio, tum maxime  
nauali . Quandoquidem etiã in patria quidam manentes,  
pharmacorum structuram, unde ægros curabant, amise-  
runt, ut præ tristitia ipsi tabefacti, perierint . Optimum  
igitur medicamenta iam explorata secūdum dictam me-  
thodum usurpare : sin autem, ut dixi, nonnunquam hæc  
desideremus, habitum talem nos habere, quo similia iam  
abundè compertis, possimus componere : quemadmodum  
me sæpe agentem & in itinere & alibi uidistis . Nonnul-  
la siquidem quæ proprio Marte in huiusmodi temporum  
occasionibus condidi, postquam experiëntia probassem,  
nihilò peiora uel celebratissimis apparuerunt . Nam pri-  
mum

num ipsorum compositionem ex coniectura artificiali molimur: postea uerò cum nonnulla post experimentum probatissima uisa fuerint, nonnulla à scopo absint, denuò rursus corrigimus, & tertio nonnunquam ad perfectionem eius quod præstare uolumus, ipsa redigimus: at si ne methodo, & in prioribus, & in Therapeutices libris exposita uti prædictis rectè nemo potest: tantum abest ut similia ipsis conficiat.

Emplastra ad digerendum & extrahendum,  
quæ Græcè *ἄρροητικὰ* & *ὑποστυλτικὰ*  
nominantur.

**Q**ui compositorum medicamentum uirtutes descripserunt, emplastra quædam ab extrahendo *ὑποστυλτικὰ*, sicut alia à discutiendo *ἄρροητικὰ* nominarunt: alijs utranque extrahendi, & digerendi facultatem adesse testati sunt. Etenim uicinæ sibi uirtutes sunt, eorum quæ in alto latent, attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt etiam nonnihil planè discutiunt: & quæ discutiunt, pariter trahunt: Verùm in digerentibus medicamentis discussoria uirtus, in trahētibus attractrix præpollet. Constant itaque attractrices simplicibus pharmacis, quæ humorum superfluitates in cutem extimam posunt extrahere. Discussoriæ ex his conflantur, quæ attractum possunt digerere. Ut autem emplastrum fiat, quemadmodum suprà dictum est, huic argenti spuma, illi resina, alij cera, alij oleum, reliquo pix temperatur. quæ nec insignem digerendi potentiam, nec extrahendi continent, sicut uel propolis, uel calx, uel medulla, uel

galbanum, uel asæ petræ flos, uel spuma nitri, uel aphro-  
nitrum, uel acetum, uel lixiua stactæ, piper, sinapi &  
struthium, salesq; tum qui edi possunt, tum ammoniaci.  
Ad hæc pleraq; alia, de quorum facultate in commenta-  
rio simplicium dictum est. Nunc autem emplastra, quæ  
iam experimēto satis probata sunt, exequar: tantum ad-  
huc ipsis adijciens, quòd nonnulli etiã astringentia phar-  
maca extrahentibus miscuerunt, ueriti quod accidit, ubi  
humorum superfluitas fuerit: trahunt siquidem plus in-  
terim ac conuenit, ut non solum ex particula quæ cura-  
tur, attractionem in alto, sed etiã ex omnibus uicinis mo-  
liantur. Comprehensum est & antea, cum de sarcoticis  
ageremus, extrahentia & digerentia, uelut omnia quæ  
magis quàm oportet detergunt, sarcotica fieri cerati mi-  
stura. In quibus uirtus quidem ualida, copiosioris: in  
quibus imbecilla, paucioris. Quòd si uerò compositum  
extrahendi uel digerendi medicamentũ, astringens quo-  
que aliquid habeat, tali pharmaco ad carnem genera-  
dam, propter uim astrictoriam utendum non est, quæ ad  
uulnera glutinanda & sinus, tum ad ulcerum cicatricem  
ducendam utilis est, ad carnis productionẽ non ita. Di-  
ctum mihi est abunde iam de hoc.

Hæc in Aegyp̃tia Andromachi scribit

Galenus libro sexto.

SVbinde audiui medicamenta, quæ simul cum dige-  
rentibus etiam astringentia capiunt, tutiora fieri:  
quæ uerò sine astringentibus digerant, efficaciora qui-  
dem, sed non perinde tuta: sæpe enim fluxiones attra-  
hunt, dũ corpus quod curatur, plethoricũ est, uel prauo  
succo

succo obnoxium . Si autem uacuum corpus esset , ac superfluitatibus liberum , pröptius medicamenta , quæ discutiantur , sola sine astringentibus assumpta , ad finem peruenirët . At cum pauca id genus corpora quibus medicamenta offeruntur , reperias : securius esse uidetur , miscere etiam nonnulla repellentia . Ita sanè & emplastro digerenti , quod ex sale conficitur , quidam adiecerunt chalcanti paululum , quamuis sal ipse astringens quippiam possideat .

# E septimo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH,



**M**ALAGMATA uocant medici , quæ partes supra naturam induratas emolliunt , calido omnia tēperamēto mediocri prædita , non tamē exiccantia , quemadmodum nec manifestò humectantia . Nam cum exactè mala-

ctica medium quendam ordinem inter humectantia siccantiaq; sortiantur , indurescentium substantiæ ueluti fusionem quandam moliuntur . Nominantur autem malactica , licet in alijs paululum ad siccandi humectandiq; uirtutem inclinent , si modò subiectam partium , quas con-

tingunt, substantiam queant diffundere: quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit. Ac quod, ubi durities diffusa discussaq; fuerit, digerentium medicamentorum usus ueniat, in tertio de simplici medicina, tum in decimoquarto Therapeutices libro comprehensum est. Indurescentia igitur, quæ ex methodica, seu rationali arte non curata scirrum contrahunt, optimè curabuntur, si medicus spectet, quatum ægri corporis substantia à mediocri humiditate ac siccitate recesserit, quæ admodum si affectus ipsius incrementum inspiciat: præterea consideret, inter ipsa pharmaca alia magis, alia minus emolliere: Huc nanque spectanti primus usus emollientis medicaminis, coniecturalis quidẽ erit, sed cum artificio. At post unum aut alterũ diem siue intendere medicamenti uirtutẽ, siue remittere conueniat intelliges, ut in prioribus & medendi methodo dictum est. Quapropter medici digerẽtia pharmaca cõposuerũt, ceu scopos ambos sibi proponẽtes, tum ut partis duritiem, quæ iam in scirrum degenerat, diffunderent: tum ut per halitum digererent, non uicissim utroque utentes, quemadmodum me frequenter facere conspexistis: uerum duo ipsa composito medicamine molientes. Notum est omnibus, in mustura uel emollientia, uel digerẽtia esse copiosiora, tum maioris minorisq; rationẽ in ipsis esse nõ exiguam. Cæterum constat subinde uaria facultatibus nasceri: ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his, si probè mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca, uel certe duo temperari, ualidissimum puta totius generis & moderatissimum, ut ex ipsorum mustura conuenienti multa quæ

ta quæ intra summa contineantur medicamina efficias. Non enim pingue eandem uirtutem obtinet quam bdelium, styrax, & gutta ammoniaci : quemadmodum nec inter ipsos adipēs anserinus, & gallinaceus, uel pardi, uel leoninus, uel hyenæ, uel alterius cuiusdam animalis : Nam secundum animalis temperamentum etiam adeps calidiorum magis excalescit, sicciorum uerò euidentius siccatur. Ac uulgus medicorum nouit leoninum adipem in utroque, calefaciendo dico & digerendo, longè esse ualentissimum. Proximum locum habet pardi adeps, ut qui modicè emolliat : pari spatio ab hoc recedit adeps gallinaceus. Hi igitur omnes tenuiorum partium substantiam inter quadrupeda animantia occupant. At differentia prorsus permagna in illis est, cum suillus quidem mollissimus ac humidissimus, eoq; aliorum imbecillissimus sit, ut teneris corporibus conueniat, cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, & uiri delicatiores, in umbra, ocio, & frequentibus potabilis aquæ balneis effœminati. Caprarum uerò & bouum pingue quāto suillo est ualidius, tanto magis corporibus & natura durioribus, & inter duriora scirro opportunioribus conuenit: taurorum hircorumq; in ualidioribus, tum corporibus, tum affectibus proficit. Eadē uerò & alijs in minoris maiorisq; ratione inter se est differentia. Porro ab imbecillioribus auspicabor, si prius de duritie, ac scirri affectu quædam prælibauero : nam cum phlegmone laborantibus & indurescentibus commune sit, digitis prementibus reniti, distinguuntur affectus, doloris sensu & indolentia : hæc enim nondum utrisque communia sunt. Quemadmodum

uerò in alijs omnibus, quæ sibi mutuo possunt accidere, inest uicinitas utriusque aliquatenus particeps, ita quoque ulcerum phlegmone laborantium, cum scirris absque phlegmone, quales induratis accidunt, media quædam est dispositio, doloris quidem expers, si non digitos imprimas, dolens autem si id facias, quàm clarioris breuiorisque disciplinæ gratia, uel phlegmonem scirrosum, uel scirrum phlegmonodem dicemus, non hic tumoris magnitudini animum attendentes: Nam phlegmone & scirrus formæ affectuum, non quantitatis in altero ipsorum nomina sunt: Nam phlegmone uel propter partis inflammatae magnitudinem, uel ob tumorem præter naturam magna euadit: parua autem quum aut paruum locum possidet, aut exiguum tumorem habuerit. Dicitur nunc mihi parua phlegmones, scirrique parui curatio, sicut & magni utriusque, pro affectuum figura. Hinc enim & aliorum, quæ magna & parua dicuntur, curationis notio sumetur. Itaque magna phlegmone cataplasmatibus ac humidis quibusdam medicamentis sanatur: parua, cum scirrosa durities mixta fuerit, itidem cataplasmatibus: interim uerò medicamentis cerati modo confectis, & liquidis, insuper emollientibus emplastris: talibus autem & parua durities tollitur. Atqui in hoc quidem simplex scopus, quemadmodum & phlegmone consistente est: cum uerò durities phlegmonodes quippiam habuerit, ad composita quoque animum dirigimus.



De medicamento, quod quia liquidum est,  
 ὡσπερ Græci appellant.

**A**C ideo medicamen quodammodo compositum est,  
 ueluti & hoc quod ὡσπερ nominant, omnibus co-  
 gnitum: magnificè uerò cum ab alijs quibusdam, tum He-  
 ra commendatū. Medetur autem id particulæ parua ad-  
 huc phlegmone confluctanti, non multo post confectio-  
 nem tempore, sed protinus impositū: ubi uerò duritiem à  
 dolore alienam pars affecta acquisierit, paulò recenti ue-  
 tustius utile est: quemadmodum si phlegmonodi affectu  
 omnino sit libera, melius in ea uetustius medicamentum  
 proficit: uerū medicamenti tempus pro duritie inten-  
 tione uidelicet æqualiter augere conuenit, etsi partem ual-  
 de induratā ne uetus quidem pharmacū emollierit. Quip-  
 pe uaria hoc ὡσπερ dictum medicamentum & promit-  
 tit, & potest: quoniam materiem mistam quoq; seu uar-  
 riam obtinet: siquidē adeps suillus & cera mollientium  
 sunt imbecillima: argenti spuma uerò & cerussa nihil ha-  
 bent malacticum, quemadmodum antea didicimus. Por-  
 rò Heras, qui pharmacum hoc omnium maximè lauda-  
 uit, ex hisce ipsum ita conficit: Adipis suilli recentis cu-  
 rati pondo uncias quadragintaquatuor, ceræ pondo un-  
 cias uigintiquatuor, cerussæ pondo uncias sex, argenti  
 spumæ tantundem: quæ liquari possunt siccis superfun-  
 duntur: temporis autem spatium medicamentum consistit  
 spissaturq;. Sicut ceram & adipem suillū imbecillæ mol-  
 liendi uirtutis esse dixi, ita si oleo paxillū ceræ misceas,  
 id quod à medicis cerælum dicitur efficies. Atqui oleum  
 uidelicet esse conuenit, nec quod uocant omphacinum

& omotribes, quasi dicas, immaturum & crudum, nec  
 quod oleæ surculos in confectiōe assumpsit. Itaque tam  
 imbecillia malactica etiam paruis medicantur inflamma-  
 tionibus. His autem fortiora modicam duritiem sine phle-  
 gmone persanant: his adhuc ualidiora maiores, quemad-  
 modum & quæ duritiem in scirrum propè degeneran-  
 tem curant, efficacissima sunt, cuiusmodi est medullarum  
 genus, in maioris minorisq; ratione inter se differētium,  
 ut deinceps explicabo. Item bdellium utrunq; arabicum  
 & schythicum: insuper styraces: siquidem horum effi-  
 cacissimus est colore pallidus, qui etiam optimus in Pam-  
 philia nascitur: qui uerò hoc magis fuscus est ubiq; pro-  
 uenit, potentia multò pallidior inferior: at temporis  
 processu aureum colorem acquirit. Hoc itaque in antido-  
 tis propter caritatem utinur: ac tu propterea principi  
 quodcunque ex styrace præparans semper hoc uteris:  
 item si familiarium quis in pharmacorum sumptibus ma-  
 gnificus existat, illi quoque ex huiusmodi styrace medi-  
 canentum compones: in alys optimum ex fusco genere  
 deliges, & odore potissimum, & colore iudicium eius  
 sumens: nam niger deterior est. Cæterū his quæ indure  
 scētia ualidè emolliūt, gutta ammoniaci adscribitur, eaq;  
 magis pinguis & noua. His minus, sed tamē & ipsa effi-  
 cacia sunt, caprarū boumq; pingua: interea ipsa hirco-  
 rum ac taurorū ualidiora sunt: boū uerò & caprarū his  
 quidē imbecilliora, quanquā nec ipsa actionis sint exper-  
 tia: hædorum autē & uitulorum his ipsis adhuc imbecil-  
 liora sunt, porcillo tamen efficaciora: porrò leonūs, par-  
 di, hyenæ & anseris euidentius his digerunt, non magis  
 emol

Styracis diffe-  
 rentia, & ele-  
 ctio.

De adipibus.

emolliunt: quanto etiam subtiliorem substantiam caprino  
 & bubulo seuo habent. Cæterum gallinaceum mediam  
 intra anserinum & suillum sedem occupat: quemadmo-  
 dum & medullarum optima est uitulina: ac resinae, quæ Medullæ.  
 non acrem odorem habent, si dictorum cuiuspiam miscen-  
 tur, glutinandi uim, quæ Græcis ἰχθυόλαια dicitur, me-  
 dicamentis compositis apponūt, emolliendi uirtutem non  
 auferunt. Aptissima est quæ Chia uocatur & larix:  
 post has picea, inde abietina: strobilina uerò uehemen-  
 ter acris est, pityinea, seu pinca, quam proprie physema  
 nominant, pinguitudinis expers admodum exiccat. Has  
 igitur fugere, chia uerò & abietina uti oportet, non ipsis  
 per se, uerum cum cera & quodam alio, quod affectui  
 conducere uideatur. Cæterum pix non miscenda est, si-  
 cut nec bitumē, utpote iusto sicciora: quippe ea quæ exic-  
 cant mollientibus esse contraria: quoniam uere piceam  
 & frictam resinam, & colophoniam appellare consue-  
 uerunt, sciendum uenit, aliam quandam esse colophoniam, Colophonie  
 Chie mastiche persimilem, molliens aliquid habens, duplex nota.  
 quemadmodum illa & thus: insuper ægyptia mastiche  
 nonnihil emollit, sed maior uirtutis ipsius portio conco-  
 quit, digeritq;: item thus modicam molliendi uim obti-  
 net: uerum hoc quidem coctum ex usu est, ueluti & fœ-  
 nigræci semen: etenim & hoc probè coctum emollit, ac  
 magis adhuc pingui temperatum. At quæ citra coctionē  
 ob consistentiæ siccitatem dilui, liquari, mergiq; deside-  
 rant, oleoso quopiam indigent, cuiusmodi sunt, oleum  
 ipsum, cum nihil astrictionis habet: item balneorum  
 strigmenta, præterea quod uocatur susinum: ad hæc

multo magis commagenum : huius ordinis est butyrum, tum altheæ & fœnigræci decoctū. Porro inter tam molliā & ualidiſſimā, quod genus ſunt bdellium & ſtyrax, gutta ammoniaci idem poteſt quod & propolis : atqui hoc in bdellio diſtinguendum eſt, quod ſcythicum altero arabico multo ad hæc ſit præſtantius, præcipue nouum & molle, quod etiam pingue nominant: conſuetudo ſiqui dem hæc eſt inter recētioreſ medicos, in huiuſmodi phar macis quod mollius eſt, idem uidelicet humidius quoque appellaffe. Cæterum galbanum, & quæ opopanax dicitur, præterquam quod digerunt, etiam quid molliens occupant : opopanax autem digerendo, galbanum molliendo coquendoq; præcellit. Talis ſanè mollientiū phar macorum facultas eſt. Tu cum uel ſcriptum aliquod in libris medicamentorijs diſcutias & examines, uel ipſe componas, auditis nuper pharmacorum ſecundum maioris minorisq; rationem differentijs, intellectus item corporum affectuumq; diuerſitatibus, ualida ualidis, imbecillia imbecilibus adhibebis. At ubi poſt primam medicamenti impoſitionem denuò ipſum applicas, oleo pingui partem affectam fouere conuenit. Porro ex ijs quæ à glutinatione ἐχέκολλα nominantur, nullum auferendum eſt priuſquam ſua ſponte abſceſſus proueniant : atqui ſi laueris permittenda ſunt. Vitanda autem medicamentoſarum aquarum lauachra, præſertim quæ auripigmento ſa, aluminofa & ſulphuroſa ſunt. Hæc quidem ſufficiūt uiris cordatis ac prudentibus, tum in medicinæ operibus quodammodo exercitatis. Quoniam uerò omnes eiufmodi non ſunt, & propoſumus hoc commētario, non ut in opere

opere de morbis curandis methodum solam exponere, uerum simul cum particularium uno atq; altero exēplo pharmaca usu comperta subiungere oportet, quæ maiores nostri, in medicatoria artis parte celebres, literis mandauerunt, ad speciales mollientium pharmacorum differentias perueniemus, à molliſſimis, quæ & paruis inflā-  
mationibus medentur, exorſi. Ex compositis malaſticiſ alia quidem, ut ita dicam, imbecilliora primo ordine ſta-  
tuuntur, quædam non multo his ualidiora, ſecundo, & quædam alia tertio, ad hæc nonnulla quarto. Cæterum primi ordinis malaſticiſ ad exiguas durities, & in mol-  
libus ſeu teneris corporibus uti, ſicut prædictum eſt, ex-  
pedit: ad fortiora his corpora & affectus, ſecūdi: quem-  
admodum & tertij & quarti, pro illorum qualitate. Subſcribunt autem ſingula illorum ordinum ſeparatim.

Malaſtica, id eſt, emollientia medica-  
mina primi ordinis.

**B**utyrum uel reſina colophonia, & cera candida non  
uetuſta, ſingula pondere æqualia, inuicem liquata,  
primi ordinis malaſtica ſunt. Et liquidum medicamen,  
quod *πᾶχυρον* appellatur, eorum numero adſcribitur,  
cum recens fuerit: uetus autem maiorem digerendi uim  
repræſentat. At emolliētium imbecillimum eſt, cera cum  
butyro liquefacta, aut ex ſuſino, aut commageno. Atque  
his imbecillius eſt quod dicitur Græcè *κηραιλεον*, quaſi  
ex cera oleoq; conſectum, cum in libram olei laxantis  
nulla aſtringēdi uirtute præditi, ceræ uncias duodecim,  
uel ſedecim iniecerint. Iam ex ouis cerata facta, exiguan  
quant

quandam relaxandi potestatem possident: ualentiora his, uerum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex æsypo, resina & cera pari pondere liquefactis: Sin autem uetustiora quodammodo ipsa fuerint, olei cuiusdam laxantis, uel su lini, uel commageni, uel adipis suilli, uel gallinacei, uel anserini misturam requirunt.

### Malactica medicamenta secundi ordinis.

**Q**uemadmodum in simplicibus medicamentis facti-  
tauius, quarti ordinis homogenia pro maioris mi-  
norisq; ratione distinguentes, aliquorum ambiguum esse  
uirtutem diximus, siue ad primum ordinem, siue secun-  
dum initio ipsorum facultas locanda sit: Ita de secundo,  
tertio, & reliquis deinceps. In quibusdam uerò audacter  
pronuncians, alia in principio huius, alia in termino hu-  
ius ordinis consistere dixi: sicut nonnulla citra apposi-  
tionem uel primi, uel secundi, uel tertij, uel quarti ordi-  
nis esse retuli. Atqui multum experientie particularis  
in uarijs & corporibus, & uitijs seu affectibus huiusmo-  
di pronunciata desiderant. Quare si quis post me æquè  
studiosus, & ueritatis uehemēs amator extiterit, non te-  
mere ac subito, ubi bis terue usus expertusq; sit, ferat sen-  
tentiam: frequenter enim ex longa experientia, quemad-  
modum & ego, deprehendet uidebitq; in secundo ordi-  
ne dicta, in tertium incipientem transponi oportere, uel  
mixta in principium tertij absolute. Cum enim corpora,  
quibus medicamenta adhibentur, ipsiq; affectus non exi-  
guum differentie excessum in maioris minorisq; ratio-  
ne obtineāt, difficillimum est de omnibus eadem pronun-  
ciare.

ciare. Accedit huc, quòd ipsa simplicia medicamenta non paruo diuariant discrimine. At ego cùm in præstantissimis uirtutem pro unaquaq; specie ac genere ostenderim, si quis in deterrimo per experientiam examinationẽ molitur, examinabit quidem falso, non autẽ facultatis ipsorum ordines distinxerit. Itaque longè tutissimum est, medicaminum ipsorum inter se differentiam secundum maioris minorisq; rationem accuratè scribere, quemadmodum & in alijs feci, & nunc facturus sum. Sanè quidem emplastrũ Mnaseo auctore compositũ, rectissimè secundo malacticorum ordini adscripseris, omnibus certe qui eius memunerunt, conuenientibus, ex oleo ueteri, argenti spuma, & adipe suillo componi: in quantitate uerò singulorum discrepantibus, tum eo quòd nonnulli ex recenti adipe, quidam ex ueteri, quem iam omnes uocare solent axungiam, composuerint. In his quidem imbecillimum fiet ex argenti spuma, suillo adipe, & oleo, neutro ueteri ualidius: oleo quidem inter ea ueteri, altero autem recenti addito: his ualidius ex ambobus uetustis. Ex eo igitur quòd recens, aut uetus oleum adepsq; immittitur, quatuor differentie prodibunt: alias quidem ambobus recentibus, alias uetustis: nonnunquam oleo quidem ueteri, adipe uerò recenti: uel contrà, oleo quidem recenti, uetusto autem adipe indito. At ex trium ipsorum simplicium medicamentorum mutua temperatura alie plures differentie emanabunt: uel enim pari pondere & mensura hæc tria miscentur, ac multi affirmant, ab ipso Mnaseo confectum tribus paribus constare, uel duobus quidem paribus, tertio non pari, sed minori aut copiosiori,

fiori, uel tribus imparibus temperatis: unde clarum euadit, multas fore differentias: Copiosa siquidem argenti spuma iniecta, medicamen potestate mollius fiet: pauciore, ualidius: ac magis emolliet, si plus adipis immutamus: digeret fortius, si oleum augeamus. Præterea aliud quidem accedit copiosiore oleo imposito, quod magnā uim ad medicamen, ut magis digeret, efficiendum occupat: est autem hoc, sicut primo libro diximus, si magis incoquas. Si igitur solam argenti spumam in oleo copiosiore coquas, medicamentum euidentius exiccabit: in uberiore uerò oleo coques, ubi plus indideris, si emplastri spissitudinem habiturum sit: quòd si id non cures, sed æquali tempore tum id quod minus olei continet, tum quod plus habet incoquas, liquet potestate mollius futurum, cui oleum uberius temperatum fuerit, quemadmodum si & cruda argenti spuma oleo commixta acopo uti uelis. Quare quod iam sæpè dixi, semper ipsius meminisse uolo: non sicut quidam sententias absolute de pharmacis fecerunt, & sic nos facere: absolute dicentes, hanc medicamenti compositionem illa esse potiorem. Nam utraq; ad diuersos specie affectus componi potest: interim ad eosdem diuersis temporibus.

De relaxantibus medicamentis.

Vocantur medicamenta quædam relaxantia, Græcè χαλαστικά, familiari omnibus propè recentioribus medicis uocabulo: inde nimirum, sicut & nomen ipsum indicat, quòd tensas laxant particulas: quippe relaxari, ac intendi contraria inter se dicuntur: quimetiam Hippocrates hūc in modum scriptum reliquit: cuti duræ emolli-  
litio,



litio, intensæ relaxatio cōuenit. Si igitur propriè quis di-  
 elionibus uti uelit, nonnulla medicamina induratorum  
 corporum malactica, id est emollientia esse dicet, ea nimi-  
 rum quæ ipsorum soluant duritiem, quemadmodum &  
 relaxantia quæ tensioni medentur. Porro in phlegmo-  
 nis cutem tendi contingit, interim à subiecto tumore sym-  
 ptoma hoc capientem, interim ipsammet inflammatione  
 laborantem, non tamen phlegmones substantia partis  
 inflammatae durities est, sed è conuerso planè, sicut in li-  
 bris de ipsa ostendimus, humiditas: atqui in his quæ  
 scirro confluantur, non præpollens in affecta parte hu-  
 miditas est, uerùm durities: attamen utriusque affectus  
 similis quodammodo generatio est, & curatio: nascitur  
 enim ex confluxu humorum: curantur iisdem euacuatīs,  
 quanquam euacuationis modus in utrisque idem non est,  
 sed uti in Therapeutices commentario declaratum est,  
 in quo etiam aliorum omnium affectuum sanandi ratio-  
 nem explicuimus, inflammatis quidem particulis, tum  
 repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum  
 discussoria semper ex usu est: scirrus autem sola dis-  
 cussoria sine repellente: itaque summè indurata scirro,  
 summè insanabilia sunt. Porro dignoscere ea oportet,  
 eo nempe signo, quòd nullus affectus partibus sensus su-  
 persit: at in quibus sensus quidem est, sed obscurus, hæc  
 curantur pharmacis humorem incrassatum uidelicet di-  
 gerentibus, non tamen ualidè, ac uniuersim hoc agenti-  
 bus, sicut digerentia medicamina faciunt, cuiusmodi uo-  
 cant Græci *ὑποκαταρκτην* & *ὑποπυκνῆν*. Mirari uerò non  
 oportet, mutationē in duritiem ex inflammatis accidere,

cum

cum simul & confluens humor sit crassior & liquidus, & curatio medicamentis ualde exiccantibus administretur: quemadmodum & in exterioribus permulta corpora, quæ ipsum ignem contingunt, torrentur, ex aqua rursus emolliuntur: ita in inflammatis affecti loci humiditas, à calefacientibus & exiccantibus ualidius pharmacis, reliquum aliquid uiscosum crassumq; retinet, tenui discusso. Et hac ratione in morbis articularibus calli proueniunt, & in renum uitio calculi. Quòd si uerò fluxio quæ phlegmonem committit substantia sit tenuis, & curatio eius siccantibus & calefacientibus pharmacis adhibeatur, nihil scirrosus relinquitur: imò refrigerantia uehementer astringentiaq; scirros procreare solent: ac multos ex erysipelatis immodicè refrigeratis scirrosos humores habere conspiciamus medicorum qui eos sanandos susceperunt inscitia. Prima ergo medicaminum, quæ phlegmonis & quæ scirris medentur, differētia est prædicta: altera propter dolorem inflammantis coniunctum. quæ non sustinet ualens medicamentum affectæ particulæ offerri. Quippe hæc cum dolore actionem edunt, inflammationis ob affectum statim dolentibus, eoq; molliissima remedia desiderantibus. At uehementiora præterquam quòd dolores non soluunt, uel mitigant, adhuc etià exacuentia maiores phlegmonas concitant. Itaque primus usus in dolentibus phlegmonis est, qui medicamentis abundè humidis simul & modicè calidis administratur. Alter paulò crassioribus siccantioribusq; constat. Tertius relaxantibus nominatis, quæ nonnulli malagmatis adscribunt. Sunt autem inter ea molliissima sanè, quæ ce-

rati

rati speciem consistentia referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante componuntur. Temperatur ipsis æsopi, resinæ & picis modicum, sicut & thus, & galbanum, præterea nonnihil iris illyricæ. Porro Mene crates ut ipse ait, & alij quidam ei attestantur, medicamentum *ἑλὶ χαλῶν*, id est ex succis appellatum, phlegmonis nondum uehementer dolentibus esse remedio.

### De Acopis.

**Q**uid acopa medicamenta promittant, etiam nomen ipsorum ostendit. At copos, id est lassitudines Græci homines uocant affectus ex multo uehementiq; motu, corporibus uel totis, uel particulis amplius exercitatis oborientes. Porro molesti sunt potissimum ijs qui agitantur, mouenturq; uehementiores autem, iam & conquiescentibus negotium faceffunt. Cæterum postea medicis in usu fuit, etsi non ad lassitudines medicamen ab ipsis sit compositum, sed uel ad dolorem diuturnum in alto corporis latentem, uel motum difficilem, uel particule duritiam, uel tensionem, uel tumorem scirrosam appellare acopa, & id genus omnia, modo humidam consistentiam acopis simul habeant: quæ liquidis ceratis, cuiusmodi & in luxatis, fracturisq; utimur, est propinqua. Quippe talem consistentiam habet, humidissimum quod à iunioribus medicis ceræ oleo appellatur: deinde illius acopi: post hoc liquidorum ceratum, crassiore substantia præditum: mox ceratum tenerorum & mollium, uti uocant: postremo amolynta, hoc est non inquinantia, similia ijs quæ propriè epithemata dicuntur. His succedit emplastrorum consistentia, quæ & ipsi in maioris minorisq; ratione haud

Medicaminū  
consistentiæ  
ordo.

Ceratoma-  
lagmata.

mediocrem obtinent differentiam. Quare nonnulli medicorum quædam nomina à sola consistentia ita desumpto, ceratomalagmata nuncuparunt: medicamenta, inquam, inter ea quæ corpori imponuntur: nondum quidem humida, duritiem uerò necdum consecuta, qualem emplastra occupant. Cum igitur omnes citatæ differentie non medicamentorum uirium, sed consistentie formæ sint indices, acoporum appellatio quondam sanè medicaminum facultatem, postea consistentiâ significauit: huiusq; rei causa cum distinctionibus ea nominare coacti sunt: hoc quidè acopon relaxans, illud emolliens, uel calefaciens, uel à dolore tollendo anodynum, uel metasyncriticum appellant: sicut ad huiusmodi quendam affectum conferre: uerbi gratia, paraly sin, coxarum laterumq; dolorem: uel communiter ad uniuersos dolores. Natiuum igitur est medicamen simplex, omnium lassitudinum præsidium, oleum uidelicet, quod & citra adiectionem nominatur: quoniâ uetustis temporibus solum quoque erat: posteri cicinum apud nos ei apposuerunt. In Aegypto enim hoc simul uetustum erat: & rursus raphaninum, sinapinum, & sesaminum, tum alia eius generis, quæadmodum etiam apud nos crinum, mastichinum, & lentiscinum, quæq; his magis uaria sint, ut unguenta, propè accedant. Itaq; neminem latere arbitror, medicamenta acopa dicta, omnia liquidæ consistentie esse necessariò: quippe oleum solum lassitudines externis partibus ingruentes curat: in alto affligentes uehementioresq; temperatū alicui laxanti pharmaco, & mediocriter calefacienti, ueluti galbano, resina terebinthinæ: adhæc colophonie cuidam nominatæ & frict

Oleum simplex acopon.

Acopis quæ miscantur.



& frictæ. Quibus calidiores sunt abietina & strobili-  
 na: terebinthina uerò larix paulò calore præcellit. Cæ-  
 terum id genus omnia relaxatibus oleis miscentur, qua-  
 le est sabinum, iniecta interdum & cera. Iam uerò ἀνο-  
 πον unguen est in his qui iam in corporibus alto dolent  
 medicamē ex semine abietis, chamæmeli, aneti, & floris  
 populi, quorū mox dicemus confecturam: præterea susi-  
 num, & gleucinum, & comagenum ex acoporū ungui-  
 num grege est, quæ tum ex medulla, tum pingui compo-  
 nuntur, suillo quidem moderatissimè relaxati, gallinaceo  
 autem his uehementius, & hoc adhuc magis anserino.  
 Atqui pingue leoninum, & pardi ualidius est, ut iam ue-  
 hementer calefaciat, eoq; insigniter discutiat. In medio  
 horum cōsistunt, bubulum, caprinum, uulpis, & hyenæ.  
 Hæc sanc in uniuerso genere sunt, quæ propriè ἀνοπα δι-  
 cuntur, hoc inuicem discrimine uariantia, quòd alia ma-  
 gis, alia minus calefaciant. Quapropter nonnulli genere  
 toto acoporum unguinū excidisse uidebuntur, si in mol-  
 libus ea corporibus examines, etsi durioribus, cuiusmodi  
 agrestium sunt, utilissima appareant: nam subinde dixi-  
 mus, dura corpora ualentiora pharmaca sustinere, mol-  
 lia uerò & humida, uelut puerorum, mulierū, & eunu-  
 chorum eiusmodi medicaminum potentiam ferendo non  
 esse. Insuper cuius notum est, & quæ uocantur myraco-  
 pa, ex acoporum cum unguentis temperatura fieri, ni-  
 hilo cæteris præstantiora nisi odoris suauitate.

APPARATVS MEDICA-  
 MENTORVM GENERA-  
 LIVM FINIS.



Lugduni  
Excudebant Ioannes  
& Franciscus Frel-  
lonii, fratres.

I 5 4 2































































